



14 326 /A

A. XXX. b

24135

1950  
192  
23/6/10












THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

PALESTINE  
ACADEMY


INSTITUTIONS REIMBURSABLE  
ET NON-REIMBURSABLE

ALBANY, N. Y.  
1891



AMERICAN  
ET AL  
NDC 1111





HERMANNI BOERHAAVE

*Phil. & Med. D. Inst. Collegii Pract. Bot.  
& Chem. Prof. in Acad. Lugd. Bat. Praef.  
Coll. Chir. Soc. Reg. Scient. Lond. &  
Acad. Reg. Scient. Paris. Sod.*

PRAELECTIONES  
ACADEMICAE

IN PROPRIAS


INSTITUTIONES REI MEDICAE.

EDIDIT, ET NOTAS ADDIDIT

ALBERTUS HALLER.


*Editio Secunda, auctior, & emendata.*

T O M U S I.



AMSTELÆDAMI,

Apud J. WETSTENIUM.  
MDCCLXII.





# INDEX

## CAPITULUM

*Quæ in hoc primo Tomo continentur.*

I. <i>Prolegomena.</i>	Pag.	I
II. <i>Principia &amp; Partes Medicinæ.</i>		65
III. <i>Physiologica.</i>		112
IV. <i>Manducatio Ciborum.</i>		141
V. <i>Salivæ ortus, natura, admistio.</i>		164
VI. <i>Deglutitio.</i>		198
VII. <i>Actio Ventriculi in Ingesta.</i>		247
VIII. <i>Actio Intestinorum in Ingesta.</i>		344
IX. <i>De actione Bilis utriusque.</i>		417
X. <i>De actione Lymphæ Pancreaticæ.</i>		449
XI. <i>Propulsio Chyli in Vasa Lactea.</i>		477
XII. <i>Fæcis Intestinalis materia &amp; expulsio.</i>		509
XIII. <i>Mesenterii actio in Chylum.</i>		550
XIV. <i>Actio Glandularum Mesaraicarum.</i>		559
XV. <i>Ductus Chyliferi actio in Chylum.</i>		582

V I R O



VIRO CLARISSIMO  
D. JOHANNI GESNERO,  
CANONICO CAROLINO,  
PHYSICES ET MATHES. PROFESSORI,  
VETERI AMICO,  
ALBERTUS HALLER.




*Ultis modis hoc munusculum Tibi debeo, Carissime Amice. Tu nasci vidisti hanc Opellam, quando communem PRAECEPTOREM cum voluptate maximâ, sed majori cum emolumento nostro, has ipsas Scholas ornatissime, & cum indicibili quadam suavitate, prælegentem audivimus. Tu eos ipsos tunc uberrimos consignasti Codices, quos magnâ meâ cum utilitate, & uti spes est, non sine publico Medentium commodo mecum communicasti, fideles, & propria verba, ipsumque os quasi PRAECEPTORIS referentes.*

*Sed neque hoc solum, etsi multum est, Tibi debeo. Te Parisiis, quamdiu per valetudinem tuam licuit, egregium laborum socium sum expertus, quem communis Patria inter Exteros cariorum redderet, cum etiam absque dulcissimo Patriæ nomine, quæ una omnes caritates complectitur, ipsis tuis virtutibus amabilis fuisses. Deinde Basileæ simul audivimus JOHANNEM BERNOUL-*  
\* 3 LUM,



LIVUM, cui, & dignissimis Filiis, Helvetia nostra debet, quod in ultimo Oriente novum nomen innotuerit Sinensibus. Ibi cœpit nasci alterum, quod paro, Opus Botanicum. Huic ex itinere illo, per magnam Helvetiæ partem Te doctissimo comite absoluto, primas lineas circumscripsi. Hoc Tu, missis Muscis, Lichenibus, & quidquid in Re Herbaria difficile est, tum pulcherrimis Plantis in Rætico itinere lectis, ita adjuvisti, ut Nomen Tuum cum rarissimis stirpibus ubique conjunctum sit adpariturum.

Multa sunt adeo in me merita Tua, quæ humanitas Tua, & qui Tibi etiam ignotos devinciebat, amabilis candor miris modis auget. Iis enim debere volupe est, qui neque arroganter nos docere, neque, quasi ex numerato, congiarium elargiri velint, fatentesve jubeant debitores accepti reddere rationem. Verum nihil Tibi decedet per eam Tuam modestam comitatem. Publicum ecce testimonium, quod gratus, & lubens, & sincerus offero. Hæc causa fuit Te adloquendi: Munusculi enim levitatem novi, cujus minima pars mea est. Sed est tamen opportunus locus coram plurimis, quos nomen BOERHAAVII promittit, lectoribus, de Tuis in me meritis nostroque amore non privatum, neque obscurum ponendi monumentum. Vale & fruire tali corpore, qualis Tibi est animus. Dabam IV. Martii MDCCXLI.



## ΠΡΟΛΕΓΜΕΝΑ.

**Q**ui medicinae se addixit, tenetur ex scientiae nostrae natura, ut addiscat id omne, quod de universa Arte aut Veteres aut Recentiores certum & indubitatum docuerunt; deinde ut his demonstratis fideliter addat proprias observationes suas: ea certe perfectione, quae in humanum intellectum cadit.

Haec ut addiscat, initium faciet ab *Institutionibus*: Comprehendunt eae notitiam omnium rerum, quae ad conservandam sanitatem & curandos morbos requiruntur. Inde progredietur ad *Praxin*, quae est illorum, quae prius addidit, deductio in actum in praesente aegro. Veteres, & nonnulli recentiorum male removerunt ab *Institutionibus* ea omnia, quae non ad Physiologiam pertinent. Debet enim mens medici, cui Praxis traditur, imbuta esse lingua medica, ut ea omnia intelligat, de quibus praecepta nunc accipit, neque enim praecepto occasio moram patitur. Ita inflammationis historia non potest sejungi ab idea obstructionis, conjuncta cum toto systemate arteriae conicae, sanguinem a corde accipientis. Debet adeo Medicus, priusquam ad *Praxin* se dimittat, in-

A

bu-

butus esse idea adaequata morborum omnium, ut ad lectum aegri absque mora morbos cognitos ex suis signis agnoscat. Institutionibus visum est praemittere Introductionem de *Historia Medicinae*. Opera enim apprime dignum videtur cognoscere, quibus incrementis Ars nostra ad eum statum adscenderit, in quo nunc est constituta, & varias illas facies perspicere, quas Medicina diversis temporibus prae se tulit.

## II.

*Nequit*] Haec adeo simplicia videntur, ut ad artem omnino non videantur non pertinere. Neque tamen debent negligi. Ab ipsa enim inpotentia perficiendi aliquam ex actionibus humanis, pervenimus in cognitionem causae proximae. Recte faciunt Turcae, quod medico vocato nihil quidquam obsequantur, nisi morbi nomen ad primam aegri considerationem pronunciaverit. Dolor in respirando denotat Pleuritidem, manus voluntati non obsequiosa Paralyfin &c.

## §. III.

*Aeris*] Ejus usura neque duobus horae minutis possumus carere: sed adeo aliquando pestilens est, ut solus aer absque alia causa morbos ipsamque mortem adferat. Aer est chaos omnium corporum. Vegetabilia semina omnia per aerem obvolitant. (1) Aurum, adeo ponderosum, elevari potest ad altitu-

[1] BOERHAAVE *Elem. Chem.* l. p. 484 seqq.



itudinem decem hominum, id evictum dedit Chemia. Exhalationes a Terra adscendentes aerem replent, eaeque aliae mane sunt, aliae meridie, diversissimae quae noctu descendunt. Ipsa astra aerem varie mutant, eorumque princeps Sol, & Luna validum in aerem exercent imperium. Gelidae noctes aestuosae Mesopotamiae (2), graves fuerunt primaevis Parentibus: sed nihilo melior est temperies aeris Aegyptii, aut Sinarum (3) aut aeris Indi, in quo aliae antiquissimae hominum familiae vixerunt, hic aestu, ille effluviis paludosis noxius.

Huc pertinent anni vicissitudines, Meteora, in ferventissimis regionibus creberrima, Venti: Magna vis est earum tempestatum, quae cum tonitru conjunctae sunt: subito enim discrimine gravem aestu & suffocantem aerem ita refrigerant, ut Perspirationis cohibitae noxae frequenter succedere debeant, eae vero ex decem mortalibus, novem omnino jugulant, si fides est SANCTORIO (4). Magna etiam vis est aeris nocturni, quia eo tempore vapores aquae diurno calore a terra elevati descendunt proprio pondere. Vidi homines Hercule ipso nihilo debiliores, ab unius noctis frigore, qua in madido gramine somnum egerant, insanabili Rheumatismo (5) adfectos. Saluberrimus est aer hy-

[2] De noctibus gelidis Armeniae v. TOURNEF. *Voy. P. III. Lettre 18. p. 140. ed. Lugd.*

[3] Si verum est, NOAM eo secessisse.

[4] Non invenio.

[5] Inde crudelissimus morbus in oriente frequentissimus *Beriberi* BONT. *Med. Ind. L. II. C. I.*

hybernus, quia gelida tunc crusta coërcet vapores ex terra adscendentes. Ver resoluta terra liberat eos halitus, inimicissimum homini, etiam ideo, quod caloris & frigoris vicissitudines frequentissimas habeat.

*Alimenti*] Primaevi Parentes ignorabant vires Plantarum, carniū, fructuum horaeorum, tentabant omnia, & tristibus demum experimentis feralium dapum usum dediscabant. Uti nostris temporibus in itineribus ad remotas terras incognitorum alimentorum usu periclitantur nautae (5\*). Deinde, quod alimentum coelo frigido, corpori robusto convenit, idem in aëre tepido, debili homini est insuperabile. Neque notum erat primis mortalium ex suavissimae frigidae in aestuans corpus ingestione, praesens Pleuritidis mortisque periculum imminere in tanto aeris sui fervore.

*Irruentium*] Lapsus, lassitudo, fortuiti casus, faxorumque aut arborum ruinae, tempestive casus Chirurgicos fecerunt. Machinarum, mechanicarum defectus, viae non munitae per montes arduos, casus primorum mortalium multiplicaverunt. Neque bella unquam diu siluerunt, cum secundi mortalia **CAIN & ABEL** belli exemplum suppeditaverint.

*Vitae*] Eadem corpus depopulatur ad modum

[5\*] Antonii milites venenatas radices in Assyria invenerunt, quibus pasti in delirium acti sunt. PLUTARCH. in *Anton.* Graeci a Cyri expeditione reversi melle Colchico alimentati sunt per 24. horas DIODOR. Sic. *Bibl.* XIV. c. 31.

dum morbi acutissimi: Fames paucissimis diebus, fitis nequidem ultra horas aliquot tolerari potest, si ea defint, quae labans corpus restituere queant, & eo citius necant, quo robustius corpus est, quod depascuntur. Quo robustius enim corpus est, eo saevioribus obnoxium est aegritudinibus. Pestis saevissima ex sola nimia agitatione corporis oriri potest. Vidi hominem, cui mandatum erat, ut absque mora literas redderet Ultrajectum, qui currendo tantam excitavit liquidorum crassiorum in vasa minora excessionem, ut nulla arte potuerit corrigi (5\*\*). Requiritur inter motum & quietem perpetuum aequilibrium, quod primis equidem hominibus omnino ignotum fuit.

*Fabrica*] Ea est vasorum in humano corpore mollities, teneritudo, exilitas, ut non mirum sit frequenter ea vitari, id mirum sit, quod tanto tempore perdurare possint. Vas minorum vasorum maximum, arteria rubra, decimam partem fili Aranei (6) crassitie aequat: sed ea arteriola esset Aorta respectu ad arteriolam corticis Cerebri. Per has angustias tenerrimorum vasorum aguntur,

[5\*\*] EUCHYDAS victoriae nuncius, cum Delphos pervenisset, subito expiravit PLUTARCH. in *Aristide*.

[6] Vasa cerebri 512 es minora sunt globulo sanguineo, apud LEVWENHOEK *Anat. & Contempl.* p. 31. sed globulus sanguineus aequat  $\frac{1}{1940}$  diametri pollicis. Quare

Vasculum illud Cerebri, erit ad arenulam, uti 1. ad 512, divisum per 10262600.

tur, celeritate quae est maxima, liquores varii, adteruntur ad Vasa, Vasa adterunt, sicque vitae vis se ipsam perpetuo destruit. Eadem vasa, quae in adulto adeo tenerrima sunt, in foetu toties fuerunt minora, quoties homo adultus toto foetu major est. Homuncio enim duarum septimanarum nullo eorum vasorum destituitur, quae possidebit adultus. Vide quam facile tantillae firmitati vitium inferatur.

*Qua nos*] neque necesse est subire dubia illa de statu innocentiae, qui brevis fuisse videtur, neque obnoxius humanis casibus, neque talis, ut id quod nunc cognoscimus Corpus humanum, iis quas possidet viribus, ad talem integritatem videatur sufficere posse.

#### §. IV.

*Automatico*] Automaton est machina, quae motus aliquos perficit, non aliam adgnoscentes causam, praeter ipsam machinam semel motam motumque continuantem absque auxilio alterius causae. Ita Horologium portatile est automaton, quod dum sanum est, motu proprio indicem circumfert: Hoc ergo nomine intelligimus motum pendentem ab artificiosissima corporis humani fabrica, quem neque voluntatis imperio producimus, neque conpescere valemus. Est equidem, & verè existit hoc motuum genus, licet displiceat quibusdam Philosophis. Corpus nostrum congeries est minimorum Elaterum, quorum actionibus conjunctis sanitas efficitur. Horum elaterum princeps est Cor: id motus suos



suos reciprocos perficit, donec universa machina corporis destructa sit [§. 187.]. Sed minores elateres ubique dispersi sunt per corpus, arcentes injurias corporum, quae nos ambiunt. Ponatur in subitum frigus corpus hominis motu nimio exaestuans. Coagularetur certe sanguis, & listeretur ejus motus subito, nisi caveret natura corporis. Constringuntur nempe subito vasa cutanea omnia, excludunt actionem inimici frigoris. Venenum adsumtum est, pereundum homini, si vis ejus aut in sanguinem se penetret, aut diu in viscera agere queat. Oritur Vomitus, actum est id omne, quod praestiturus erat peritus Medicus. Neque resistere possumus beneficae voluntati, ut voce pene vera utamur, machinae nostrae. Monet amicus amicum, se subitum ictum minaturum oculo, caveat ne claudat. Secura est anima de periculo. Sed adcedit feritura manus, subito clauduntur palpebrae, prospicitur terrerrimo organo, nulla animae prudentia, imo vero invita sed frustra reluctante Mente. Adigitur vitri fragmentum intra cutem, sed vitrum nonnisi in scindentes laminas frangitur, destruet ergo corpus nisi expellatur. Ergo fit suppuratio, adteritur quod in vicinia est, ut nascatur cavitas plena pure, ut fluctuet hostile vitrum, mox effluat. Harum actionum a corporis mirabili fabrica orientium junctam in conservanda valetudine potestatem **NATURAM** vocavit **HIPPOCRATES**, cui tot & tantas efficacias tribuit, crises, ut unicum nominemus ex multis, acutorum. Et nullum omnino morbum

exci-

excipio ab auxiliis hujus motus automatici, qui sine ulla mentis conscientia fiunt, & toto morbi decursu perpetuo adfunt. Imo vero in brutis animalibus observantur. Canis vorat gramen, ut siccam alvum ducat, neque unquam aliam plantam, praeter ipsum suum gramen rodit: Anates & anseres, quae aves solida semina devorant, neque tamen firmissimum ventriculum nata sunt, devorant lapillos (1), qui dentium vicario officio functi duriores cibum subigant. Galli perpetua in caveis quiete si aegrotaverint, dimissi calcem protinus de parietibus decerpunt, ut acidum ventriculo molestum debellant. In Asia datur animalculum leonis effigie, id, dum cum serpente pugnat, si forte laesum fuerit, confugit ad herbulam, dictam Mungos, (2), & super eam se volutat, tunc recuperata alacritate ad serpentem redit, eumque superat, neque alia ratione vis theriaca ejus plantae innotuit hominibus. Ita MELAMPUS (3) Argivus, antiquissimus Graecorum medicus, cum oves helleboro nigro pastas videret alvum laxam habere, medicamentum ad homines transtulit, quod longis ab eo tempore aevis de nomine observatoris dictum est *φύτον Μελамπωδες*. Ex quibus certe medicandi ratio mortalibus innotescere potuit.

[1] HARVEI. *de gener. anim. Exerc. VII.*

[2] Animal est *Quirpele* sciuri effigie, quod radice *Mungos* vescitur, ut pugnam cum vipera integrius renovet. Est autem radix plantae ex genere *Valerianellarum*, ut adparet ex KAEMPFERI *amoenit. exot. Fascic. III. n. X.*

[3] VII. not. 23.

potuit. Sic felices in morbis acutis haemorrhagiae Venaesectionem, crudeli specie minax remedii genus, indicasse videntur priscis mortalibus (4). Sic illapsa in oculum arenula, protinus videmus constringi valide palpebras, ita repelli oculum in interiora orbitae, conprimi glandulam lacrumalem magnam, effluere lacrumas, quae cito & eluant arenulam, & mulceant natam ex frictione inflammationem. Quid simplicius quam imitari naturam, & illapsa inimica corpora, expugnare siphunculo sub palpebras impellente liquorem mitem & tepidum, qui & dolores leniat & asperum corpus eluat.

*Ignoti*] Suppurationem moliti sunt medici ad naturae ductum, ignorata efficacia, quam eventus in medicamento confirmabat. Corpus humanum facultatem ejiciendi, quae a natura sua aliena sunt, communem habet cum omni animale, cum plantis, cum metallis denique, aurum enim omne, quod non fuerit aurum ejicit. Eventus certi sunt, observati a rerum gnaris. Causas frustra conamur explicare.

### §. V.

*Perceptio*] Haec tentamina oriuntur ab anima doloris inpatientem, per omne remediorum genus quaerente levamen malorum, neque

- (4) Primam Venaesectionem legimus apud STEPHANUM BYZANTINUM (voc. *Syrna*) cujus ope PODALIRIUS filiam Regis DAMOETHI ex gravi casu aegram restituit.

que quidquam habet cum motu Automatico commune. Possunt ad duas classes referri haec molimina. Ad primam pertinent temera auxilia, quibus expers consilii anima praesentem dolorem conatur lenire, situ mutato, adplicata ea ad vulnus herba quae proxime ad manus erat, & aliis id genus. Arena oculo illapsa est, effluit quidem ex motu automatico lacruma, elotura arenam (IV.) sed praeterea mens inquieta, dum percipit dolorem tentat varia, manusque admovet oculis, confricat bulbum, atque uberiores lacrumarum proventus exprimit. In dolore lateris homo omnes quaerit situs, donec aliquem inveniat temera molitione, in quo minus intolerabilia patiatur. Quae conamina, quando felicia erant, adservata in hominum sermonibus & memoria, rudimenta fuerunt Artis Medicae. Aliud genus est eorum consiliorum, quando Mens molestis corporis passionibus ea media obponebat, quae ipsa rei natura indicat. Aestuanti homini a nimio labore summum remedium est, id quod sanguinem diluit, & ruentes in acrius sales mitigat; sed id ipsum suis indicat, potum subacidulum, aqueum, frigidum petens. Et cum plerique homines moriantur ex aliqua sanguinis siccitate, & immeabilitate, fit ex hoc appetitu, ut plerique aegri ante mortem aquam frigidam desiderent, male coequentibus medicis ad eos appetitus, qui rectissima via ducunt ad superandum malum, ex quo morbus provenit. Alius rigida hyeme per oblucentes aquilones corpus exercuit ambulando, auxit perspirationem, fatiscet brevi & fame oscitatoria peribit; verum adest benefi-



nefica fames, non molles delicias, sed atrum panem suadens duramque suillam, facile subigendam ab aucto per frigus robore viscerum, viresque redditura corpori deficienti. Haec conamina ad animam pertinent, neque ea vel in Brutis ad corpus referrem. Corpus enim dormientis aut apoplectici, non monet de cibo adsumendo. Neque aliorum refero, singulares & validos adpetitus insolitorum alimentorum, qui morbis adeo saepe finem inposuerunt. Febricitans acute deperit frigidam aut uvas, custodes arcent, renituntur amici, potitur tamen cupitis deliciis, reddit robur languentibus fibris, vel expellit viscidum intestina offerciens, sanatur. Dives aeger Amstelædami, liberalis artis salutaris remunerator, appetebat perdite haleces, repugnabant medici, audet, & sanatur, historia existat apud TULPIUM, ejusque similes centies, in hydropse aut quartana febre occurrunt observantibus (1). Acido turget chlorotica puella, rodit cretam, terram cimoliam, vel turpiores alios hostes acidi, absurdo appetitu, si ad sanum corpus referatur, sed qui praesenti malo paret remedium. Sunt certe adeo frequentes historiae felicitis appetitus vehementioris in morbis omnis generis, ut non temere censeam a Medico obluctandum esse. Neque ideo accusari debueram, quod machinam aliquam fatali necessitate agentem ponerem. Ego enim experimenta quaero, & colligo in axiomata, neque aliam habeo methodum sciendi; atque adfirmo,

quae

[1] An de ostreis PRAECEPTOR quibus sanatus marcor legitur TULP. *Observ.* 8. L. II.

quae experiundo didici, securus causarum aut consequentiarum.

### §. VI.

*Semper*] Naturalis medicina descripta §. IV. V. semper fuit & ubique. Morbis nunquam liberum fuit genus humanum III. & auxilia ad medendum morbis ab omni aetate quaesita fuerunt V. Quare medicina naturalis nunquam defuit mortalibus. Nunquam enim instinctus uterque homini defuit. Altera Medicina, quam homines condiderunt, non est antiquissima. Nempe non semper fuerunt homines, qui naturalem imitarentur. Mens hominis non quiescit in sphaera instinctuum, qui soli praesenti tempori prospiciunt, ea fors est brutorum animalium: sed memor praeteriti, conscia praesentis, ex comparatione notarum futurum etiam attingit. Astronomi ex adparitionibus in coelo per aliquot secula consignatis artem construxerunt, praevitam futuri, neque incertius Eclipsin post decem secula imminentem praedicunt, quam solis aut ortum aut occasum. Talis esse coepit Medicina, quando descriptis morbis, notatis iis quae ars, casus, aut Natura feliciter erant moliti, inductionem potuit elicere, & pronunciare tuto,, Centies in morbo designato, cum his signis, saluti fuerunt phaenomena aut remedia definita, erunt & nunc in Te praesente aegro,, Cui praedicendi arti favisse potuit priscorum hominum longa aetas, capax infinitorum experimentorum, & propria memoria casuum adfinitates suppeditatura, quos nos, brevis vitae fluxuque

xique homines, ex aliorum monumentis cogimur supplere.

§. VII.

*Historiae*] Non facillimum est tempus definire, in quo Medicina Artis habitum induerit, sive quod idem est, in quo selecti homines proprios se dederint gerendae curae valetudinis civium suorum. Ipsa tempora debent distingui. Primum antiquissimum, de quo absque ulla memoria hominum ex sola rei ipsius natura aliqua possumus definire, & de eo statim dicemus. Alterum fabulosum est, cujus monumenta habemus, sed floribus sermonis, & arbitrariis ornamentis deformata. Tertium historicum, & de ejus quidem rebus gestis ex seriis virorum gnarorum commentariis nobis constat. Erat forte ante diluvium, erat a diluvio senex unus aut alter, suis vel aliorum casibus aut propria quadam, ut homines solent, curiositate, in iis versatior sibi que placens, quae humanam valetudinem vel laedunt, vel laesam restituunt. Talem Fabulae, antiquissimum historiae genus, docent fuisse *Phoebum* vel *Solem*: (1) Verum is Phoebus fuit *Horus* (2) Assyrio-  
rum

(1) HIPPOCRATES ad *Philop.* in *Epist.* ed. LIND. Tom. II. p. 1330.

(2) Huc *Horion*, templi nomen, unius ex tribus quae Epidauri sacrata erant APOLLINI *Pausan. Corinthiac.* Orum etiam sive *Apollinem* Osiridis filium apud Aegyptios cultum fuisse HERODOTUS *Euterp.* p. m. 165. vid. de *Horo* le CLERC *hist. de la Medec.*



rum rex, a quo inventum medicamenti genus conservavit PLINIUS: & manifesto vox אור, lucem in linguarum vetustissima exprimens, Phoebum cum Horo conjungit. Probabile vero est Medicinam haud longe a Mesopotamia primum ortum duxisse, vel inde, quod ibi genus humanum natum sit, & prima inter Monarchias sedem ibi fixerit. In eadem felice & temperata regione, longaevi mortales plerasque artes invenerunt. Medicina vero, cum Astronomia, & Linguis, inde in Phoeniciam, hinc in Aegyptum migrasse potuit, neque enim Aegyptum primaevos habuisse cultores vel ex ingenio terrae adparet, quae nonnisi post excultas jam artes, ductis fossis, structis aggeribus habitari potuit. Sed in Assyria (3), multis post hanc aetatem seculis, ea adhuc lex viguit, qua sua experimenta quivis civi languenti aperiebat. Quae prima Medicinae species fuit.

*Chaldaeis*] Hi prisca fuerunt Assyriae coloni. Duces inter eos Judicesque *Magi* fuerunt (4), qui sapientiae suae praecepta versibus comprehenderunt, omnis scientiae magistri, cum ne quidem Regibus solum conscendere fuerit integrum, nisi eruditis a MAGIS, PLINIO teste. Excelluit inter eos

(3) HERODOT. L. I. p. m. 92. de Lusitanis & Asturibus STRABO.

(4) STRAB. L. XVI. p. 501. HEROD. passim L. I. & III.

eos ZOROASTER, (5) quem (6), ob mutatum nominis Magorum sensum, ad Sathanae complices relegavit superstitio, eodem modo uti Romani, exosi Astrologorum seditiosam curiositatem, omne Mathematicorum nomen ex Italia ejecerunt (7). Chaldaeorum doctrinam longa oblivio nobis eripuit. Innumeri libri, quibus sapientia Orientalis continebatur, perierunt cum regni urbibus, Nive, Hierosolyma, Babylone, Persepoli, Alexandria. Quod superest, ex HERODOTO excerpendum, vel adsequendum ex conjectura, parum est. SANCHONIATHONIS & BEROSI scripta non satis sincera possidemus, & ex antiquissimis eis temporibus sola *Scriptura Sacra* superest. Antiquissimus Historicorum est *Moses*, sequitur liber *Josuae*, deinde auctor *Regum* & *Paralipomenorum*, tunc SANCHONIATON (FELDM.) cujus magno nostro incommodo non omnia scripta supersunt. Magno intervallo distat HERODOTUS, quem THUCYDIDES & XENOPHON sequuntur. Fuisse certe in Oriente medicos, & DAVIDIS (8) & ASAE (9) historia confirmat. Sed eorum

(5) IUSTIN. L. I. p. 2. Sed is recentior fuit ESDRAE discipulus, si fida traditio GERORUM, KAEMPFER *Amen. Exor.*

317.

(6) quod SERVATORIS aevo longissime ab ea infamia remotum fuit MATTH. II. v. 1. 2.

(7) in primis a DOMITIANO Imp.

(8) REG. cap. I. 3. 4. 5.

(9) Chron. II. c. XVI. v. 14.

rum gloriam obscuratam fuisse temporibus DARIÏ HYSTASPIDIS (10), vel ex eo apparet, quod ad curandum pedem, quem luxaverat, non patrios Medicos, sed protinus Aegyptios vocaverit.

*Aegyptum*] Hi populi plurimi medicinam fecerunt (11). Sacerdotes enim Aegyptii, Deorum hominumque interpretes, & Reges ipsi dedecori non habuerunt in apertis cadaverum visceribus mortis causas inquirere (12). Sed & hanc, & reliquam sapientiam suam fide arcani, & pictis aenigmatibus velatam adservarunt. Antiquissimos ibi medicos fuisse docet *Sacra Scriptura*, (13) quando mortui in Aegypto *Jacobi* corpus a medicis JOSEPHI

(10) HERODOT. in *Thal.* p. 210. edit. GRONOV.

(11) HOMERUS *Odyss.* Δ v. 250.

--- Ἰντρος δε ἕκαστος ἐπισαμὲν & περὶ πάντων  
Ἀνθρώπων. ἡ γὰρ παλαιὸνος ἐστὶ γενεθλῆ.

(12) Respicit BOERHAAVIUS ad locum PLINII. L. XIX. c. V. p. 909. ed. DALECH. ubi narratur, in morbo novo atque ignoto, Regum jussu aperta fuisse cadavera, pereuntium & in iis cor consumptum, inventum esse, ad quem morbum medicina reperta fuerit ex raphano rusticano, verum eam historiam ad Ptolemaeorum tempora refert SCHULZIUS *Hist. Met. Per. I. Sect. I. c. III. §. XV.* sapientiae Aegyptiae parcus in universum laudator.

[13] GENES. Cap. L. v. 11. 26. ubi ex verbis S. S. facile apparet, antiquissimo eo aevo jam receptam legibus & antiquam fuisse consuetudinem condiendi magnatum cadavera.



PHI balsamo conditum fuisse narrat. Numerum autem Medicorum magnum fuisse, velex eo adparet, quod cuivis particulae corporis humani proprius (14) Medicus assignatus fuerit, ut alius oculum, alius aurem, alius aliam partem sibi sumeret, in ejus morbis cognoscendis & curandis vitam inpensurus, & poenas & munera speraturus ab eventu (14\*). Haec altera fuit patria Medicinae, unde fatentibus magnis viris, PLATONE, THALETE, & LAERTIO, Graeci in universum & DEMOCRITUS (15) imprimis artem suam hauserat. Post funesta bella sub Pharaonibus Necho, & Hophra, atque Psammenito subacta Aegypto ab Assyriis primo, deinde a Persis, afflictata fuit sapientia Aegyptia usque adeo, ut aevo DARRII HYSTASPIS F. Aegyptii medici aulae Persicae vix crucem effugerent deprecante DEMOCEDDE Crotoniata (16), postquam operam eorum in reponendo luxato pede vanam expertus fuerat. Sed ad priorem gloriam adspiravit denuo Aegyptus, quando sequen-

[14] HERODOT. in *Enterp.* p. m. 135. Hoc Malabaribus receptum v. GRVNDLER E. N. C. 1727 app. p. 308.

[14\*] Diodor. Sicul. *Bibl. hist.* l. c. 82. nempe quando a legitima medicina discefferat.

(15) LE CLERC *hist. de la Medec.* P. I. L. II. c. VI. p. m. 97. Insignem vero Medicum fuisse adparet ex PETRONIO, qui herbarum omnium succos expresserit, ipsam etiam artem conflandi lapillos pretiosis similes edoctus in SATYRICO.

(16) HERODOT. L. III. p. 243. seqq.

quentibus aevis ab HEROPHILO, ERASISTRATO, AMMONIO, DIOSCORIDE PHACA, aliisque universus medicinae quousque patet ambitus, Alexandriae ita ornatus fuit, ut undique eo confluerent, qui solidiorem cognitionem artis salutaris optabant.

*Cyrene*] Beata inter inhospitas arenas provincia celebria inter Philosophos nomina genuit, ARISTIPPOS, ERATOSTHENEM, CALLIMACHUM & CARNEADEM; (16) medicum vero notabilem nullum, licet post Crotoniatis CYRENAEI primas (17) in Medicina tenuerint. Ibi etiam filphium, nobilis planta, nascebatur, quam, tanquam Deorum praecipuum donum, in nummis Conditoris BATTI expresserunt.

*Crotonem*] Ibi schola Pythagoraeorum (18) floruit, ex qua prodiit DEMOCEDES (19), qui cum curam gereret tyranni Samii POLYCRATIS, eo necato in Persiam abductus est, DARII luxatum pedem, cum Aegyptii mala medicandi ratione morbum reddidissent difficillimum, ipse mollissima malva admota restituit, & ATOSSAE mammam ulcere adfectam sanavit. Magnis honoribus atque diuitiis auctus, patriae tamen amore reditum aucu-

(16) V. STRAB. L. XVII. p. 665.

(17) SCHVLZ. l. c. p. 146.

(18) totam PYTHAGORAE historiam vid. apud le CLERC *hist.* p. 90. 91. SCHVLZ. p. 170.

(19) HERODOT. L. III. p. 243. seqq. addit, eo aevo Crotoniatis Medicos omnibus aliis in hominum fama praestantiores fuisse.

aucupavit, occasione legationis quae primi belli Persici causa facta est. Ejectis Philosophis ex CROTONE, cremato per seditionem Pythagora, alia schola nata est METAPONTI. (20)

*Graeciam*] Videtur AMASIS temporibus, quibus Graecis plurimum cum Aegypto commercium fuit, medicina ex ea ad Graecos transisse, uti leges Atticas ex Aegypto eodem seculo retulit SOLON (21). Superiorum temporum tenuis est fama. Antiquissimus Medicorum inter Graecos indigenas videtur fuisse MELAMPUS (22), qui, experimentum a cervis edoctus, PROETI Argivorum Regis filias hysterico delirio persuasas se in vac-

(20) Et alia AGRIGENTI, in qua insignes Medici ALCMAEON anatomicorum ferre antiquissimus, EMPEDOCLES qui feminam per triginta dies voce & respiratione destitutam restituit, & ACRON exosus EMPEDOCLEI Empiricus. Conf. LAERT. & SCHVLZE Per. I. Sect. II.

(21) HERODOT. L. II. p. m. 180. PLVTARCHVS vero de NILOXENE, Graeco homine, ab AMASI ad PERIANDRUM delegato, & historia ejus aevi, multa habet in *Symphos. sap.*

[22] Qui centum & quinquaginta annis ante AFSCVLAPIVM floruit, conf. le CLERC P. I. L. I. c. IX. Eum Helleborum album fuisse, nigri primum experimentum in HERCVLE fecisse Anticyranos SCHVLZ. p. 88.



vaccas transmutatas fuisse, sanavit usu Hellebori, & nomen suum salutare herbae reliquit. (23)

*Gnido*] Civitas ea in minori Asia fuit, (24) quae videtur Medicinam ex vicina Syria accepisse. Ibi floruisse celebrem scholam, reliquit GALENUS (25), ejusque methodum medendi saepe citat HIPPOCRATES (26) atque ex ea multa veteris Medicinae monumenta conservat; ex quo forte nata est vegetus

- [23] ΦΥΤΟΝ ΜΕΛΑΜΠΩΔΕΣ HIPPOCRATES ad Cratev. op. vol. II. ed. Lind. p. 991. Post MELAMPVM floruit CHIRON insignis Botanicus laude, a quo nomen duxit *Centaurium utrumque*, le CLERC. P. I. L. I. c. X. & discipulus CHIRONIS AESCVLAPIVS GRAECVS, comes Argonautarum, Chirurgus & Medicus, Diis a posteritate adscensus, de quo, & ejus cultu le CLERC P. I. L. I. c. X. XI. XII SCHVLZ. Per. I. f. II. c. 4. Hujus filii MACHAON & PODALIRIVS Heroes Graecis TROIAM obsidentibus adfuerunt, HOMER. *Iliad.* B. v. 240. Δ. v. 215.

- [24] STRABO L. XIV. p. 363.

- [25] Certasse cum Coa scholam Cnidiam, primas tamen Coam tenuisse, de *Meth. med.* L. I. c. I. p. 4. Ex ea prodiit CTESIAS, consanguineus HIPPOCRATIS, celebris Medicus & historiae scriptor, & EVDOXVS, primae notae Mathematicus,

- [26] Solet vocare *δοξας Γνιδίας*, & librum de his ipsis scripserat teste CAELIO AVRELIANO de *Acut. cur.* L. III. c. IV. p. 189. c. VIII. p. 212. Ed. AMMAN.



tus illa calumnia (27), HIPPOCRATEM ereptis monumentis ex templo Cnidiano ignem subjecisse aedi, ut furtum lateret, ipsum Veterum sapientiam in propria scripta transulisse: Videtur autem Cnidiorum Medicina ea fuisse, ut morbi antecedentia, symptomata, euentus studiose notarent, nihil ultra solliciti de eliciendis corollariis, vel uniendis in genera morborum speciebus, & merito ob id ipsum reprehensi ab HIPPOCRATE. (28)

*Rhodo.*] Insula civium ingenio, coeli salubritate & navali studio celebris, exoptatissimum TIBERII exilium, (29) habuit vetustissimam scholam medicorum (30), quae HIPPOCRATIS aevo jam in oblivionem ruebat, ut quae ne semel quidem ab eo nominata sit.

*Co.*] Primaria haec fuit Asclepiadarum schola, de qua plura in historia HIPPOCRATIS.

*Epi.*

[27] ANDREAE, quem refutat SORANVS in *vit. Hipp.* quae exstat in *Operib. ed. LINDEN, Tom. II. p. 952.*

[28] *De Victu acutor.* ap. LIND. Tom. II. p. 268. 378. Accusat eos, quod caruerint omni theoria, morbos numeraverint, qui debuerant in classes revocari, victus rationem non habuerint. Innumera medicamenta in L. *περὶ παθῶν* & *muliebrum* HIPPOCR. omnino ad Cnidiorum aliquem videntur pertinere.

[29] Maximo studio, obstante matre & AUGUSTO, eo se contulit SVETON. *vit. TIBER. p. 115. seqq.*

[30] GALEN. *Method. Med. L. I. c. I.*

*Epidauro*] AEscULAPIUM ibi natum esse receptum erat, ejusque Dei antiquissima ibi fuit religio & celeberrima (31), ut quam Deus ipse praesens miraculis frequentissimis commendaret, donec saeviente peste ROMAM delatus ibi sedem figeret (32). Dormiebant peregrini in templo Dei salutaris, & responsa divina per insomniā captabant. Haec omnis Medicina, de qua diximus, *Empirica* fuit, & ejus periodus Artis velut Infantia.

### §. VIII.

*Fortuitus*] Effectus causarum, a quibus prudentia humana talem non potuit exspectare. Ita didicerunt homines, aquam frigidam, omnium potulentorum maxime innoxium, aestuanti sanguini ingestam, Pleuritidis & mortis causam fuisse. Ita Cairi incolis sola experientia constitit, pestem ea die definire, qua Nilus agros inundat. (1)

*Instinctus*] Is utrumque complectitur auxilii genus, tum quod a corpore provenit, motum nempe automaticum §. IV. tum quod ad mentem solam referri debet, appetitum spontaneum §. V. non ratiocinio equi-

[31] Uberrime de ea SCHVLZ. PER. I. f. II. c. IV.

[32] v. VALER. MAXIM. L. I. c. VIII. cadit autem in A. V. C. CCCCLXII. non CCCL. uti habet CLERICUS conf. EPIT. LIV. l. XI.

[1] PROSP. ALPIN. de *Med. Aegypt.* L. I. cap. 18.

quidem demonstratum, sed singularem, & cogitationis non indigum.

*Eventus*] Effectus opinioni hominum contrarius. Ut si homo febricitans, cui interdictum esset fructibus horaeis, ab uvis larga copia adsumtis sanitatem recuperet. Vel si prisca homines docti gelidam exhibitam in febribus ardentibus salutarem (2) fuisse, eam in Pleuritide exhiberent eventu funesto.

### §. IX.

*Templorum*] Laudabilis mos apud Antiquos obtinuit, (1), ut, qui ingente aliquo periculo evaserant, historiam suae conservationis dedicarent in templo ejus Numinis, cui salutem ferebant adceptam: Id in naufragiis, id in morbis factum, ut historia morbi, consilii, medicinae & sanationis tabula votiva exprimeretur. Hi primi fuerunt libri Formularum Medicarum (2), &

Ca-

[2] Quae vett. fuit medendi ratio. Laudavit eam in Cholera ARETEUS *de curat. acut. passion.* L. II. c. IV. in febre acuta GALENUS *Meth. med.* L. IX. c. V. in ardente CELSUS L. III. c. 13.

[1] In Urbis primariae insulae Cos templo suburbanum, multa dona & formulas sanationum fuisse consecratas, STRABO L. XIV. p. 365. & Epidauri similia monumenta pilis incisa PAUSANIAS *Corinth.* ed. 1588. p. 70.

[2] Theriacam ex Serpyllo, Opopanace, Milio, Trifolio, Foeniculo, Aniso, Ammi, A-

Casuum, ut vocant, Medicorum. Hujus generis monumentis laquearia templi Epidaurii repleta fuerunt, utiliore certe instituto, quam adulatoriae vitae & pompa insignium, quae nostro tempore divina loca occupant.

*Comparatione]* Homo juxta lectulum aegri in publico loco expositi viam faciens, quaerebat, quonam malo decumberet; Respondebatur, febre acuta. Memor ille, se, vel suorum aliquem, eodem aut consimili morbo adfectum, servatum fuisse medicinae aliquo genere, venae sectione, &c. expertum sibi auxilium indicabat. Inde natus alter Medicinae & jam altior gradus, *Analogia*. Qua & ipsi Empirici carere non potuerunt, & eo ipso ratiocinium, quod tanto damnabant opere, clanculum invocabant ipsi.

## §. X.

pio, tufis & vino optimo exceptis, acris incisam & consecratam in templo Aesculapii, habet PLINIUS L. XX. C. 24. & plusculas inscriptiones, quae historiam morborum ab Aesculapio sanatorum continent MERCURIALIS *de arte Gymnast.* L. I. cap. 1. Ex tabulis Templi Coi, quae ad victus rationem pertinent, excerpisse HIPPOCRATEM, narrari a nonnullis STRABO l. c.



§. X.

*Medicorum*] Publica lege (1) apud Aegyptios constituti sacerdotes, ex publico reditus habuerunt, suis statutis circumscripti. I. Ne quisquam morbi, quem curandum sibi sumserat, limites transgredere-  
tur, sed suam artis particulam propriam, & hereditariam, solam exerceret. (2)  
II. Ne quis Medicus Medicinam faceret nisi juxta HERMETIS (3) libros, secus si faceret, suo id auderet periculo, poenas daturus, si male cederet. III. Ne ante diem quartum aliquid moveret. In febre ante triduum nonnisi clysteres & mitissima quaeque exhibere tenebantur, abstinere iis, quae vomitum aut alvum moverent (4). IV. Ne quis praeterquam medicus medicinam faceret (5). Tanto studio, a gente sapiente, divite & beata, Medicina necessario magna incrementa sumfisse debuit.

*Annotatione*] Magna fuit Antiquorum cura & industria [6] in hac parte observationis medicae. Sexum, aetatem, temperiem, vires,

[1] Conf. de Aegyptiis Medicis SCHULZE PER. I. f. I. c. 3.

[2] Vid. HERODOT. L. II. p. m. 135.

[3] DIODORI SICUL. l. I. c. 82.

(4) ARISTOTELES περι πολιτικών L. III. c. 15. p. 451. qui eam legem improbat.

(5) Non invenio.

(6) Pro exemplo sint historiae aegrorum, quae in EPIDEMICORUM I. & III. ab HIPPOCRATE consignatae exstant.

res, morbos praegressos, faciem ipsam, vitum denique patienter & curiose adnotaverunt, eo parciores in hypothesi & ratiocinio, nihil quidquam deducentes ex suis historiis, & ob timiditatem reprehensi ab HIPPOCRATE [6\*].

*Remedii*] Quod ea aetate fere ex plantis solebat peti. [7] Curiositas Veterum in stirpium collectione & praeparatione, aestimari potest ex HIPPOCRATIS ad CRATEVAM epistola, [8] ubi locum natalem, tempus & conservationem Hellebori fuscæ persequitur.

*Propria*] Sacerdotes avari & gloriae cupidi, ut augerent aegrorum fidem & numerum, velaverunt Artem superstitione & fabularum pompa, eamque subreptam generi humano, sibi & suis arcanam reservaverunt. Ita quando IPHICLUS [9] in prolis a MELAMPO auxilium petiit, Vates, post auspicia & immolationes, rubiginem cultri in quercum defixi, magno cum adparatu fabularum propinavit: cum vana religio teneret

(6\*) *περι διαίτης οξέων. ab init.*

(7) Conf. le CLERC. P. I. L. L. c. XVIII. Auxilia Chirurgica & Chemica senioris aetatis sunt, illa, quod crudelia, haec, quod remotiora a consuetudine mortalium.

(8) nisi spuria fuerit, quae haud obscura est suspicio. Curiositas etiam HIPPOCR. ibi laudata, & vana & proletaria est. Sed meliora sunt quae HIPPOCR. habet in libello *περι έλλαβεορισμοϋ* ab HEURNIO edito, Tom. I. LIND. p. 610.

(9) Vid. ap. le CLERC. L. l. c. IX. p. 28.

geret simplicissimum medicamentum chalybem, acidī succi lento ex arbore adfluxu solutum, summam utique medicinam in augendo robore. Centurio laborabat sputo sanguinis, petebat remedium ab AEscuLAPIO. Sacerdotes, gnari medicinae, Dei loco responderunt,, fumeret cum melle nucleos pini,, aptissimum certe medicamen, & sanatus est [9 \*]. Sed & ipse HIPPOCRATES [10] discipulos suos jurejurando obstrinxit, ne artem profanis propalarent. In universo autem orbis ambitu a solis fere sacerdotibus exercebatur medicina, apud Iudaeos; Aegyptios; Lemnios, quibus Vulcani Sacerdotes medicinam faciebant; Indos, quorum Sacerdotes antiquissimo nomine dicti *Brachmanes*; Gallos demum & Germanos, quibus *Druidae* vocati sunt. [10 \*]

§. XI.

*Extispicia*] Victimarum oblatio primorum hominum religiosus ritus fuit, ut ex ABELLIS

(9\*) Juliano sanguinem revomenti. Vide MERCURIALEM de *Arte Gymnast.* L. I. c. 1.

(10) in coll. LINDENIANA Vol. I. §. 3. p. 43. sed subreptitius liber non satis probat quod probare debet. Verum aliunde constat de sacrificulorum imposturis. conf. LUCIANUS & ARISTOPHANES.

(10\*) Conf. SCHULZE *hist. medic.* Per. I. f. l. c. III. IV. V. De ISIDE vide DIODORUM l. c. 25. de HEMITHEA V. c. 63. &c.

LIS (1) & NOACHI historia, & vetustissimis de seculo aureo fabulis liquet. Cum vero nihil nisi perfectum (2) immolaretur, neque posset litari, aut placari Numinis ira, quamdiu vel minimus morbus victimam dehonestabat, Sacerdotes solícite inquirere didicerunt in signa integrae sanitatis, & cum viscerum habitum qui de illibata animalis valetudine testaretur, de fausto aut infelici eventu responsuri ex fibrarum integra aut morbida facie.

*Balsamo*] Antiquissimus mos fuit JOSEPHO antiquior; ad quem ritum corpora hominum debebant incidi, viscera eximi, & vacua eorum sedes farciri pasta aromatica: sed id dum solenni ritu fiebat, patefactae sunt saepe arcanae causae saevissimorum morborum, & fundamenta jacta *Anatomes Practicae*. (3) Quis vel conjectura adsequeretur, cor aliquando vera atrophía consumi, nisi sectio Anatomica certo argumento id fieri evicisset? (4)

*Laniena*] Apertis brutorum animalium visceribus, status naturalis viscerum, eorum situs,

(1) GENES. C. IV. 4. & VIII. 20.

(2) LEVITIC. I. V. 3. &c.

(3) Rudis Anatome fuit, quandoquidem abdomini per factum foramen manum inferuerunt, viscera ex obscuro evulsa, cerebrum per nares hamo eductum nunquam nisi lacerata viderunt &c. HERODOT. L. II. p. 135. 136. DIODOR. Sicul. I. C. XCI.

(4) Vid. ad. VII. not. 12.



situs, numerus, figura, & humorum varietas innotuit: Sed & frequentissima bella funestam opportunitatem adtulerunt perveniendi in notitiam musculorum, vasorum majorum, articulationum, ossium: adeo ut sint qui integram anatomen ex HOMERO excerpserint, qui certe vulnerum historias habet (5) perite & Anatomice scriptas.

## §. XII.

*Vivorum*] DEMOCRITUS Phoenicum & Aegyptiorum sapientiam edoctus, vitam longaevam in experimentis consumpsit, (1) & in primis in brutis apertis (2) causas mor-

(5) AENEAM a DIOMEDE lapide percussum ita vulneratum esse, ut ruptis duobus nervis femur continentibus, os intra acetabulum fractum fuerit, *Iliad.* V. conf. etiam vulnus MENELAI a MACHAONE, EURYPILI a PATROCLO curatum *Il.* IV.

(1) PETRON. *Satyr.* p. m. 99.

(2) apud HIPPOCRATES. *Epist. ad DAMAGET.* Volum. Lind. II. p. 941. Verum ibi neque viva secuisse legitur, neque ea Epistola fidem habet. Anatomes equidem Practicae aliud exemplum habet HIPPOCRATES vel quicumque fuerit, sapiens certe AVCTOR I. περὶ ἐπὶ τοῦ νοσήσαντος §. IV. quando in capris & ovibus epilepticis narrat, se reperisse cerebrum male adfectum: aliud fecit ANAXAGORAS, quo superstitionem expli-

morborum quaeſivit eorumque ſedes. (3)  
 Hoc unum maximum fuit Medicinae admi-  
 niculum, quod ſi abſuiſſet, neque HERO-  
 PHILUS lactea vaſa in hoedis, neque du-  
 ctum Thoracicum PECQUETUS, neque  
 ſanguinis in circulum motum HARVEYUS  
 detexiſſet. Duplex autem horum experi-  
 mentorum genus, aliud caſu factum [4],  
 aliud ad datum finem a Philoſophis institu-  
 tum. [5] Mathelin etiam cum Phyſi-  
 cis experimentis conjunxiſſe videtur DEMO-  
 CRITUS, qui ſcripſerit de *gravitate, Elementis,*  
*& vacuo.*

### §. XIII.

**HIPPOCRATES]** Vir feliciſis ingenii,  
 variae doctrinae, edoctus Phyſicam DE-  
 MOCRITEAM, (1) puriſſimam omnium,  
 cujus

plicationem unicornis arietis evertit, &  
 docuit, unicam cerebri cameram fuiſſe  
 quae in cornu abiret *Plutarch. in Pericle:*  
 aliud & antiquius eſt *Ariſtodemii Pauſan.*  
*Meffen. p. m. 217.*

(4) CELS. praef. L. VII.

(5) qualia DEMOCRITI & HIPPOCRATIS  
 fuerunt.

[1] Hoc alii infirmaverunt. *Schulzius Heracliti* prin-  
 cipia ſecutum eſſe defendit p. 209. Cl. col-  
 lega *Gesnerus* proprio ſcripto *Pythagoraeum*  
 fuiſſe. Verum Theoretica ſcripta, in  
 quibus in rerum cauſas excurrit, omnia,  
 ni fallor, ſpuria ſunt, in veris autem  
 monumentis adeo a ratiociniis abſtinuit  
*Hippocrates*, ut primus Medicinam a Phi-  
 loſophia ſeparaſſe dictus ſit *Celſo* in praef.  
 ad L. I.

cujus tria principia, Atomum, Vacuum, & Gravitationem, nostro seculo solidissimis rationibus restituit ISAACUS NEWTON. Natus ex illustri Aesculapii prolapia, (2) medicam avorum doctrinam cum lacte hausit. Observata scholae Cnidiae (3) & Aegyptiorum, per itinera sua fecit. Fortunae opibus valuit, ut qui suo sumtu filium THESSALUM (4) cum armata nave & medicamentis, Atheniensium classi in Siciliam naviganti comitem dederit. Medicorum juniorum (5) sibi subjectas habuit cattervas, a quibus facta experimenta, secum communicata disponderet in suos usus. In ipso medendi opere felicitate mortales omnes superavit, in peste Attica, (6) & Thes-  
italica

(2) ut qui decimus nonus esset ab AESCULAPIO. SORAN. apud LIND. II. p. 951.

(3) EURYPHONTI, qui sententias Cnidas edidit GAL. ad *Epid.* VI. comes fuit in itinere ad Regem PERDICCAM. SORAN. l. c. 952. & satis adparet, eas sententias HIPPOCRATI fuisse notissimas. HERODICUM audivit & GORGIAM. De Itinere in Aegyptum nihil invenio. MELAMPUM & DEMOCRITUM Aegyptum adiisse Sacerdotes apud DIODORUM L. I. c. 96. adfirmant. De HIPPOCRATE nihil addunt.

(4) in libro apocrypho LIND. p. 947. Vix videtur haec narratio fidem invenire.

(5) ex narrationibus filii THESSALI & SORANI p. 945.

(6) confidenter adfirmat GALENUS, vel quicum-

falica pene divinos honores meruit. Anatomē calluit, (7) licet propria scripta de ea re non ediderit. Neque enim per fenestram aliquam corpora humana introspexit, sed per anatomē eorum fabricam didicit omnino: atque invenit, intestinum jejunum cibus vacuum fere reperiri [7\*]. Chirurgiae [8] ita peritus fuit, ut non alia laude

cunque Auctor est libri de *Theriaca ad Pisonem* ed. 1562. Cl. V. p. 194. sed alium est silentium THUCYDIDIS, & suspectam rem facit adfinitas cum simili narratiuncula, quae de JACHINE Aegyptio apud AELIANUM, *fragm.* p. 795. & de ACRONE Agrigentino exstat apud PLUTARCHUM de *Iside & Osiride* p. m. 215.

(7) Negant eum corpora humana secuisse CLERICUS p. 318. & SCHULZIUS p. 225. Sed manifestum est ex locis genuini libri *περι αρθρων* §. I. p. 756. (apud LIND.) Vol. II. & §. XIII. p. 769. corpora humana, & de industria quidem ab eo incisa fuisse, ut qui confirmet tuam sententiam ex anatomico experimento, in quo clavicula occurrit, homini ita pene propria particula, ut ex alio animali eam innotuisse HIPPOCRATI vix videatur. De Osteologia, nemo negat.

(7\*) Exempla longe praestantiora petuntur ex Sceletō Delphico, ad cuius similitudinem PHAYLLUS contabuit, PAUSAN. L. X. ex l. de Venis, & ex locis dictis not. 7.

(8) Scripta de *Vulneribus capitis*, de *Fracluris*, & *Articulis* ordine, veritate, & fide fere superant reliqua scripta HIPPOCRATIS.



de fuerit clarior. Mathemata amasse videtur ex Epistola ad THESSALUM filium [9]. Et quando Philosophiam ad medicinam nihil facere adferuit, de Philosophia dixit morali, in qua sola tunc versabatur Schola PYTHAGORICA. Priscorum Medicorum dogmata curiose didicit, Empiriam cum Analogia, hanc cum severo ratiocinio, primus conjunxit. Historias morborum (10), ex propriis observatis, illustratas experimentis discipulorum, tales condidit, ut nemo melius; & in acutis equidem, Pleuritide, Phrenitide, Angina, aliis ita se gessit, ut vix invenias quod addas aut desideres, neque posterius multum veri subplementi ad nostrum aevum usque adjecerint: Cujus rei experimentum fieri posset, si juxta DURETI indicem colligerentur in unum ea omnia, quae HIPPOCRATES sparsa reliquit; ea vero conferrentur cum iis, quae a reliquis scriptoribus eam in rem dicta sunt. Talis cum esset, conjunctis omnibus subsidiis, haecenus a N. VII. ad XIII. dictis instructissimus, leges Physicas & Mathematicas corpori humano adplicavit castissime, observationes vero in eum ordinem tanta cum ubertate

[9] LIND. p. 934. sed spuria est.

[10] quo spectant L. I. & III. *Epidemicorum*, quos solos genuinos esse declarat GALENUS Comm. in l. περὶ αἰθρῶν III. p. 543. & praecognit. CL. IV. p. 437. & initium L. de acutorum victu, finis enim & male cohaeret & spurius est.

tate congeffit, ut ex illis quidem causas morborum proximas, ex his vero & eventus & curandi rationem deduceret, quo utroque omnis ambitus *Medicinae Dogmaticae* (II) continetur. Opera ejus recensuit EROTIANUS, & longe maxime GALENUS.

### §. XIV.

*Aesclepiadea*] Familia AESCULAPII ad ipsa TIBERII & GALENI tempora (I) masculam HIPPOCRATIS doctrinam conservavit. Omnes hi viri, inaeſtimabili Theſauro obſervationum avitarum inſtructi, & ſuis etiam experimentis divites, docti erant Naturam moderari, vires ejus languentes excitare, nimis valentes frenare. Medicamentorum vires, non ex ſuperſtitioſa traditione,

[II] Dicam quod res mihi eſſe videtur. Chirurgus & Obſervator Clinicus maximus fuit. Theoriam & omiſit, & ſi ſcripto *de vetere Medicina* fides, etiam damnavit. In Anatome, praeter oſſium cognitionem, non curioſus. Medicamenta dura & paradoxa & pauca in uſum vocavit. Vir in univerſum magnus, & nobis etiam utilis, ſed *Medicinae Dogmaticae* non dicendus fundator.

[I] CLAUDIO imperante XENOPHON Cois & Aſclepiadem ſe dixit & Cois, immunitatem impetravit TACIT. Annal. L. XII. ſed verior hiſtoria Aſclepiadarum in HIPPOCRATE IV. vel DRACONE Medico ROXANAE deſinit,

ditione, sed veris, & multorum seculorum experimentis didicerant. Ea vero eorum methodus fuit. Noverant Pleuritidem cum certis conditionibus in sputo, respiratione, calore, dolore sibi observatis, intra triduum in funestum sphacelum abire. Sed observatum fuerat prisco alicui mortali, hominem eo modo laborantem, vulneratum, effuso sanguine donec animo linqueretur (2) saluum evasisse, reliquos periisse. (3) Quare imitati Naturae consilium, sanguinem magna copia emiserunt, admoverunt lenia, (4) aquosa, diluentia, ex communi Acutis omnibus victus ratione. Sed denuo tenebant ex traditione avorum, Pleuritidem cum bona respiratione, sputo crasso, striis sanguineis vario, aliisque in dolore & calore signis, primo die, salutem portendere, eo ergo in casu rem omnem Naturae commiserunt. Venae sectionem enim his cum signis adhibitam noverant sputum suppressisse, morbum effecisse diuturnum, (5) & periculosum.

*Aretaeus*] Ante *Aretaeum* oportet omnino laudare HEROPHILUM (6), & ERASISTRAS-

[2] Haec omnia ex scriptis HIPPOCRATICIS desumpta sunt, & haec quidem particula exstat apud LIND. II. p. 277.

[3] p. 274.

[4] Ptisan. &c. p. 275.

[5] de Morb. L. III. §. 22. p. 112.

[6] Qui Alexandriae Medicinam docuit, GALEN. Admin. Anat. L. IX. sub fin. Venas  
C 200 000 000 albas

STRATUM (7), Anatomes peritissimos ultores. Et HEROPHILUS quidem trecenta hominum cadavera, imo vero hominum suppliciiis dicatorum spirantia corpora (8) dissecurisse dicitur; ut mirum non sit, quod venas albas in mesenterio viderit, idoneus p aeterea testis, Anatomen Graecorum adeo jejunam non fuisse, uti quidem plerique solent existimare. ERASISTRATUS sapientissime vidit, inflammationem tum fieri, quando sanguis ex vasis sanguineis transit in ea vasa, quae solum spiritum vehunt. (8†) Verum pulcherrima ea scripta perierunt in incendio Bibliothecae PTOLEMAEORUM, quod I. CAESARIS tempore

albas ejus GALENUS pro receptis admittit *de usu part.* L. IV. c. XIX. cum easdem, ab ERASISTRATO in hoedis visas, conetur evertere *Admin. Anat.* L. VII. c. ult. Insignis certe Anatomicus fuit HEROPHILUS, in pulsibus curiosior, caeterum pronior in Empiricam Medicinam.

[7] Et ipse Alexandriae medicinam professus, coaevus fere HEROPHILO, systematicus, & hypothesium amans, ut qui venae sectionem damnaverit, in arteriis non sanguinem, sed spiritum esse, nisi per morbum, adseruerit.

[8] Vetus fama, a CELSO jam excepta, a TERTULLIANO mirifice amplificata, vana visa est CLERICO p. 317. neque nobis satis firma videtur.

[8†] CELSUS l. c. & GALENUS passim.



pora accidit. Eam condiderant Reges, primusque PHILADELPHUS, uberrimam certe, & in urbe Regia Professores omnium artium praestantissimos ex publico aluerunt. Alexandriam enim omnis gens Erudita ad studia perficienda ventitabat & Medica praecipue. (8++) Eo etiam GALENUS profectus est (8+++). ATTALUS praeterea PERGAMI rex, & Bibliothecam condidit, & experimenta medica venenorum fecit in hominibus capitis damnatis (8++++). ARETAEUS autem CAPPADOX, edoctus priscorum Graecorum dogmata, primus in systema Medicinam redegit, coactis in unum iis omnibus, quae HIPPOCRATES & alii illustres Medici de quocunque morbo, Pleuritide v. c., reliquerant. Et licet visum sit CLERICO (9), eum post Caesares demum floruisse, antiquissimam tamen doctrinam continet, (10). Deinde ASCLEPI-

ADES

[8++] PHILOTAS *Amphisius* eo se contulit tempore CLEOPATRAE PLUTARCHUS in ANTONIO.

[8+++] De *administr. anat.* L. I. c. I. ll. &c.

[8++++] PLUTARCHUS in DEMETRIO.

[9] Coevum facit VESPASIANO IMP. aut paulo juniorem P. ll. L. IV. c. 3. neque vetustiore WIGGANUS.

[10] Pulcherrimas certe morborum historias, & longe elegantiores rationes curandi, quam quidem vetusti Medici solebant, cum admisto equidem systemate subtili PNEVMATICORUM.

**ADES** *Bithynus*, ipso corporis sui robore usus ad addendam peritiae suae famam, arcana remedia ad morbos repellendos, & vitae longaevitatem obtinendam jactavit. Idem feminam se a morte vitae restituisse gloriatus est, quae videtur passione hysterica laborasse (10\*). Neque dispar vanitate **THESSALUS** (10\*\*), qui medicinae studium in sex mensium spacium contrahebat, ommissa omni Physiologia, ut id unum curaret Medicus, num corpus strictius justo, num laxius foret, adstricturus relaxatum, & strictum laxaturus. Primus autem Latinorum **CELSUS** (11) Hippocraticam doctrinam

[10\*] **APULEIUS Floridor.** L. IV. Videtur **PRAECEPTOR** dicere de **EMPEDOCCLIS** femina *απρυν*. **ASCLEPIADIS** enim historia alia est. Confer le **CLERC.** *hist. Medic.* L. II. P. III. c. IV.

[10\*\*] **CELS.** ab init.

(11) Vixisse videtur imperante **AUGUSTO**, paulo junior **THEMISONE** (**CELS.** **PRAEF.** L. I. & L. III. c. 4.) qui, auditor **Asclepiadis**, hoc vivo libros ediderat, **CAESARIS** aevo (conf. **PLIN.** XXVI. c. 3.) Ipsum autem Medicinam calluisse, adparet ex interpositis judiciis propriis in dissidiis summi momenti (**PRAEF.** l. c. & passim alibi.) Sed & in Chirurgicis propriam sententiam obponit aliis, [L. V. c. 28. L. VII. c. 7.] & de operatione **Ancyloblephari** addit, se non meminisse aliquem sic restitutum fuisse, argumento manifesto, eum **Artis** effectus, & operationes ipsas praesentem, & perpetuo secutum fuisse.

Strinam sua lingua tradidit quam purissime, antiquorum dogmata optime tenuit. Incertum est, num nobili familia natus Medicinam tenuerit ex librorum usu, num vero ipse manu sua medicinam fecerit. Id certum est, & doctissimum fuisse, & liquido ordine omnia digessisse perquam perspicue.

### §. XV.

*Ille*] Peritissimus (1) Dialectices, Philosophiae Peripateticae, Physices, dogmatum vetustorum omnium : ingenio divite & foecundo : scripsit pure & eleganter, & in universum, vere vir magnus fuit. Vixit Imperante SEVERO centesimo nonagesimo anno post C. N. (\*).

*Servitutis*] Omnia turbavit detorquendo purissima HIPPOCRATIS observata ad falsum systema Peripateticorum; & dum cujusvis phaenomeni causas inquisivit, veritatem Praeceptoris figmentis suis obscuravit. Hoc ergo construxit systema, „ Corpora „ fieri ex materie informi, extensa per tres „ dimensiones, & forma substantiali, quae „ materiae det esse tale & cognosci posse. Inter

(1) Vitae magnam partem & interiora mentis ipse GALENUS exposuit in l. de *praecognitione*.

(\*) Ad SEVERI usque tempora vixit, sed floruit tempore ANTONINI, quem febre laborare intellexit, & sanavit, de *praecogn.*

„ Inter conditiones cognoscibiles corporum,  
 „ esse quatuor *Qualitates* (2) radicales five  
 „ primarias, calidum, frigidum, humidum  
 „ & ficcum, ex quibus omnis actio cor-  
 „ porum explicetur. Inde nasci *Elementa*  
 „ primigenia (3), ignem five calidum &  
 „ ficcum, aërem five calidum & humidum,  
 „ aquam five frigidum & humidum, ter-  
 „ ram five frigidum & ficcum. Quae  
 „ qualitates determinant naturam omnium  
 „ corporum, in quibus elementa quatuor,  
 „ jam enumerata, adsunt. Sed in corpore  
 „ humano (4) *humores* adesse primigenios  
 „ quatuor, bilem, quae respondeat igni,  
 „ calido & ficco; sanguinem, similem aëri  
 „ humido & calido; phlegma, adfine a-  
 „ quae frigidae & humidae; atram bi-  
 „ lem, frigidam & ficcam, qualis est terra.  
 „ Sed ex his humoribus inter se compositis,  
 „ atque servantibus suorum elementorum  
 „ qualitates, nasci *Temperamenta*. Atque  
 „ porro gradus harum qualitatum esse va-  
 „ rios, ut eadem semper, sed magis sint  
 „ intensae, aut remissiores. Itaque in Ca-  
 „ lore quatuor adesse *gradus*. Primus, qui  
 „ natu-

(2) Vid. GALEN. *de Elementis*, L. I. c. 6. ubi  
 Elementa a qualitatibus distinguit, male  
 confusa a discipulo ATHENAEI Pnev-  
 matici.

(3) Pene eadem *de Elementis* L. I. c. V. *ad fin.*  
 & c. IX.

(4) Conf. *de Elementis* P. II. c. I. & II. *de atr.*  
*Bil.* c. V. & quod ad *Temperamenta*, Cap.  
 I. L. I. *de Temperam.*



„ naturalem calorem alat ; Secundus faciat  
 „ febrem ; Tertius inflammationem ; Quar-  
 „ tus sphacelum & conbustionem. Sed &  
 „ plane easdem esse vires medicamentor-  
 „ rum (5), & ea non solum easdem Qua-  
 „ litates habere, sed & consimiles Quali-  
 „ tatum gradus. Ita quae calida forent  
 „ potentia, non actu, (haec enim erat di-  
 „ versitas superior,) ea si sint calida pri-  
 „ mo gradu, restituere calorem vitalem  
 „ humani corporis ; si secundo, febrem face-  
 „ re ; si tertio, inflammationem ; si quarto,  
 „ sphacelum. Quare summa medicinae in  
 „ eo ponebatur, ut & morbi & Medica-  
 „ mentorum Qualitates & gradus (6) rite  
 „ percepta haberemus. Namque postquam  
 „ cognitum erat, in febre Quartana frigus  
 „ fere ad quartum gradum adscendere, ca-  
 „ lorem vix in sesquitertio gradu adesse, &  
 „ morbum solo sesquialtero a summo fri-  
 „ gore distare, eademque ratione frigidam  
 „ pituitam superare igneam bilem ; utique  
 „ exhibenda erant medicamenta sesquitertio  
 „ gradu calentia, quae mediocritatem salu-  
 „ brem restituerent, Theriaca &c. Inde in  
 „ formulis, calidissimum Euphorbium  
 „ corrigebant Opio, quod ipsis summe  
 „ frigidum erat. „ Egregiam certe Artem,  
 „ & quae ad calculum facillime reducatur,  
 „ nisi

(5) De *simpl. Medicam. facult.* init. L. l.

(6) L. c. de *simpl. facult.* c. XXV. & totis L. VI.  
 VII. adusque XL.

nisi vana esset, & subtilitatem suam superstrueret mentis cogitabundae figmentis.

*Emolumenta*] Plurimum adtulit Arti, quod cum Veterum doctrinam fere omnem adcurate teneret, peritissimus esset Scriptorum HIPPOCRATIS, HEROPHILI, ERASISTRATI, ASCLEPIADIS, EMPIRICORVM, METHODICORVM, plurima nobis monumenta conservaverit, quae non alibi exstant; quod morbos, & pulsus, & infirmitates raras visu ex amplissima Praxi apte consignaverit, quod sparsa monumenta, quaecunque ad unum morbum spectabant, in unum caput propriosque titulos ex innumerabilibus libris contraxerit, & in univertis partibus Medicinae, ordine concinno systema reliquerit, pene omnium quae eo aevo hominibus nota erant (7).

*Damni*] Theoria GALENI tota nititur fundamentis, quae ipsa imaginationi superstructa sunt, & subtilitate Metaphysica, quae posteros ad classes rerum & abstracta abduxit, natura interim elabente ex manibus eorum qui nebulas captabant. Facultates certe rerum minime sufficientes ponit.

Aqua

- (7) Integrum, quam late patet, Medicinae ambitum complexus est, Disciplinas quae Artem praecedunt, Anatomen, Botanices partem Medicam, Physiologiam, Pathologiam, Semejoticen, Methodum Medendi, Pharmaciam, Chirurgiam, uberrime omnia, ita ut nemo mortalium, post eum, similem laborem vel votis adgressus sit.

Aqua fortis, neque calore, neque frigore, neque alia facultate ex Galenicis agit, sed sale quo ebria est. Sed & Mercurius Siphylidem expugnat, viribus, quae a classibus Galenicis longe remotae sunt. Gradus morborum & medicamentorum non ex cognita Natura, sed ex rapidissima vividae mentis speculatione disposuit. Sola certe nimis felici (8) imaginatione plus nocuit Arti, quam quidem cognitione Veterum, & longaeva Praxi, & Materiae Medicae scientia profuit unquam.

§. XVI.

Ab ipso GALENI tempore, Ars incrementa nulla sumsit, (1) posteriores enim Medi-

[8] Id damnorum maximum fuit, quod posterius perculsi eruditione & eloquentia GALENI, in iis adquieverint, quae a GALENO acceperant, & de augenda arte ne cogitaverint quidem, quam dudum perfectam esse serio existimabant. Quod de Anatomie, & de Theoria Medica, & de medicamentorum viribus, per quatuordecim fere secula verum est.

[1] Ea tempora descripsit Cl. FREIND. Solent vero nobis quinque in primis Medici, post GALENUM, in manibus versari: CAELIUS AURELIANUS, Methodicus, qui in SORANI libris latine redditis, plurima Antiquitatis monumenta nobis conservavit; ORIBASIUS, amicus JULIANI AUG. qui & ipse multa ex deperditis libris in Colle-

lio-

Medici pene omnes, unicam laudem quae-  
siverunt, ut scripta GALENI vel con-  
mentariis augerent, vel contraherent in  
conpendia.

*Deletis*] Imperiorum destructionem sem-  
per sequitur Artium interitus. Dudum ab-  
olita erat sapientia Orientalis: in Aegypto  
artes & medicina viguerant sub prioribus  
PTOLEMAEIS (2), & afflictæ incendio bi-  
bliothecae sexcentorum voluminum, quod  
sub JULIO CAESARE contigit, conser-  
vatae sunt precibus AREI & AU-  
GUSTI clementia: Sed sensim elangue-  
runt, cum omnes eximii artium profello-  
res Romam se conferrent, & cum Imperii  
viribus artes elanguescerent. Sed seculo a C.  
N. quinto, septentrio agmina barbarorum  
in orbem cultiorem effudit, qui reliquias  
artium deleverunt. Feroces enim populi, i-  
gnotas sibi disciplinas contemptui habebant,  
dissipabant scholas, inflammabant cum ipsis  
urbibus bibliothecas: Infelici aevo, mor-  
tales de vita solliciti, ad ornamenta sa-  
pientiae desierunt adspirare. Lingua lati-  
na

*ctionibus* suis habet, ad Praxin, Anatomen,  
Materiam Medicam spectantia; AETIUS  
Chirurgiae peritus, formulis addictior; A-  
LEXANDER TRALLIANUS, insignis Au-  
ctor in descriptionibus morborum, neque  
miscendus compilatoribus; PAULUS AE-  
GINETA, Chirurgiae uberrimus auctor in-  
ter antiquos.

[2] Et ipsa CLEOPATRA, ingeniosa femina, &  
Medicinae studiosa. PLUTARCH. in *An-  
ton.*



na prima periit Longobardis Italiā te-  
nentibus, foedata connubio cum peregrinis  
vocibus, & Europam universam vasta bar-  
baries late occupavit. Septimo deinde secu-  
lo MAHOMET (3) novam religionem  
condidit, ex ipsis suis legibus inimicam  
bonis artibus. (4) Et brevi quidem nova  
secta Palaestina, Arabia, Aegypto, Assy-  
ria potita est, Linguamque suam Arabi-  
cam, sacram & litteratam praetulit, omnibus,  
in eam transtulit (5) optima Veterum  
Graecorum documenta, eademque Artes  
tradere caepit. Caliphae, summi sacerdotes,  
utraque potestate potiti, per Africam, Asiam  
& Europam late imperitaverunt, eandem  
sententiam secuti, ut, destructis reliquis lin-  
guis, suam ornarent.

*Nono*] Seculo nono (6) Hispania, in quam  
Artes humaniores confugerant, a Saracenis  
Africanis subacta est. Atque tunc quidem,  
parta victoriis pace fruens gens alioquin in-  
geniosa, paulatim Graecorum libros didicit  
evolvere: Arabice tunc loqui coeperunt HIP-  
POCRATES (7), ARISTOTELES (8), GALE-  
NUS,

[3] Medicinae peritus, etiam *Aphorismos Medicos*  
scripsit FREIND L. II. init.

[4] Destructa Alexandria scholam in urbem Har-  
ran transtulerunt seculo octavo.

[5] Seculo septimo Freind L. II. init.

[6] Octavo, regnante Roderico Gotho, ad annum  
714.

[7] Hos & alios *Honain* Arabice reddidit, juben-  
te *Almamone*, septimo Abassidarum, qui  
Calipha Bagdadensium fuit. Freind p. 228.  
*Edit. Paris.*

[8] Miram historiam vid. apud Freind l. c. ib.

NUS, & gens universa circa annum millesimum ita exarsit amore litterarum, ut in urbe MAROCCO conderetur insignis schola, publico sumtu alerentur studiosi, bibliotheca colligeretur, tanta cupiditate, ut Rex ipse & Pontifex lectionibus praesidere non haberat dedecori. [9] Tunc vero aliquin subtilis & meditatunda gens Arabum, nimis subtilia GALENI systemata ita acuta reddidit, ut mentes hominum, rerum oblitae, circa meras ideas versarentur, atque abstractos conceptus amplexarentur [10], similes IXIONIS. Veritatem omnem quaerebant in ARISTOTELE, subinde in GALENO; hos auctores quando aliquis suis opinionibus favere demonstraverat, vicerat omnium consensu. Anatomen [11] ne adtigerunt quidem, parum profecerunt in Praxi [12]; in Chirurgicis & Botanicis [13] paulo curiosiores. Chemiam etiam, vel primi in Europam adduxerunt, vel certe au-

[9] Hoc Freind de *Almàmone*, qui & ipse scholam condidit Bagdadi, p. 227.

[10] Pro exemplo sint computationes morborum & medicamentorum *Alkindi de gradib. rer.*

[11] Quum ne adtingere quidem auderent corpora vita destituta. v. Freind l. c. p. 279.

[12] Graecorum fere compilatores, morborum auctorum tamen aptiores curationes invenerunt.

[13] Aromatum & mitiorum purgantium (Manna, Sennae, Cassiae, Rheibarbarici) utillem efficaciam in vulgus notiozem fecerunt.

xerunt insigniter [13\*]. Pharmaciam subiecerunt medicinae, ita novam artem suamque, ut pleraeque compositiones nomina Arabum fervent, syrupus a סרפס succo, Julepus a ילל aqua rosarum cor refrigerante, nostris etiam temporibus nominum origines deducant. Arabum Principes fuerunt RHASES [14], AVENZOAR [15], AVICENNA [16], AVERRHOES [17], & in Pharmaceuticis MESVE [18]. Ea fama Arabum, qui *Toleti* [19] & *Cordubae* medicinam profitebantur, movit per universam Europam eruditos homines, ut in Hispaniae parte, quae Mauris parebat, artes addiscerent, atque inter eas non minime lucrosam medicinam. Hi Arabum libros in Italiam

[13\*] *Freind. histor. medic. in Actuar.*

[14] Purior, propiorque Graecis, seculo X. *Freind.*

[15] Arabum Hispanorum princeps, & ipse medicus dogmaticus. *Freind. p. 244.*

[16] Medicus mediocris, [*Freind. p. 243.*] insignis Philosophus, & subtilis interpres Metaphysices. v. vitam *Hai Ebn Jockthan.*

[17] Commentator *Aristotelis*, qui prae reliquis medicinam subtili theoria Peripateticorum obscuravit. *Freind. p. 254.*

[18] Christianus, sed qui in aula *Aaronis al Raschid* medicinam fecit. Pseud-Epigrapha ejus notat *Freind p. 233.* & eundem esse cum *Jano Damasceno* existimat *Cl. Hahn.*

[19] Quae celebris *Schola* dicta *Freind p. 254.* originem dedit recepto rumori,, In caverna prope *Toletum* Daemones Artes profiteri, qui tardissimos discipulorum pro mercede sint habituri proprios,,

liam adduxerunt, cum vix alios invenire daretur, ignarae plebis vana opinione pro Magis passim habiti, ut qui ultra humani ingenii modulum eruditi viderentur.

### § XVII.

*Donec*] Interea Hispani Medici, dum gens eorum patriam paulatim recuperat, litterarum amorem cum Italis communicaverunt. Qui in schola Patavina [1] publice Arabes interpretari inceperunt, & seculo XIII. in-eunte *GALENUM* latine reddiderunt. Vinci coepit barbaries, sed lente, omnibus mortalibus obcoecatis praestigiatrice illa Peripateticorum scientia.

*Emanuel* [2] Toto illo seculo XV. infelices Graeci fugientes patriae suae ruinam, linguam suam & fontes verae eruditionis, Antiquorum monumenta, tanquam Penates deos (3), in Italiam adtulerunt. Tunc 4 in-

(1) Salerni, in schola a *Carolo M.* condita, seculo XI. *Constantinus Africanus* Arabes interpretatus est. *Freind.* p. 283.

(2) Hi, quos *Boerhaavius* nominat, Grammatici fuerunt & eorum unus, *Theodorus Gaza*, *Theophrastum* latine reddidit, audacius quam vere.

(3) Edidit *Aldus Theophrastum* & *Aristotelem* anno 1499. *Dioscoridem* 1506. *Galenum* 1525. *Hippocratem* 1526. *Paulum* 1528.

(4) Seculo inprimis XVI. quæ Hippocratica secta in Gallia nata est, auctore *Sylvio* & *Brisfeto*, quos diversa paululum via *Fernelius* secutus est, deinde *Hollerius*, *Baillon*, *Duretus*, & horum discipuli *Pietreus*, *Jacotius*, *Heurnius*, *Foesius*, eandem doctrinam exornaverunt.



instaurata] HIPPOCRATIS veneratio, qui pro novo libro habebatur, cum GALENO solo ARABES usi fuissent, & in eum praelectum in Gallia, ubi haecenus AVICENNAM interpretati erant. Tunc etiam GALENUS ex vastis Arabum voluminibus tandem emerfit (5), ut solus & purus prodiret. Tunc etiam latinae linguae prisca puritas reddita est, & simul novus veri & pulchri amor pectora mortalium incendit: Jamque purior Arabibus visus est GALENUS, GALENO purior HIPPOCRATES: Cujus in scriptis, & in propria experientia arma invenerunt FERNELIUS (6) & DURETUS (7), quibus Arabum servitutem profligarent: Atque sic renata est dogmatica medicina (8), usque arti salutari rediit splendor.

*Chemicorum*] In monasteriis primi vixerunt. Homines ociosi, apud quos, & solos quidem, aliqua literarum memoria superstes manserat, ceperant de auro conficiendo consilia agita-

[5] Ut initio seculi XVI. fere in oblivionem abiverit, querente apud *Clericum* p. 383.

*Cornario*. Sed meliora docuerunt *Montanus*, *Mercurialis*, *Guinterus Andernacensis*, *Fuchsius*, *Linacer* Chalcondylae Discipulus, &c.

(6) Practicus felicissimus, purissimae dictionis, acris ingenii, & qui novas vias auderet terere, Archiater Gallicus.

(7) Doctissimus *Hipp.* commentator.

(8) Cum primus *Ballonius Ephemerides*, sive constitutionum morbosarum & morborum historias, prisca Graecia dignas ederet.

agitare. Primus **BASILIVS VALENTINVS** anno 1400. Chemiam ad Medicinam adplicavit. Deinde natus anno 1494. **VE-SALII** fere tempore [9] floruit **Basilae PARACELSVS** Helvetus [10], qui **Arabum & Galenicorum** doctas disputationes vero effectu destitutas, pariter detestatus, novae sectae auctor fuit: cujus intra paucos annos tanta fuit auctoritas, (11) ut apud principes Germaniae vix alius nisi **Chemicus** intimae admissionis medicus constitueretur. Ipse famam fere debet usui **mercurii**, quem cum **CARPO** solus audebat exhibere, eo aevo, quo **Lues Venerea** crudelissime saeviit. Itaque, dum in Gallia **Hippocratici Arabes** evertunt, in Germania, aliis armis, iidem **Arabes** expugnantur. Sed magis adhuc perspicue vulnera scholarum, & hypothesium **GALENICARVM** ruinas (12)

(9) **Physicen & Medicinam** publice docuit **Basilae a. 1527. le Clerc. p. 799.**

(10) Non in pago *Einsidlen*, quae recepta fama est; sed in **Abbatiscellana** ditione natus, uti ex certis documentis sibi constare monuit *Cl. Zelweger. M, D.*

(11) Cum ignotis in Germania medicamentis, opio, mercurio, turpetho morbos expugnaret, debilibus **Arabum** formulis inexpugnabiles. Successibus enim non caruisse, non ex *Epitaphio* solum colligo, sed ex subnascente in summa inopia pecuniae vi, quam bonus *Oporinus*, verorum fontium ignarus, **Daemoni** adceptam ferebat.

(12) detexit seculo XVII. ineunte IOH. BAPT. HELMONTIUS, ipse ex propriis experimentis, & vivido ingenio audacior, Physica & GALENI sententias pulchre edoctus, VESALIANAE anatomes non ignarus, facile vidit, neque rudem anatomes & Medicinae PARACELSUM, neque verbosas scholas, rerum oblitus, viam ad veritatem demonstrare posse. Verum hoc remedium pene malo pejus fuit. Chemia enim ita Medicinam subegit, (13) ut ab ea sola & theoriam & fiduciam medendi peteret: neque alia deterior fuit medicinae servitus. Post HELMONTIUM FRANCISCUS SYLVIVS de le BOE primus in Academiam LUGDUNOBATAVAM Chemiam introduxit, & persuasit CURATORIBUS, ut exstruerent publicum, ut vocant, *Laboratorium*. Egregia certe ancilla Medicinae *Chemia* est, non alia peior domina.

## CAR-

[12] Multis ex professo scriptis dissertationibus, acris & contentiosi ingenii homo, arcaniorum laborum Chemiae non ignarus, sed mediocris omnino Medicus. BOERH. *Elem. Chem.* I. p. 24. seqq.

[13] Cum causas, tempora & mutationes morborum negligerent, medicamentis suis perpetuam & universalem efficaciam tribuerent, mitissima, sed in acutis longe potiora vegetabilia penitus omitterent, &c. Caeterum ante *Paracelsum* verae & masculae Chemiae princeps auctor fuit *Rogerius Baco*. v. *Freind*, II. p. 287.

*CARPI* (14) ] *Anatomen* etiam in *Italia* ipso opere ex postliminio exercere coeperunt. Primus a. 1450. *MUNDINUS* [14\*] *anatomen* edidit. Post eum *JAC. CARPUS*, idem qui ex usu *Mercurii* in lue *Venerea* primum invento, & gloriam & divitias non mediocres adquisivit, multis brutorum animalium, & hominum etiam sectionibus sedulam operam dedit: atque in *MUNDINUM commentaria* (15), propriamque praeterea *Anatomen* (16) edidit, rarissimam, quam nuper ex *Italia* acceptam cum multa mea voluptate legi (a. 1731.) Anno vero 1539. scribere cepit *VESALIUS*, restaurator *Anatomes*.

### §. XIIIX.

*Harvejus*] *Monstrorum & medicae vanitatis*

[14] ] *JACOBUS BERENGARIUS CARPENSIS*, qui *mercurio* in *Lue Venerea* primus videtur usus esse. *Chirurgus & Anatomicus* insignis, corpus humanum diu neglectum consuluit, primus etiam icones *Anatomicas* paravit. Quem, eodem *XVI. seculo* secuti sunt plurimi & insignes, *ANDREAS VESALIUS*, *BARTHOLOMAEUS EUSTACHIUS*, *GABRIEL FALLOPIUS* &c.

[14\*] Legendum 1315. *FREIND* &c. *Rudis* erat *Anatome*, sed aliqua, quae nulla fuerat.

[15] *Spissum opus editum Bonon. 1521.*

[16] *Isagogae util. in Anat. Bonon. 1523.* In utroque non pauca vera & recentioribus anatomicis minus cognita reperiuntur.



nitatis debellator, editis immortalibus scriptis, de *Circulatione sanguinis*, & de *generatione animalium*, demonstravit, „Hominem esse ens Physicum, cujus omnia, adtributa pendent a sanguinis motu in, circulum, omnia pereunt eo solo de, structo. „ Quo solo ex ipsis fundamentis subruta est omnis **GALENICORUM & CHEMICORVM** Theoria, & ex omni Veterum sapientia, id solum mansit (1) superstes, quod experiendo didicerant. Et omnino potest Medicina dividi, ut alia sit *antiqua* ante **HARVEIUM**, alia recentior post **HARVEI** tempora: Ea enim felicitate usus est, ut ante vitae finem omnes medicos sententiam suam amplexos viderit. **HIPPOCRATES** enim, cautus observator, causarum

[1] Non quidem ideo temperatum est ab hypotheseis. Invento **HARVEI** abusus est ad novas Theorias **CARTESIUS**; neque timidius **Archei**, **Fermenta**, **Cribra**, **Aether peregrinus** in Medicinam irruerunt. Et ornatio quidem secta **SYLVII**, ex acido, Spirituum animalium (**Dissert. VIII. 42.**) & Lymphae, ib. atque Salivae & Succu Pancreatici (**VIII. 52. 53.**) effervescentia cum alcalina bile (**Diss. X. inpr. 54. 55. 56.**) praeparationem Chyli, (**Diss. II.**) & motum Cordis (**Diss. X. l. c.**) atque naturam febrium intermittentium, (**Prax. Med. l. c. 24.**) explicavit. Ut de **DOLAE**O, **HAVERSIO**, **WILLISIO**, aliisque conjecturarum amantibus Medicis fusi non simus.

farum unice securus, phaenomena sola nobis reliquit; neque contrarius est HIPPOCRATI HARVEIUS, sed commentator.

### §. XIX.

*Libera]* Liberam (1) nempe ab omni secta possidere potest, qui rejectis omnibus, quae absque demonstratione dicta sunt, id omne colligit, & solum, quod Veteres & Recentiores solide & absque dubio verum reliquerunt. HIPPOCRATES absque secta fuit, nihil enim proposuit, nisi quod necessario ab omnibus admitteretur. Medicus Italus misit ad me exiguum libellum, cui titulum fecerat „ *Piccola arte Medica*: in eo congesta erant in breve compendium, quaecunque indubitatae fidei Propositiones apud Medicos possunt pro axiomatibus haberi. Ad idem studium excito vos, quantum, possum AUDITORES, non alia ratione longius proferetis artem.

*Secta]* Hac voce intelligimus opinionem probabilem, quae a multis hominibus recepta, non tamen adeo evidens est, ut quivis sana mente praeditus, & artis suae gnarus, eam cogatur admittere. Sed omne id, quod  
ad

[1] Liberam ab hypothese nemo mortalium coluit, gradu solo differunt. Nostro aevo, Itali & Angli subtiles hypotheses ornaverunt, STAHLIANI a MECHANICIS, hi inter se invicem dissentiunt. Sed possent, si artem brevem, hiulcam, neque connexam non despicerent.

ad Sectam pertinet, summo opere debet ab observatione distingui. In augmento febris ardentis maximus adest calor : observatum hoc & evidens. Sed hunc calorem oriri dicit **GALENVS** a bilis excessu; **CHEMICI** ex abundantia sulfuris; **HELMONTIVS** a furore Archaei; haec omnia incerta sunt, ad sectam pertinent, debent rejici, ut artem servemus puram, masculam, sui securam: servandum id solum, quod observatum est, vel ex observatione sequitur adeo evidenter, ut a nemine gnaro & cordato dici possit, non sequi. Habemus experimenta Physica, Mechanica, Anatomica, Botanica, Chemica, Practica, ea omnino debemus admittere, hac tenus qua experimenta sunt, neque adjicienda datis, nisi quae ex ipsis deducuntur severa lege ratiocinii. Anatomice vera sunt omnia, quae in praesente cadavere vidit exercitatus Prosector, ea in **GALENI** scriptis vera fuerunt, & vera manebunt posteris. Quamprimum ad usum partium progredimur, errare possumus, & nimis saepe solemus. Chemia narrat mutationes corporum, inter se, & cum igne conpositorum; dum experimenta narrat nunquam fallax. Eadem a phaenomenis alicujus corporis ad phaenomena alterius, & ad corpus humanum concludens, fallitur plerumque. Ut si salem fixum **TACHENIANUM** dicat ad hydropis initia valere, recte facit: si rationem explicet, quo operatur, omnino falli potest. In Botanicis, genera & characteres veri a Creatore plantis insculpti sunt primaevi, nulla un-

quam mutatione egentes; sed arbitrarii characteres, sed vires, fallere possunt. Physice, phaenomena caste recensens, meretur venerationem nostram; in causis plerumque evilescit, labitur in hypothesein, & in eum, qui proximus est, errorem. Mechanices leges, aeternae & perpetuae sunt; sed eas quando adplicat ad corpora non satis cognita, seducitur. Sit exemplum in lapide Magnete. Novimus corpora sublunaria gravitare, haec lex est perpetua, neque Magnes excipitur. Verum ex gravitatis legibus si velis exponere propriam naturam magnetis, falleris omnino, quia vires singulares possidet, a gravitatis classe remotissimas: neque enim cadet magnes, delapsus libere, si magnes in vicinia positus sit, ad amicos Polos obversus. Practica docet curationes morborum, perpetuas, ab HIPPOCRATIS aevo easdem, nunquam futuras ab HIPPOCRATICIS diversas. Sed eas curationes, si ad morbum alium, ex signorum negligentia falso nomine notum, si ad ejusdem morbi alia tempora admoveas, errabis denuo. Quare in ea re nos avis nostris feliciores nobis esse videmur, quod nulla auctoritate seducti ad errores, ea tantum admittamus, quae ut admittat, vis veritatis liberrimam voluntatem cogit; quae nempe experimento constiterunt, vel ita ab experimento fluunt, ut evidendae repugnare non possimus.

*Promota*] Multum ad augendam artem contulerunt commercia literaria, post constitutu-



stitutos nuncios (2) publicos | faciliora ; experimenta (3) per inventas machinas omnis generis multo certiora, & veram naturam profundius evolventia ; societates demum Litterariae, ad incrementa Physices, Historiae Naturalis, Artisq[ue] Medicae institutae, LONDINENSIS [4] & PARISINA [5].

Ana-

- (2) Quorum expedita itinera & certio rem operam debemus Cardinali ARMANDO RICHELIEV. Sed huc etiam magis spectant *Diaria Erudita*, quibus novorum librorum vera pretia & potiora momenta singulo mense publici juris fiunt, additis observationibus brevioribus, & impatientibus morae, alioquin plerumque intermorituris aliis laboribus. Princeps fuit *le Journal des Savans* anno 1665. deinde vigent adhuc *Acta Eruditorum Lipsiensia* ab anno 1682. reliqua Diaria, innumera fere, brevis aevi fuerunt.
- (3) Antlia Pneumatica, Injectio materiae ceraceae a SWAMMERDAMIO circa annum 1670. inventa, Microscopiorum usus perfectus a LEUWENHOECKIO, Plantarum exoticarum cultura per hortulanos Belgas &c.
- (4) Oxonii primo coivit, mox LONDINUM translata. Cepit *Transactiones* suas edere anno 1665. vetustissima sororum.
- (5) Quae anno 1666. condita, cum elanguesceret, ad novas leges reformatata anno 1699. ab eo tempore selectas sociorum dissertationes quotannis edit. Huc *Leopoldina Naturae Curiosorum*, quae anno 1670. edendorum actorum initium fecit, Berolinensis,

*Anatomica*] Nihil quidquam in iis incerti est, dum fabricam, situm, vicinias partium narrat. Motus liquidorum partiumque utilitates si addiderit *Anatomicus*, & ultra limites egreditur, & erroris subit periculum (6).

*Botanica*] Multum facit ad medicinae certitudinem. Ea docet in plantis signa, ex quibus quaelibet ab omni alia separari potest. Adeo vero promota est, duobus retro seculis, ut eadem alacritate si incrementa

*sis*, condita anno 1701. *Petropolitana*, cuius Acta ab anno 1725. prodeunt, *Bononiensis* MARSIGLIANA &c.

- (6) Post duo retro secula, conditae sunt scholae *Anatomicae* plurimae, & frequentia cadaverum insigniter aucta. Inde & inventorum insignium numerus, & vera partium historia, certior & uberior. Vasa Lactea anno 1622. a CASP. ASELLIO, sanguinis in circulum motus ab HARVEIO 1627. Vasa Lymphatica, post 1650. a RUDBECKIO & BARTHO-LINO. Ductus Thoracicus a PECQUETO 1652. Pancreaticus a M. HOFMANNO & VIRSUNGO 1641. Ductus Salivales, primus a WHARTHONO post 1652. deinde STENONIANUS 1661., Sublingualis a RIVINO 1678. fabrica aurium a DUVERNEYO 1683. nervi a VIEUSSENIO 1685. vasa & viscerum structura a RUY-SCHIO, musculi a COWPERO deinde & a DOUGLASSIO, & ALBINO, universus ambitus Anatomies a variis, neque hic enumerandis.

menta sumferit, intra exiguum temporis ad perfectionem perventura videatur. Certe mirifica hic praestitit **PETRUS ANTONIVS MICHELI**, multa etiam **VAILLANTIUS** (7).

*Phy-*

- (7) Veterum stirpes paucissimae, earumque cognitio Empirica fuit. **HIPPOCRATES** fere 300. *Galenus* 600. stirpes cognitae habuerunt. Nos, pene bis tot genera constituta habemus, species ad 20000. *Tournefortius* certe uno itinere 1356. plantas prioribus addidit. *Hermannus* haud paulo plures, *Michelius* ultra mille, easque omnes ex generibus pene ignotis & pro derelictis habitis. Namque horti conditi, itinera per universum orbem suscepta, Icones pulcherrimae paratae, commercia seminum inita, inventa ratio propagandi stirpes dissitarum regionum, totidem fuerunt subsidia, quibus Botanice ita aucta est, ut se ipsam non agnoscat: Nova etiam & efficacissima medicamenta subpeditavit; Sed methodus in primis seculo praeterito nata est, cujus ea est vis, ut examinata stirpe qualibet, protinus ex 20000. stirpibus 19000. rejiciamus, inter quas non est, deinde per aliam notam ex 1000, 900. alias, demumque inter centum; optio paucissimis horae minutis ad pauculas aliquas redeat. Eam adumbravit *Caesalpinus*, & imitator ejus *Morisonus*, ornavit *Hermannus* in systema plenius finxit *Tournefortius*, notis certioribus ditavit *Linnaeus*, addiderunt alii varia, ut incipiamus speciem aliquam perfectionis quasi e longinquo conspicere.

*Physice*] *Physica alia experimentalis est*, quae solas enarrat apparitiones in corporibus quibuscunque sensibus observatas. v. g. *Aurum ponderosissimum esse*, & decies novies gravius aqua; aurum solvi a mercurio &c. Haec *Physica non fallit*: Altera *rationalis est*, quae ex proprietatibus per experimenta cognititis aliquas proprietates ratiocinio deducit, quae sensibus & experimento cognosci non possunt. Haec fallere potest. Nitrum & Sulfur ad ignem detonare vi valida, certum est. Eandem esse rationem fragoris, quem in tonitru percimus, incertum, imo vero falsum est.

*Mechanica*] Nihil evidentius, quam effata generalia *Mechanices*, nihil fallacius, quam ea, quae ex his ipsis effatis de corpore humano pronunciant *Mechanici*. Nempe, *Physica & mechanica scientia*, id sibi proponunt, ut experimenta faciant in corporibus, & ex consensu experimentorum concludant ad regulas universales, comprehendentes nempe omnia corpora in quibus experimenta facta sunt. Si dixerim corpus ex data altitudine delapsum, acquirit re-locitatem datam,, Momenta illapsuum esse aequalia conposito ex massa & velocitate,, hinc deducam inpetum corporis duri ex data altitudine delapsi in corpus quodlibet, nullo modo certe errorem potero admisisse. Verum sancte & sollicitè cavendum est, ne unquam lege illa corpora comprehendantur, in quibus experimenta non sunt facta. Poterit lex aliqua in mille corporibus obtinere, in proximo exceptionem pati. Inde illi, dede-



dedecorosi certe in Mathematicis (8) errores, eorum, qui Theoremata de corporibus definitae indolis ad corpus humanum transtulerunt. Quae enim de vasis infinite resistentibus, de liquido non compressibili, non viscido, dicta sunt, in vasis nostris flexilibus & elasticis, atque humoribus compressionem recipientibus viscidisque, vera esse non possunt. Non recte ergo ΜΙΗΙ imputant, quod medica phaenomena omnia mechanice explicanda esse sentiam. Ab ea certe opinione longissime remotus sum, qui ne in simplicibus quidem corporibus leges universales sufficere ad singularem apparitionum explicationes persuasum habeo: tantum abest ut sufficere existimem in compositissimo corporum, humano.

*Chemica* (9) ] *CHEMIA* est observatio  
muta-

- (8) Inde ille dissensus Mathematicorum, qui profanis calumniandi causam praebet. *J. A. Borellus* ad movendas viginti libras sanguinis requirit vim 180, 000. librarum, *Keilius* libram unam ad movendas libras 100. quarum conclusionum ratio est, uti 1. ad 900, 000. *JURINUS* utraque hypothesis rejecta, vim Cordis facit aequalem libris triginta cum semisse; hunc vide *Philos. Trans. abr. Vol. IV. P. II. p. 85. Borellum de motu anim. P. II. Prop. LXXXII. Keilium Tentam. Phys. de vi cord. p. 43. ed. Lugd. Bat.*

- (9) *Graeci* *Chemiam* vix attigerunt, *Arabes*  
pau-

mutationum, quae ex ignis certo gradu admoto oriuntur in corporibus variis. Quamdiu experimenta narrat, fida est, ratiocinio melius abstinet. Antimonii uncia una adsumpta, leniter alvum ducit, calx ejus vehementissimum vomitum movet. Apparitio certa est, explicatio vaga, & arbitraria. Si observaveris ea, quae igne admoto ex sanguine prodeunt, atque ponas, certo gradu caloris ex sanguine adscendere Aquam, sal, oleum, & remanere in vase terram (CCXXVII.) non poteris falli. Si ratiocinii celeritate deducas,, esse ergo in sanguine & tales sales, & talia olea, jam praetergressus experimenta poteris errare. Chemicus, si explicet phaenomena, Rhetora aut Philosophum agit, personae Chemici oblitus.

*Causis*] Pleraque ingenia melioris notae id habent vitii, quod omnium rerum cognitio-

paulatim. Adolevit in seculis quae ultima Barbarorum fuerunt, Empirica, sed experimentorum difficilium dives. Caput extulit sub *Paracelso*, & sesquiseculo late per Medicinam regnavit, ipsis etiam *Graecorum* adseclis clanculum potentiores Chemiam in medendo invocantibus. Primus a fordido lucro, & vana divitiarum cupidine eam ad indagandam naturam corporum advocavit *Boyleus*, post quem Philosophicis usibus ministrare cepit, auctoribus *Homborgio*, *Hofmanno*, *Stahl*, & *Boerhaavio*, quo nemo difficiliore labores suscepit, nemo remotas elementorum naturas adspexit propius.

gnitionem per causas moliantur. Inde fit, ut ab experimentis avvocati, sequantur generalia, quae ad actum non deducunt, vel experimenta subjiciant amatae fabulae, vel demum ex paucis experimentis ad late patentia theoremata temere concludant. Quae dum facimus, in omnia diversa abimus, dum quisque res, circa quas versatur, ex unica idea contemplatus, necit aliis per angustas similitudines, quas alii, neque perspiciunt, neque probant.

*Priorem*] Quae enim sensus demonstrat, nulla aetas infirmare potest, nulla auctoritas, nisi Sceptici, impugnare. Sanguinis motus in circulum, post mille annos nihilo minus evictus erit. Ea est nostro seculo medicinae perfectio, ut amplam certe & firmam habere possimus, si adhibuerimus diligentiam. Sunt qui artem nostram conjecturalem esse defendant. Verum, id certe cum omni alia arte commune habet, quod non sit perfecta, & ea imperfectio vicio artificis, uti in aliis omnino artibus, major est. Et quae in Medicina incerta sunt, non minuunt evidentiam aliarum propositionum, de quarum certitudine constat. Scientia mutabilis non est Scientia, dixit HIPPOCRATES. Effectus satis certo cognoscere possumus, laboramus in causis, neque in iis erraremus, si effectus ante omnia ita nobis redderemus perspectos, ut ex ipso effectu causa posset deduci.

*Posteriorem*] Consequentiae, quas ex verissimis principiis deducimus, saepe fallunt, & in diversum abeunt. Mirum videri potest, divinam Rationem labi in iis, quae  
crassi

crassi & debiles sensus vera invenerunt. Verum errores nostri non adeo ex imbecillitate rationis, quam ex impatientia morae oriuntur. Ideas nempe recte percipimus, sed posteriorem priori jungimus citius, quam examine sufficiente nobis constet, jungendas esse. Sit exemplum de calore. Veteres observaverunt, hominem sanum calere ad aliquem gradum ultra calorem aeris. Sed calere a prima nativitate: & cor quidem calere inter membra longe primum, ultimum refrigerari: videri ergo causam caloris in corde magis perpetuam esse: & corpus calere ex efficacia cordis: Cor ergo caloris omnis in corpore humano esse quasi fontem. Haec omnia vere experti erant, sed male concluderant ab experimentis. Nec dum enim nota erat ipsis natura caloris, neque cordis. Expectanda erant, prius quam definirent de ea re, tempora HARVEYI, didicissent tum demum, cor quolibet minuto secundo horae duas uncias vividi sanguinis projicere in arteriam aortam, recipere, altero & aequali tempusculo, sanguinis uncias totidem. Sed haec tempora intra horae spacium esse omnino 3600, & in adulto corpore tamdiu calere universum corpus, quamdiu sanguinis ea copia, toties intra horam per cor movetur; refrigerari, quamprimum ab eo numero aliquid deficit; frigere, quando numerus ille nullus est. Haec si expectassent, non in corde certe, sed in determinata quadam velocitate sanguinis per cor moti, posuissent caloris causam. Verum quis per 2200. annos, qui  
ab



ab HIPPOCRATE elapsi sunt, iudicium suum suspendat? fateretur se aliquid, & praecipui in arte momenti, ignorare. Sed oportebat tamen: & ea sola patientia ars potest repurgari ab erroribus, confirmari, mascula & conscia proprii roboris fieri. Quare ubi dubia occurrunt, non solubilia nisi per hypotheses, pes figendus est, cogitandum, soluturos dubium posteros, postquam lumen iis accenderint experimenta nondum a nobis facta. Decet ergo de usu lienis, de viribus plurimarum stirpium, de causa pestis & variolarum, tantisper absque opinione esse, donec tempus veritatem pariat. Ea ratione ars reddetur brevis, sed fida, sed omnibus una eademque. Quando vero ex mutilis experimentis, ex rerum dimidiatis ideis, concludimus ad theoremata & opiniones, ita certe ars nostra fabularis erit, & doctorum virorum noctibus apta, non dirigendae manui Medici, qui versatur in sanandis civibus, in quibus levis error funestus esse potest.



## PRINCIPIA ET PARTES MEDICINAE.

### §. XX.

**P**INCIPIA] Hac voce intelligimus non principia constituentia, sive elementa  
E cor-

corporum, sed principia demonstrandi, five veritates ab aliis non dependentes, a quibus reliquae veritates dependent.

*Inutilia*] Qualia sunt,, Pythagoraeorum naturae corporum ex numeris demonstratae, Materia subtilis Cartesianorum, Aether peregrinus, Fuga vacui,, Nolunt ingenia hominum in iis adquiescere, quae proxima nostrae utilitati sensibus subjiciuntur: non existimant declaratam esse nutritionem, nisi teneamus naturam Tritici, neque hanc si elementorum doses non perspiciamus, imo neque in elementis finem inquirendi faciunt, sed & id superare conantur meditando, qua nempe ratione materia universi a forma substantiali in naturam Tritici figurata fuerit. Quae si possent sciri, quod fieri non potest, certe in rebus humanis omni utilitate destituerentur

*Fallacia*] Haec fors est hypothesium, ut omnis ille labor, qui in deducendis longa serie consequentiis positus est, pereat funditus, quandoquidem principia falsa pro fundamento posuerunt. CARTESIVS ex motus regulis, & materie subtili, circa centra quaedam mota, mundoque pleno, fabulam philosophicam (1) concinnavit de fabrica mundi, satis undique sibi respondentem, in qua non multum est quod improbes, nisi quod principia falsa sint. Si Geometrarum aliquis Triangulo obliquangulo tribuat proprietates Trianguli rectanguli, v. c. ut unam  
no-

[1] Quam neque sibi veram videri aperte fatetur  
PRINCIPIOR. III. n. 43. seqq.

nominemus, Theorema PYTHAGORAE-UM, poterit inde deducere systema novae Geometriae, severissime cohaerens, sed somnio simillimum, & subruto principio suo in proprias ruinas incubiturum.

*Expellantur*] (2) Quaecunque nempe ad sanitatem conservandam, morbum sanandum non conducunt, licet vera & curiosa, omitti possunt, ut sine quibus medicus esse possit. Vide MEAM de repurganda Medicina orationem.

### §. XXI.

*Objectum*] Id circa quod cognoscendum ars nostra versatur. Quod dum contemplatur, *Theoria* est, si agat, *πραξις* ab ipsa re vocatur.

*Hominis*] Corporis vivi, & animati, non entis metaphysici, neque animae: neutrum enim in Medici contemplationem venit.

*Mors*

[2] Regula haec a STAHLIANIS acerbè urgetur, sed, nisi plurimum fallor, & inutilis, & noxia. Quis in Anatome limitem figet, quousque ejus cognitio sit necessaria, ultra quem jam minuta sit curiositas? Nempe omnia, quae vera, etiam utilia sunt; alia vero usui propiora, alia rarius ad usus humanos adplicari possunt. Propior Medicinae Botanica practica, characteres remotiores. Verum disciplinae contextae sunt, non possunt membra quaedam Artium excerpì intactis reliquis. Sed & noxia est: deterret enim homines veritatis studiosos, & facit, ne limites artis proferantur.

*Mors*] Consideranda ob prognosin, ob necessarium metum: Ad prognosin symptomata faciunt & signa morientium; Ad necessarium metum, eventus funesti, solo experimento praevidendi. Puncta est arteria major; quam purum vulnus, quam exiguum! sed docet experientia lethale esse, quia sanguinem omnem emittit, donec cordis nervi resolvantur. Is eventus funestus debet observari, ut indicet, qua in re cura nostra debeat versari, in compefciendo nempe sanguine.

## §. XXII.

*Scientia*) Multi fuerunt Medici in disputando, num Medicina Ars potius, num Scientia melius vocetur. Nodus litis fere is est. Cogitationis partes sunt, *Intellectus & Voluntas*. Intellectus a Veteribus in quinque gradus distribuebatur. I. est *simplex perceptio*. Ita lucem & sonum existere cognoscimus, quia videmus & audimus II. *Scientia*, cognitio rerum per causas. Uti si in theorema redegerim, corpora dura adfricta calorem generare, indeque pronunciem, duo corpora dura hoc in loco ad se invicem confricantur, ergo calor orietur. ,, III. *Habitus Effectivus* sive *Ars*, quae ex cognita scientia quaelitum effectum producere valet. Pone v. g. statuarium, is tenet praecepta, quae ad statuam elaborandam requiruntur. Habet menti suae impressam imaginem HERCULIS, ad quam marmor figurandum est, novit quid de marmore sit de-



demendum, ut emergat latens HERCULES, tenet deinde rationem instrumentorum, quorum vi marmoris superflua crusta dejiciatur. Est haec *scientia statuaria*. Sed is ipse sculptor adgreditur opus, seligit marmoris fragmentum, dividit obiter in caput & artus, foveas parat, quae rudimenta sint juguli, oculorum, & tamdiu dejicit exiguas marmoris particulas, donec HERCULES jam nudus conspicuus appareat. Fuit hoc ejus opus, *Ars statuaria*, ipsa nempe scientia in actum deducta. Eo sensu Medicina Theoretica *Scientia*, dicetur, Praxis ad Artes pertinebit. Sed aliae sunt rationes quare scientiam malimus dicere. Primo, quia per causarum cognitionem, non per rudem imitationem, theoriam in actum deducit. Cur aqua tepida febres leniat, novimus Medici, & intelligimus fieri laxatis fibris, diluto sanguine viscido: Cur adjiciat alumen, stannum, gummata, Tinctor non novit. Deinde quia Medicina est futuri praecognitio. Nos sanitatem praesentem non conservamus, neque praesentem morbum tollimus: Id in potestate hominum non est positum. Novam generamus sanitatem, ejus in locum, quae hoc momento temporis evanuit, vel in morbi locum, qui nunc existit. Pleuritidem diei III. non sano, neque possum sanare, impedio unice, ne morbus constanter adsit; ad mortem usque vel Empyema. Neque, quae nunc adest sanitas, eam conservo; sed efficio, ut crastino die sit denovo sanitas. IV. *Prudentia*, dirigendi artem in futurum effectum. Dicitur autem

maxime de iis, quae in vita humana occurrunt. V. *Sapientia*, quae priores gradus complectitur. (1)

*Eorum*] In eadem conparatione statuarius nosse debet instrumenta, & modum iis utendi, ut ad praestitutum finem opus deducat: tum, quid de marmore demendum sit, ut imago adpareat: Sic & Medicus nosse debet remediorum omne genus, & modum remediis utendi, tum morbum & sanitatem, ut perspectum habeat, quid de morbo demendum sit, ut redeat obruta sanitas.

### §. XXIII.

*Utilitas*] Medicinam dari, certum est ex iis phaenomenis, quae exhibita Medicina observantur. Absque ea si foret, magna parte mortalium orbis ante diem careret, maior etiam numerus hominum magna vitae suae parte civitati inutilis, morbo & dolore solis esset occupatus. Objicere solent, posse quemvis hominum proprii corporis Medicum esse. Sed facile adparet, hominem aliis negotiis obrutum, non aequè perfecte posse addiscere praecepta artis, quam quidem ii, qui vitam suam huic unico labori destinaverunt, neque tot habere opportunitates ediscendae Botanicae, Anatomicae, &c. Quae vero in vulgus sparguntur in Medicinae contemptum,  
ea

[1] Voces PRAECEPTORIS, ex tribus Codicibus, absque nostro iudicio, sanctè conservavimus.

ea fere paucorum Medicorum ignorantiae conviciantur, non bonae arti.

*Nobilitas*] „ Cognita in societate & laudata utilitas „ Sed ea utilitas maxima est, quae societatis singulis membris, commoda primaria, vitam & sanitatem, praestare potest. Quae certe tanta est, ut mortales doloribus fatigati cuivis ignaro homini se tradere malint, quam absque medicina esse. Et obiter adparet, e re esse cujusvis mortalis, ut aliquid de Medicina notum habeat, ne Medicastrorum temeritati improvidus se committat. Antiquissimi certe Heroes, & ipse ferocissimus ACHILLES non inperiti fuerunt medicinae, neque eam propriis manibus facere detrectaverunt. Sed omnium loco sit exemplum SERVATORIS, qui pene omnia divinae potentiae specimina unice in levandis hominum aegritudinibus edidit.

#### §. XXIV.

*Observatio*] Animi adtentio ad eas mutationes quae in corpore contingunt. Eae mutationes autem oriuntur a motu, cujus origo in machina est. Harum mutationum aliae sensibus subjiciuntur, aliae nequaquam. Humorū motus per vasa, sensus, nudos certe, fugit omnino. Verum Medicus & ea scire debet, quae cognoscuntur sensibus, & ea, quae sensus non adtingunt, neque enim haec minorem ad medicam scientiam necessitatem habent. Ea vero eruuntur ex analogia partium sensibilibum

penitus cognitarum cum partibus minus perspectis.

*Sano*] Pulsus, respiratio, color, calor, nitor, mador cutis, splendor oculorum, ea ratione, qua in sanis se habent; ut distinguantur mutationes morbosae in iisdem phaenomenis. A vera cognitione horum omnium pendet aestimatio periculi, convalescentiae, virium vitae & morbi. Quae omnia, fuscè tractata a Veteribus, nostro seculo male negliguntur.

*Aegroto*] Observando omnes adparitiones in praesente aegro, & inquirendo in ea, quae & ipse & adstantes referre queunt, de iis mutationibus, quae non cadunt sub oculos Medici.

*Moriente*] HIPPOCRATES maxime hanc doctrinam excoluit, & mortis praenuncia signa curiose notavit. Haec omnia Medici posteriores male neglexerunt, Morientes vero dicimus eos, in quibus morbus victor in mortem tendit: In Phrenitide, quae die quarto lethalis erit, aeger in medio tertiae incipit mori, & universa corporis compages, sed imprimis cerebrum destruitur.

*Cadavere*] In eo, si quidem licet, administranda sectio practica, & inquirendum in causam latentem morbi, quae adeo saepe nos latet: adnotandae etiam omnes illae mutationes, quae a morte inducuntur vitæribus, & corpori toti. Namque externo quidem habitu, cadaver ab homine vivo mirifice differt. Perit amicus oculorum  
nitor,



nitor, squalet facies, fugit genas purpura, omnia effoeta, languida, terrorem inspirant, quae paucos ante dies mortalium oculos animosque blanda necessitate adtraxerant. Sed non minor fit in intimis mutatio. Id cum esset conpertum RUYSCHIO, replevit cadaverum vasa, & restituit nativum corporis habitum, quem mors destruxerat.

*Sensibus*] Non aliud exemplum clarius eam rem demonstrat, quam perspiratio SANCTORIANA. Unicum certe phaenomenon in vivo, proprioque corpore observatum, unum ex plurimis, plus verae utilitatis Medicinae adtulit, quam omnes ingeniorum subtilissimorum meditationes, totis XIII. seculis in interpretando GALENO laborantium. Hoc ipsum, factum a Medicis Cnidiis laudavit HIPPOCRATES (1), & studio incomparabili ipse perfecit. Omnia nempe, quae a causis externis, internisque contingebant in corpore aegro, severissime adnotabant: quae nempe ab adsumto Aconito, a morfu Viperæ, a dosi nimia Scammonei, a subito frigore, in corpore humano contingerent. Sed ea omnia recentiores neglexerunt (2). Id autem

[1] Περὶ διαίτης οξέων §. I.

[2] De Venenorum quidem effectibus pulcherrima habet WEPFERUS. De cibis, & aliis rebus non naturalibus, pene nullae observationes nunc fiunt.

tem princeps studium nostrum est merito suo, colligere experimentorum, quantum possumus, & ea juxta titulos suos ordinare. Experimentum vero dicimus respectu ad rem ipsam, quaecunque phaenomenon corporeum sensuum ministerio observabile. Mens nostra nihil addit praeter simplicem perceptionem phaenomeni.

*Ratiocinatione*] Ratiocinari vocamus, quando ideas experiundo natas ita inter se invicem comparamus, ut omnes eas notiones, ex quibus ideae componuntur, distinctissime percipiamus, atque inde judicare possimus, quid eae ideae commune, quid diversum habeant. Neque quidquam, praeter hanc ipsam patienter institutam conparationem ad Scientiam requiritur. Omnino vero ratiocinio eget Medicus, cum plurima in corpore humano, & omnis pene morborum gens longissime extra sensuum limites constituta sint. Deinde facultates menti nostrae Deus indidit, quibus ad inventionem novarum veritatum instructi sumus. Eas ab experimento fortuito non exspectamus: sed ab experimento a mentis imperio in certos fines instituto. Sola experientia Medicum non facit. Nunquam enim duo casus ita sunt sui similes, ut non multo ratiocinio sit opus ad inveniendam Analogiam.

*Singulatim*] Omnes observationes, quarum capita aliquot enumeravimus, debent in chartam conjici, & cum summa mentis adtentione, praesentes memoriae adferri ad  
aegros

aegros, in omnibus suis circumstantiis & particulis considerari, discerni quae propria, quae communia sint, ea comparari cum phaenomenis in aegro adparentibus, & haec phaenomena conferri cum phaenomenis, quae a nota causa interna aliunde novimus oriri, ita lento judicio causa latens morbi determinari. Exemplum hoc sit ejus methodi, qua ex adparentiis externis ad cognitionem causarum latentium viam facere possumus. Observamus, hominem vivum perpetuo respirare, ea lege, ut alternis vicibus aërem adtrahat & expellat. Aërem inspiratum, frigidiores & ficciorem esse, prae eo quem exspiramus, factum jam calidiorem & humidiores. Porro homine inspirante aërem per os & nares (3) adpellere ad angustam rimam Glottidis, inde in patulam caveam Laryngis, & ex hac in teretem arteriam, atque conica bronchia propelli, tandemque in horum ramos & Vesiculas Malpighianas (4). In inspiratione, novimus explanari diaphragma (5), costas trahi extrorsum, dilatari pectus, abdomen reddi angustius. In expiratione omnia contraria fieri, costas intro resilire, diaphragma intra pectoris caveam fornicari. In inspiratione dilatari vesiculas pulmonum, vascula hisce interjecta variis modis agitari, laxari, liberius transmittere sanguinem (6).  
In

(3) INST. MED. 194.

(4) Ib. 196.

(5) Ib. 612. 616.

(6) l. c. 200. 2.

In expiratione eadem vascula conprimi, sanguinem valide propelli (7). Nempe sanguinem a corde ad pulmones propelli, per arteriam conicam, elasticam. In canale autem conico, convergente, omnem partem contenti liquidi adplicari lateribus: expandi ergo, quantum vis liquidi potest, arterias. Ergo sanguinem in pulmonibus expositum actioni aëris, modo laxius fluentem propelli a vi cordis, modo in angustis vasis protrudi, vi conprimentium vesicularum quae resiliunt. In pulmone itaque sanguinem conquassari, quam fieri potest potentissime, partes ejus comminui, & ad motum per vasa minima adaptari (8). Hanc theoriam respirationis debemus ad aegrum adferre, & cum praesentibus in ejus corpore adparentiis comparare. Alio exemplo: In pulsu quidem, quid intus fiat, oculi non vident, neque eo minus licet habere ejus ideam quam uberrimam & distinctissimam. Nempe arteria semper plena est (9). Cor sanguinem expellit vi magna (10); Utrumque enim ex vivorum animalium sectione discere possumus. Sed liquor omnis quando cedere non potest, resistit: Ergo in arteriis, quae plenae sunt, unda anterior non potest retrocedere, ob sequentes undas, neque libere iter suum absolvere, quia renituntur undae anteriores; Quare unda anterior, cum non ea celeritate cedat, qua

(7) ib.

(8) l. c. 208.

(9) l. c. 217.

(10) l. c. 188.



qua sequitur impulsā a corde unda posterior, debet arteria in majorem conum expandi : ita *pulsare* videri (11). Quae certe aequae certae sunt, atque illa quae sensibus adparent.

*Minus*] Si Medicina vires suas explicaret, & societas medicorum omnia vere utilia ex scriptis omnibus colligeret, ea digereret in capita & aphorismos (12), fieret certe systema medicum, ex quo propositum quodcunque problema aequae certo resolvi posset, ac, ex ulla alia disciplinarum humanarum, problemata eo inspectantia resolvi possunt.

### §. XXV.

*Demonstratio*] Quae est, dubiae propositionis deductio in eam evidentiam, ut a nemine negari possit, qui generalia Axiomata admiserit. Purissimae habentur in Mathematicis, neque in Medicina nullae sunt, inter eas in primis quae petuntur ex Anatomicis. Non autem necesse est, principia artis alicujus, in ea ipsa arte demonstrata esse: Sufficit utcunque in alia arte earum certitudinem evictam esse.

*Distincta*] Quae sufficiat ad ens aliquod ab omnibus aliis entibus distinguendum. Uti si circulum definias, iter puncti terminantis lineam rectam, cujus alterum extremum

(11) l. c. 219. 220.

(12) Ideam exhibuit BAGLIV. *Prax. Med.* L. II. c. III. & IV. quod ad ordinem vero observationum, v. de GORTER in propria *Oratione* de ea re habita.

tremum fixum est, doceat in seipsum redi-  
verit.

*Clara*] Quae notionibus simplicibus constat, & ab omni homine sanæ mentis facile capitur. V. g. duo duobus juncta efficiunt quatuor.

*Certa*] Quae a nemine sanæ mentis negari potest, vel „ quae quotiescunque intellectui subjicitur semper eodem modo se habere apparet.

*Mechanicas*] Leges nempe universa corpora regentes, pendent a Physicis & Mechanicis principiis, atque ex iis legibus corporum actiones explicantur. Sed eadem leges in corpore nostro verae sunt, corpus enim est, & in universo corporeo versatur. Quare, quae de omni corpore vera sunt, tuto nostro corpori adplicantur. Uti si ponas, corporum duorum adfrictu oriri calorem, idem etiam verum erit, de adfrictu durarum particularum corporis humani. Deinde alia principia sunt, quae a peculiari corporis alicujus indole pendent, non a legibus generalibus. Hae *vires* dicuntur Physicae. Medicus utrasque conjunctas considerare tenetur, & lenta prudentia opus est, ne unquam corpus nostrum iis legibus subjicias, quibus pleraque, sed non omnia, corpora subjiciuntur.

## §. XXVI.

*Alia*] Id, nimirum, quod recordatur, quod intelligit, quod ratiocinatur, quod prae-

praeterita, & futurorum aliqua cognoscit, quod voluptatis & doloris sibi conscium est, non extensum, non impenetrabile, non figurabile, sive *Anima*.

### §. XXVII.

*Mente*] Id quod intra nos cogitat, se cogitantem, & rem cogitatam percipit (1).

*Corpore*] Pars nostri, extensa in triplicem dimensionem, figurabilis, ad motum & quietem idonea (2). &c.

*Unitis*] Ea lege, ut mens non possit resistere, neque impedire, quin ideas doloris, voluptatis, lucis sibi repraesentet, quoties corpus certo modo adfectum est. Neque corpus sanum resistere, atque temperare obsequio, quoties anima motus aliquos exsequi secum constituit.

*Natura*] Naturam hic vocamus, quo cognito omnia ad ens ipsum pertinentia penitus cognoscimus. Mentis est, esse conscium sive cogitare; accidentale est cogitare hoc vel illud; corporis, esse extensum, impenetrabile. Haec adtributa nihil habent communitalis: neque similitudo debet ex eo infer-

[1] Ens, quod conscium est sui, rerumque extra se positarum WOLF. *Metaph. Germ.* 192.

[2] Tertiam partem, *Archaei* quoddam genus, & a Mente & a Corpore diversum, aliqui recentiores Medici in Germania adferunt. An se ipsos intellexerunt? non videtur.

inferri, quod communi classi entium contineantur. Extensum quando cogito, nihil occurrit quod conscientiam involvat. Ita dum conscientiam sui contemplor, nihil invenio, quod complectatur extensionem. Ergo idea corporis nihil habet, quod sit in idea mentis & vicissim idea mentis nihil habet, quod in Idea corporis sit. Uti certe temporis & soni, ponderis, & lucis nulla est communis Idea (3). Recte SOCRA TES respondit CRITONI, quando interrogatus, quam sepulturam mallet, gravissime effatus est, SOCRA TEM quidem non invenies, cum domicilio meo facies, quod visum fuerit, neque enim conscius ero eorum, quae facies (3\*). Neque desunt in ipsa, qua nunc vivimus, conditione mentis exempla, ex quibus appareat, mentem vitam suam vivere posse, absque

- [3] Conf. DITTON *de ver. rel. Christ. ex resurr. demonstr. Suppl. Prop. I.* Nempe corpus directionem semel inceptam sequitur, nisi a causa alia novam determinationem accipiat. Sed mens nostra, dum ratiocinatur, non quiescit in recipiendis notionibus duarum perceptionum, verum inde concludit, de earum aut similitudine, aut diversitate. Denuo Mens nostra libere se determinat ad considerandum hoc objectum, & denegandam considerationem alteri objecto. Quod materia non potest, obnoxia viribus ambeuntibus, neque feligens directionem, sed accipiens.
- PROP. II.

[3\*] PLATO.



absque ulla pene cum corpore suo commu-  
 nicatione. Summus ille mathematicus  
 VIETA, qui primus nobis restituit Alge-  
 bram, accepit a rege expediendas epistolas  
 hostium occultis siglis exaratas. Dum ae-  
 nigmati resolvendo incumbit, per integros  
 tres dies, per solidas tres noctes immerfus  
 profundissimae meditationi ne minimum  
 quidem rumorem percepit de iis, quae  
 extra mentem propriam agebantur, non  
 magis fere de corpore suo sollicitus, quam  
 si dudum hospitem anima deseruisset. At-  
 que similem in ARCHIMEDE stuporem in  
 scriptis invenimus, primo quando de suspicio-  
 ne de coronae viciato auro ex certo ex-  
 perimento Regi HIERONI respon-  
 surus, in balneo aditum ad veritatem pro-  
 funda mentis indagine quaesivit, donec  
 adfulgente luce victoriosum exclamaret  
*εὕρηκα*. Deinde quando in funesta ekstasi,  
 nihil motus strepitu expugnatarum Syracu-  
 sarum, militi Romano inperavit, ne circulos  
 turbaret (3\*\*).

*Vita*] Corporis vita est 1. *generare mo-  
 tum*, in quibusdam saltem conditionibus,  
 uti magnes adcedente ferro. 2. Partes con-  
 stituentes suas adtrahere ad se invicem: inde  
 resistentia contra vires corporum ambeun-  
 tium, & *Vis inertiae*. 3. Tendere ad cen-  
 trum sui Planetæ, sive *gravitare*. 4. clas-  
 sis

[3\*\*] PLUTARCHUS in MARCELLO.

sis est actionum cuius corpori propriarum. *Mentis* vita est: I. *Percipere*, sive ad mutationes in sensibus externis ortas, obversans habere idolum cujuscunque rei extra se positaе v. g. Trianguli. II. *Iudicare*, sive comparare notiones duarum idearum, indeque deducere, eas aut easdem esse, aut diversas. Uti ex notionibus Trianguli & Circuli concludimus, Triangulum non esse circulum. III. *Velle* (4). Uno verbo vita mentis est esse conscium. Hae functiones mentis nunc sunt omnes, quid olim futurum sit, incertum est: Et eae omnes referuntur ad unam actionem principem, „*conscientiam* sui. „

*Actiones*] Corporis actio est, motum cum alio corpore communicare, passio est mutatio corporis ab alio corpore, vel a mente orta. Mentis actio est Voluntas, quam norunt omnes, nemo intelligit; passiones sunt mutationes ejus, ab objectis extra se positi-

[4] Sive adtentionem mentis concedere huic, non alteri ideae.

[5] *Conditione*] Strenue hoc negat STAHL. & adserit absolute, animam vitalia negotia omnia perficere THEOR. MED. p. 153. 154. imo verumotum esse ens immateriale, pendens ab anima, neque ab ullo corpore solo explicandum p. 259. Quod vero mens vitalium actionum non conscia sit, fieri, quia ea sola percipit atque recordatur, quae per visum & tactum recipit, p. 267. 268. non tamen carere obscuro aliquo circa vitalia sensu, p. 692.

positis. Mens cogitat de circulo, explo-  
ditur bombarda, perit idea circuli, nascitur  
soni idea. Id est pati; neque enim mens  
potest retinere ideam circuli, neque repellere  
ideam soni. Deinde alia quaedam in mente  
sunt diversa a prioribus, nempe IV. Adfectus  
animi sive perturbationes involuntariae,  
quibus mens resistere non potest, & V.  
facultas in Anima humana qua generatur  
determinatus in corpore motus, ad certas  
animae voluntates.

*Mutuo*] Non fieri potest, ut intelligamus,  
qua ratione ad easdem functiones concur-  
rant duo principia, quae nihil habent simi-  
lium virium (6). Tribus hypothesi-  
bus adlaboratum est ad explicandum men-  
tis & corporis commercium. 1. *Influxu*  
*physico*, quo ponitur rem cogitatam & rem  
ipsam non differre, quod alibi demonstra-  
bimus absurdum esse, cum nihil quidquam  
de

[6] Ponunt diversa systemata, quibus haec  
communitas perficiatur, sed non expli-  
cant: nihilo enim clarior est idea nostra  
de modo actionis mutuae mentis & cor-  
poris, sive systema *Influxus Physici A-*  
*RISTOTELIS*, a STAHLIO enixe de-  
fensum, sive *causas occasionales CARTE-*  
*SII*, sive *harmoniam praestabilitam*  
*LEIBNIZII* recipias. Eorum aliquod  
verum esse potest, illustrare rem ipsam,  
ne ullum quidem promittit. Videtur o-  
mnino PRAECEPTOR propior sententiae  
*LEIBNITIANAE*: V. WOLF: *Metaph.*  
*Germ.* 765. seqq.

de corpore proprio certi mens nostra sciat. (II. *Systema causarum occasionalium*) III. quo ponitur *præstabilita* a Deo *Harmonia*, ubi adsumitur, sancitam esse legem, ut ad definitas mentis cogitationes definiti in corpore motus succedant, atque vicissim. Et haec (6\*) quidem verissima sententia est, sed nihil explicat.

*Satisfactum*] Quod si explicanda sit aliqua actio, multa ex viribus Mentis & Corporis, ut ambulatio, dolor, respiratio voluntaria, enarrandum est id omne, quod corpus ad eam actionem contulit, deinde quod anima: Id si feceris, subsistendum, neque curandum (7) de diversarum actionum vinculo.

(6\*) Ita posui quae paulo aliter in Codice exstant. Mentem vero AUCTORIS non aliam fuisse res ipsa ostendit.

[7] STAHLIUS, qui mentem principium motus, & pulsus, & judicationum, & februm facit, cogitur utique de hoc vinculo aliquid explicare. Sed ea omnis explicatio, non videtur in Medicina mutare, aut addere, quidquam. Sunt in plethorico corpore haemorrhoides: bene est, liberatur ea via corpus a sanguine stagnante, foeculento. Omnes consentiunt. Nihil ergo practice differunt. Sed neque theoria diversa est. Sanguinem in vasis haemorrhoidalibus stagnantem, minus expedite refluentem per hepar, hinc viam quaerentem per vasa in Intestino recto, tenera omnino membrana tecta



culo: Prior explicatio Medici est, Philosophi altera: nexum explicare, ne hominis quidem. Calor in corpore ortus potest concipi absque animae cogitantis commercio, cum lapides molares adtriti calefiant. Motus ex corporis adfectionibus explicari nequit. Verum neque ex mentis proprietatibus. Nihil enim in conscientia est, quod motum contineat. Quare Calor, & Motus a mente explicari nequeunt, & si ad motum v. g. voluntarium dixeris, causam in eo esse, quod mens velit motum, nihil explicasti, quia nihil est in idea motus, quod possis in idea conscientiae invenire. Explicare enim dicimus, demonstrare, quid in idea A sit, quod in idea B etiam contineatur. Sed non impossibile solum est, verum Medico adprime inutile. Medici enim est, ea scire, ex quibus sanitatem lapsam restituere queat: sed omnis sanatio, quae in Medici manu est, mutatio est corporis per corpora. Quare cum anima non subeat hanc totam provinciam, pertinebunt haec de mentis & corporis nexu, ad inutilia, rejecta §. XX. Qui corpus sanavit, non sollicitus est de mente; ea, libera obstaculis,

testa &c. admittimus omnes. Quid attinet, cum nos sanguinem pondere, irritatione, stagnatione, duritiae foecum, viam invenire dicamus, quid inquam attinet, aut augeat Medici scientiam, si addiderit STAHLIUS, haec omnia eadem, sed praeterea imperio animae fieri.

lis, vires injussa exseret, redibit ad sua munia. Suffusione laborat oculus, mens perceptione objectorum visibilium caret: homo coecus est. Ergo vocatur medicus, dejicit ex sede sua opacam lentem crystallinam; redeunte pristina via radii lucis ad retinam videbit mens, facile caritura praeceptis opticis, & medicus suo officio omni defunctus est. In deliquio animi reperis aegrum, non potes revocare mentem, cum qua nihil tuae menti est commercii. Sed aceto utere; admove naribus, excita motum in machina, redibunt functiones mentis, nihilo ignavius, quam si novisses nexum inter motus corporis, atque mentis conscientiam.

## §. XXVIII.

*Metaphysicae*] Adtributa quae enti tamquam enti conveniunt, maxime ergo universalialia & ab actione remota.

*Primae*] Causae quae produxerunt causas secundas: sed in earum investigatione, ubique DEVS occurrit, & humanae sapientiae finem figit. Deus est Ens infinitum, cum quo si conferatur Universum, invenitur pene nihil esse.

*Physicae*] In Physicis, ne quidem indagine tentanda sunt ea omnia, quae per experimenta definiri non possunt. Nunquam enim possumus certi esse de inventa veritate, eaque veritas si quam maxime inventa esset, usibus tamen humanis non posset inservire. Nihil quidquam intelligimus de ortu, & de

de communicatione motus, neque motus ideam corporis ingreditur, non magis, quam circulus mentis ideam. Prodeant ii Philosophi, qui DEI in condendo orbe socios se gerunt, explicent unicum, simplex, perpetuum experimentum, quare motus comunicetur, & globus occurrens globo, huic sui motus aliquam partem tradat. Respondebit aliquis, si ingenuus est, Deus id fecit. Adgnoscat itaque, se adquiescere in experimento, & de legis observatae explicatione desperare (1), secutus sapientem ignorationem Chemicorum, quos adeo vilipendimus, cum tamen laudabilis modestiae exemplum nobis praeceant, dum phaenomena caste recensendo, de causa prima non sunt solliciti. BARTHOLDUS SCHWARTZ mirabile experimentum nactus, quo demonstratur fulgur & tonitru excitari posse, admoto igne ad pulverem, qui nitrum sulfur & carbones definitis portionibus reciperet, nunquam inquisivit in causas adparitionis, a qua pene universi orbis facies mutata est. Recentiores invenerunt auri grana duo dissoluta in sex granis aquae Regiae, in fundum vasis praecipitatis ab adfufis tribus granis tartari per deliquium, oriri pulverem, qui admoto calore defini-

torum

[1] Omnia rerum principia, motum, atomum, corpus, spacium, gravitatem, totidem ignotae essentiae entia esse, fusius b. BOERHAAVIUS *de cognosc. certo in Physf.* p. 8.

torum graduum eleuet centum libras. Quiescunt in phaenomeno Chemicæ. Accedat Philosophus, quaerat mechanicam machinam, cujus efficacia grana duo centum libras eleuent, nae quam frustra erit, & a Chemico experimento recedet longissime.

*Elementa*] Elementum est, ex quo corpus aliquod componitur, atque in quod idem ultima diuisione resolvitur. De his multa fuit ab omni aevo disceptatio. Alii aquam solam (2), alii aërem (3), alii aquam & ignem (4), alii elementa Peripatetica, alii sal, sulfur & mercurium, alii alia ponunt (5). Horum vero omnium nullum potest elementum esse. Elementi enim definitionem ingreditur, ut simile sit; Id si fuerit, jam concipi nequit, quomodo ex homogenea materia, corpora diversissimae naturae produci possint (6). Si vero con-

fugias

[2] THALES apud LAERTIUM I. p. 17. & obiter BOYLE *Chymist. sceptic.* p. 62.

[3] ANAXIMENES apud LAERTIUM p. 80. conf. VERULAM. *Natur. Philos.* p. 226. seqq.

[4] HERACLITUS & AUCTOR I. περὶ Στα-  
της I. §. 4. p. 182. edit. LINDENIA-  
NAE.

[5] Hos omnes ex ordine refutavit per experi-  
menta BOYLE *Chym. scept.* toto libro.

[6] Neque ullum horum Elementorum compre-  
hendit corpora omnia nobis nota. Alia  
ignem, alia materiem magneticam, alia  
frigo-



fugas ad monades Pythagoraeas (7), ad materiam universi &c. jam elaberis oculis nostris, neque nos convincere potes, neque a nobis confutari, cum de iis dicas, quorum nos nullas notiones mente recipimus.

*Seminum*] Praeter materiam, formam, & vacuum, Chemicorum aliqui adgnoverunt proprium principium seminale, quod corporum vegetantium fabricam ita dirigeret, ut hanc, neque aliam ullam formam induere possint (8). Sit aqua pluvia pura, terra pura, in ea seratur semen Anisi, addatur calor incubantis Gallinae, fiet Anisum, cujus odor, sapor, fabrica ab omni alia planta in rerum natura dissimillima sunt;

frigoris substantiam, alia coelestis expansionis atmosphaeram omittunt.

[7] Et LEIBNITIANAS, corpora simplicia, non mutabilia, non resolvenda in partes.

[8] BOERH. *de cognosc. cert. in Phys.* p. 22. In plantis & animalibus notum est. Sed & lapides etiam vegetare nuperi Scriptores ponunt, BELLINUS *Opusc. Tom. II. p. 268. seqq.* BAGLIVIVS *de veget. lapid. ed. Antv. p. 497. seqq.* & TOURNEFORTIVS *praef. ad Iter Oriental.* & in descriptione cavernae *Antipariae* ib. L. I. *lettre V.* cui simillima est specus Suevica *das Nebelloch* prope *Pfulingen*, lapidea vegetatione brassicam caulifloram imitante, & clarissime resonante lapide pellucido, & fistulis ex alto imminentibus ex aequo dives.

sunt; & in pronascente plantula nascentur simul centena femina, quorum quodvis novam stirpem Anisi satum restituet. Semen hoc abfuisse, universae naturae conjunctae vires, nunquam unicam Anisi stirpem elaboravissent. Debuit ergo, ex eorum opinione, principium fuisse, quod ex semine aqua & terra, hanc definitam stirpem, nunquam aliam ex eo semine, nunquam ex alio semine eandem producat. Eadem ratione Metalla, ex certo semine, ope definiti succi, intra proprium tempus, in exquisito caloris subterranei gradu, crescere & vegetare existimaverunt, iidem per experimenta Philosophi. Neque eorum sententia destituitur solidis rationibus.

*Motus*] In DEO quaerenda ea origo, si aliam ponamus, fabulamur. Dicam, quod veracem philosophum decet, confiteor ingenuam ignorantiam, despero de causis primis, aequae feliciter usus causis secundis, ac si primas nossem. Plantae alicujus vires, si in medicinae usum ex vero experimento infero, idem certe arti praesto, ac si plantam crearem. His vero omnibus eliminatis, quibus hac sectione Medicos carere jubemus, artis novem decimae partes exsultabunt, & redibit *repurgatae Arti* sua *nativa simplicitas* (9).

## §. XXIX.

[9] De qua in propria Oratione Auctor egit.

## §. XXIX.

*Anatomicis*] Qui verum scire vult, experimenta capiat. Ea ratione uno anno plus sciet, quam ratiocinii indagine intra seculum adsequetur. Experimenta propria veritate se defendunt. Ratiocinia, etiam mathematico nexu evidentia, tum demum vera sunt, quando superstruuntur experimentis, & ea si desint, ut verissima fuerint, ruunt inutilia. Rationem aequabiliter Natura distribuit mortalibus, is autem ratiocinatur melius, cui experimenta meliora sunt, quae continent descriptionem fabricae, situs, figurae, magnitudinis, aliarumque proprietatum, quas, in corporis humani partibus, sensus nostri adsequuntur.

*Chemia*] Ea enarrat eas mutationes, quae oriuntur a corporibus inter se conmixtis, imprimis vero igne agitis. Additur corpori definito, corpus aliud, additur cognita ignis violentia, oriuntur apparitiones, eas observat Chemia. Neque est in quo fallat, si in enarratione experimentorum subsistat. Addito ad oleum vitrioli defoecatum oleo caryophyllorum optimo, erumpunt piceae nebulae, in flammam ipsas exiturae. Nunquam id fallit, postquam semel in experimenta sua retulit Chemia.

*Mechanice*] Quae docet adplicationem legum motus universalium, ad corpora quaedam

dam definita. Omne corpus est, extensum, impenetrabile, mobile, figurabile &c. Generalium harum qualitatum effectus, potentiasque motrices inde ortas adplicamus singularibus, & definitis corporibus, neque possunt fallere, si corpus, cui adplicantur, per omnia adtributa fideliter cognitum sit. Ponit ergo cognitionem exquisitam fabricae omnium illarum partium corporis humani, quibus leges Mechanicas adplicare volumus, & eo sensu fiet integra Medicina, scientia eorum, quae in corpore humano fiunt (1), vel ex adfectionibus communibus corporum, vel ex definita & singulari corporis humani fabrica: Ut adpareat, utrimque erratum fuisse, dum Mechanici omnia ex arte sua definire conati sunt, non satis intellecta fabrica partium, quarum vires numeris exprimebant: quod certe vitium etiam nobis, ob Orationem (2) aliquando habitam objectum est: alii vero exosi omne mechanices nomen, corpus nostrum ab omnibus iis legibus liberum pronunciaverunt (3), quibus ipsis omnia corpora reguntur.

Go *Physica*

[1] Quae pene SCHREIBERI definitio est, scientia eorum, quae per corpus humanum possibilia sunt. Vid. *El. Med. Math. Praemittend.* c. III. *Def.* XIIIX. *Schol.* I. pag. 55.

[2] De *usu Mechanices in Medicina*, quam nemo celato nomine, in libello *Friburgi* (sive quae alia urbs ficto nomine celatur) inpresso, publice inpugnavit, satis seipsum ultus oblivione.

[3] STAHLIANI.



*Physica*] Amplissimo sensu continent id omne quod de corporibus per sensus cognosci potest. Sed & ea, dum ultra sensus non progreditur, falli nescia est.

### §. XXX.

*Docenti*] Praeceptor, edoctus eam scientiam in qua versatur, ponit generales leges, equibus singularium entium natura definitur. Inventor, debuit singularium entium naturas seorsim per experimenta addiscere, ut ea per communitates suas in genera ordinare posset. Priorem methodum *Analyticam* scholae vocant, alteram *Syntheticam*. *Inventor* ARISTOTELES (1), cum observaret; Bovem, qui cornua haberet, carere dentibus superioribus, carere cervum, carere capram, & ovem, & alia animalia sibi nota, pronunciavit tandem, omnia animalia, quae cornua gerunt, carere dentibus maxillae superioris. Sed hoc pro axioma ponit *docens* naturas animalium RALVS (2), atque ex eo axioma, semel posito, concludit, neque bovem, neque cervum, neque rangiferum, habere dentes in superiori mala, quia nempe cornuti sunt omnes.

### §. XXXII.

*Vita*] Collectio omnium actionum, quae ex fabrica corporis humani oriuntur. Quando

[1] *Hist. Anim.* L. II. c. I. p. 853. ed. Genew.

[2] *Synops. method. Quadrup.* p. 66.

do eae omnes perficiuntur perfecte & com-  
mode, dicitur sanitas.

(\*)

### §. XXXVII.

*Medicam*] Cognitionem remediorum  
quae ex quacunque auxiliorum classe de-  
sumuntur, sive ad Pharmaciam soleat re-  
ferri, sive ad Diaeteticen. Hoc latiori sen-  
su DIOSCORIDES materiam medicam  
descripsit (1).

*Φαρμακευτικὴν*] Saepe medicamenta a na-  
tura exhibentur asperiora, fortiora, ingra-  
ta, non satis efficacia. Haec hominum in-  
dustria comtiora, innocua, grata, & valida  
redduntur, sive mechanicis mutationibus id  
fiat, sive sola commitione. Pharmacia quae  
haec perficit, duplex est, *Galenica* & *Chemi-  
mica* (2).


Inter-

[\*] Multa ad hos numeros addunt Codices, sed  
alibi melius legenda.

[1] Qui non medicas tantum plantarum vires,  
verum & Diaeticas adnotavit, & ipsa et-  
iam venena recensuit L. VI.

[2] Gradu solo differunt, quae ineunte seculo  
XVII. nimis ambitiose se distinxerunt. Ad  
GALENICAM, decoctio, infusio, expres-  
sio, & aliae operationes simpliciores refer-  
ri solent, maxime quae circa vegetabilia  
versantur. Ad Chemicam; distillationes,  
tincturae, fusiones, solutiones per sales, a-  
quas stygias &c. Conveniunt vero gradi-  
bus intermediis, & distingui desierunt, post-  
quam Chemicae operationes in Pharma-  
copolia receptae sunt.

Ἰντρον] Quae docet, indicationem, tempus, & modum utendi medicamentis; & huic quidem proxime nititur *Praxis Clinica*, quae est, praeceptorum universalium deductio in usum in praesentibus aegris.



## Φ Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η.

## §. XXXIX.

*Fluidis*] Quorum (1) particulae, sensibus nostris non distinguendae, adeo parum cohaerent, ut facilius sit eas a se invicem separare, exiguo etiam impetu, quam quidem totam massam e situ dimovere. Sensibus non distingui posse dicimus, ne sabuli acervum pro fluido habeamus.

*Solidis*] Quorum (2) particulae adeo valide

[1] Quae facile minimo impetui cedunt, s' GRAVESANDE *Elem. Phys. Math.* I. 13. CARTESIUS naturam fluidi posuerat in motu perpetuo particularum, sensibus equidem non percipiendo. BERNOULLIUS in intercedente materie peregrina, *de gravit. Aetheris* p. 162. Verissime autem evicit BOYLEUS, fluidum a solido non natura sua, sed gradu, eoque vix definiendo differre. *De fluiditat. & firmit.* toto l.

[2] Vero sensu corpora dura dicuntur, quorum

par-

de inter se cohaerent, ut inpresso motu facilius sit, totum ex sede dimovere, quam partes a se invicem separare. Hujus firmitatis omnino varii sunt gradus. Eae partes firmissimae sunt, quae vel maximae vi non cedunt: uti tendines, qui admotis duodecies centum libris, non divelluntur (3). Minime solidae, quae adeo parum cohaerent, ut vi vitae paululum auctiori divellantur: qualis est cortex cerebri. Maxime fluidum est, quod minima vi in partes suas dissolvitur, sive, quod idem est, movetur, ut perspirabile illud SANCTORII. Minime fluidum, cujus partes vix distrahuntur, ut mucus narium.

### §. XL.

*Instrumenta*] Corpora composita, quorum partes eam magnitudinem, figuram, materiem, & connexionem habent, ut inde sequatur definitus effectus ad praestitutum finem.

partes nulla vi a se invicem separari possunt. Quae durities est elementorum secundum NEWTONUM *Optices* L. III. p. 375. *quer.* ult. Deinde & ea solida dicuntur, vaga & relativa adpellatione, quae egent non minima vi, ut separentur. In corpore humano, fluida sunt, quae in certis & figuratis tubis moventur: solida, quae ea ipsa fluida coercent.

[3] v. c. Tendo extensor Tibiae, qui sit ex Recto & Vastis trahitur vi aequivalente libris 2287. apud BORELL. *de mot. anim.* I. *prop.* XL. neque cedit.



finem (1). Ita dens molaris habet materiam durissimam osseam, quae etiam durioribus cibis diffrigendis apta sit; figuram scrupeam, inaequabilem, aptam continendis iisdem cibis, ne elabantur; nexum firmissimum cum maxillae alveolis, ut nunquam cedant aut vacillent; magnitudinem determinatam, quae ad cibos humanos, & ad maxillam atque corpus humanum idoneam rationem habeat. Ea omnia manifesto consentiunt in eum effectum, ut corpora dura, tenacia, aspera, super eos dentes comminui possint. Instrumenta hujus generis multa, in unum *organon*, live compositum instrumentum solent conjungi, musculi & ossa in manum &c.

*Fulcimenta*] Quae nempe obstant, ne totum corpus, aut aliqua ejus particula proprio corpore labatur: Ita pedes corporis universi fulcra sunt, vasa eorum liquidorum quae continent.

Co-

- [1] LUCRETIVS *de natur. rer.* IV. p. 134. *ed. Gifan.* manifesto negat, partes corporis humani ad eos usus constructas esse, ad quos earum ministerio utimur, hominesque, experiundo efficacias membrorum suorum, adfuevisse ad eas actiones, ad quas eas reperiiebant sufficere posse. Eandem sententiam secutus est LAMY *disc. Anatom.* p. 39. impiam certe, & quae refutatur, vel unica ea observatione partium quae adsunt in animali ad futuros usus; pulmonis, valvulae foraminis ovalis, latentis in crura papilionis &c.

*Columnae*] Fulcimentum ad perpendicularum erectum.

*Trabes*] Fulcrum horizonti parallelum, vel alio etiam modo inclinatum; huc Costae, ossa Ilium, Biventer respiciendo ad linguam &c.

*Propugnacula*] Partes durae & quae impetum externum avertunt a partibus tene-rioribus, quibus inductae sunt. Cranii galea pro cerebro, pectoris ossæa fabrica pro corde & pulmonibus.

*Tegumenta*] Propugnacula coriaceae tenacitatis, circa exteriora corporis undique obvoluta. Huc callosa cutis, adeo certe firma, ut non rara sint experimenta ossium intra illaenam cutem confractorum (2).

*Hypomochlia*] Puncta immobilia, quibus innixus vectis pondera elevat. Talis Trochanter major pro musculo Glutæo, sinus ossis Ilium pro Iliaco interno, patella pro Extensoribus Tibiae.

*Cunei*] Corpora polyedra, ex crassiori massa extenuata in acumen, corporibus duris discindendis idoneum [3]. Dentes canini huc pertinent.

*Veſtes*] Linea non flexilis, & gravitatis expers,

[2] In capite BOHN. *de offic. med. dupl.* c. IV. p. 590. HIPPOCR. *Epid.* V. *Obs.* L. De la MOTTE *Obs.* 165-168. DODON. *Obs. Med.* I. &c.

[3] Proprie pyramis triangularis, cujus latera sunt triangula aequicrura, acutangula. In iis effectus, corpora dividens, est ad eorum resistantiam, uti altitudo pyramidis, ad latus obpositum angulo verticis.

expers, unico puncto fixo innixa, circa quod movetur (4). Ossa longa omnia.

*Rotulae*] Puncta immobilia, circa quae inflexa chorda descendendo pondera elevat (1).

*Chordae*] Lineae flexiles, quibus adpensa potentia elevat pondus. Tendines, nervi, muscoli.

*Prela*] Plana dura, coeundo prementia, inter quae positum corpus patitur actionem ponderum, quae alteri planorum incumbunt. Cor, Ventriculus.

*Folles*] Receptacula, quae fluidum corpus in latam caveam receptum, per angustius foramen expellunt. Thorax & aspera arteria.

*Cribra*] Plana foraminulenta, quae excludendo crassiores particulas, separant eas tenuiores, quae crassioribus admistae erant. Vasa rubra minima cum lateralibus ramis sanguinem excludentibus (6).

*Filtra*]

[4] Sive tunc *homodromi* sint, ubi & pondus & potentia ad easdem partes puncti fixi ponuntur; qui in corpore humano valde frequentes sunt, atque magna ex parte, potentia propior hypomochlio, iis damnum virium facit, v. g. in massetere, ad maxillam inferiorem movendam: Sive *heterodromi*, ubi potentia & pondus hypomochlium intercipiunt, uti in Sterno-Mastoideo, Extensoribus Genu &c.

[5] Trochlea Oculi: Sinus sub hamulo pterygoideo pro musculo Circumflexo Palati &c. Qua arte fit, ut oculus, ante faciem quasi extra corpus possit educi.

[6] §. 245.

*Filtra*] Plana pertusa foraminibus obliquis & minimis, quae crassius fluidum retinent, dimittunt quod tenuius admistum est. Vasa lactea & Intestina.

*Canales*] Vasa in universum in corpore humano sunt tubi, in quibus liquida coërcita moventur. Eorum tria genera sunt: *Canales*, in quibus perpetuo fluit, quod continetur liquidum. Arteriae, Venae, vasa minorum generum, conica omnia & cylindrica.

*Alvei*] Aliud vasorum genus, in quibus fluunt liquida, sed non perpetuo, atque modo replet caveam, modo relinquit inanem. Auriculae & sinus cordis. Horum figura varia est, neque cylindrica.

*Receptacula*] In quae receptus humor aliquamdiu quiescit. Vesica Urinaria, Vesicula fellis. Folliculi pinguedinosi, sive ampullae ultimis arteriis adpositae: Sinus pituitarii, glandulae simplices, receptacula mucosa uteri VATERIANA. Ut appareat, quam multa sint in corpore humano, quae non perpetuo moventur.

*Functio*] Potentia agendi, quae a fabrica organi dependet. Functio in ipsum motum deducta, est *actio*.

*Mechanica*] Si particulae aliquae corporis humani fabrica sua conveniunt cum instrumentis mechanicis, quorum nomina recensuimus, debent utique iisdem etiam legibus regi. Namque omnis earum vis est in eo motu, quem producant. Et is motus, a quocunque demum corpore perficiatur, fit secundum leges universales Mechanices. Sunt,



Sunt, qui existiment (7), non debere eas actiones per leges Mechanicas explicari, quarum causae Mechanicae nobis non sunt cognitae. Verum id absque severo rei examine dicunt, non enim de causis, sed de effectibus agimus, qui legibus mechanicis reguntur. Motus multi & magni in rerum natura perficiuntur, quorum causas ignoramus. Sed ipsi  
*Quidam* motus,

- [7] STAHLIUS iratus Mechanicis, non mechanicas solum leges & matheseos usum severe damnat, sed ipsam etiam Anatomem, innoxiam, & puram utique ratiocinio, utilitate omni Practica carere adfirmat. *Theor. Med.* p. 68. 69. Verum non requirebat ejus systema tantam atrocitatem; poterat omnes leges Mechanicas admisisse, dissenfurus a nobis in ea re, quod causam horum motuum ipse nosset; nos negligeremus: In eo non prospexit Medicinae, quod persuasus, se nactum esse causam primam, secundas omiserit, propiores tamen, & in quas solas & rationi, & experimentis aliquid licet. Atque ipse oblitus tabularum proscriptoriarum, non solum Anatomico, eoque gracili, experimento, connubii venae Portarum cum vasis uteri & haemorrhoidalibus, systema pro dimidia parte morborum chronicorum superstruxit; sed diserte etiam alibi testatur, se docere veram Mechanicam, eamque positam esse in partium dispositione, atque vasorum ratione ad ea liquida quae vehunt, p. 227. Manifesto argumento, ipsi non Mechanicam, sed gloriam adversariorum exosam fuisse.

motus reguntur tamen legibus illis supremis, & per omnia corpora se diffundentibus. Ipse magnes (8), cujus actio causam habet abditissimam, motus suos efficit, certa, & observata lege, quae semel nota, & futuris experimentis adplicata, nunquam fallit. Corpus humanum motus producit, quorum causae obscurae sunt. Effectus vero sunt elevationes ponderum per adfixas chordas, propulsio liquorum per definita vasa, alii effectus simillimi iis, qui a causis mechanicis producuntur, non aliis ex legibus temperati.

### §. XLI.

*Firmas*] Haec omnis doctrina debetur industriae Recentiorum. Veteres enim, non ignorantes liquida moveri, causam non in canalibus quaesiverunt, minime curiosi in determinanda eorum natura, elatere, figura conica. Nunc demum nobis innotuit, non plus posse fluidas partes humani corporis, in dilatandis vasis, quam quidem vasa, propria vi coarctata, in fluidis propellendis.

*Determinantur*] In sanguine arterioso nihil causarum est, quare potius ad partes extremas a corde fluat, neque malit ad cor redire inversa directione. Determinatur autem motus ejus a Corde.

*Miscentur*] Ita ut omnis particula unius fluidi A, ponatur inter partes alterius B, & simi-

[8] Vid. experimenta MUSSCHENBROECKII  
Act. Angl. n. 390.

similiter omnes alterius B, inter partes prioris A. Miscentur liquida corporis humani in magnis alveis, ut in vena Cava prope cor: eo enim omnis lymp̄ha, & chylus, & sanguis a diversissimis partibus redux, in unum convehitur. Deinde in sinu pulmonali, sinu-  
bus Cerebri & aliis receptaculis venosis.

*Separantur*] Ut liquores diversi generis, qui commisti fluxerant per unum canalem, nunc sejungantur, atque diversa liquida, per diversa vasa, seorsim meent. Fit hoc in arteriis. Arteria enim aorta, omnia liquida mista in vena pulmonali accipit, & ita distribuit, ut rubrae arteriae sanguinem rubrum, vasa salivalia salivam, ductus deferens semen, Pancreaticus canalis proprium liquorem, alii alios, porro avehant, a sanguine & aliis liquidis distinctos.

*Mutantur*] Bilis ex aqua & pane solis ubertim gignitur, quanta vero diversitas est panis a felle? Nihil tamen pani & aquae factum est, ut fierent fel, nisi quod utrumque varie cum liquidis humanis mistum, & determinatam efficaciam solidarum partium corporis humani passum sit.

*Movent*] Omnis motus in corpore humano per sola fluida exercetur. Ossa moventur a musculis, hi a nervis, & isti ultimo a fluidis.

*Atterunt*] Adtritum vasorum est in ratione velocitatum liquidorum. Si arteriosus sanguis duplo majori vi in arteriae parietes illabitur, duplo majori etiam efficacia repellitur. Canales arteriosi corticis cere-

bri, tam multis vicibus minores (1) capillo, experiuntur actionem pulsum pene innumerabilium; hinc necessario solvi debent, & adteri, ut novis elementis eos reparari oporteat.

*Leges*] Omni liquido corpori conveniunt  
I. Leges omnes, quae de corpore in univ-  
ersum demonstratae sunt. II. Quae de par-  
ticulis solidis in genere vera sunt. Fluidor-  
um enim elementa sunt utique solida cor-  
puscula (2). Tertio

*Hydrostaticae*] (3) Ita vocamus eas, quae  
solent hydrostaticae dici, ne vocabuli sensus  
ad proprias aliquas aquae affectiones respice-  
re videatur. ARCHIMEDES (4) acturus  
de fluidorum legibus, quatenus subsident,  
quatuor ante omnia Axiomata posuit:

I. Totum adgregatum sensibus percipi posse.  
II. Non autem ullam particulam seorsim  
positam.

III. Et elementa, & totum adgregatum  
gravitare.

IV. Elementa minima vi a se invicem pos-  
se separari.

Inde deduxit generales leges, quibus omne  
fluidum tenetur haecenus (5), qua fluidum  
est,

[1] INST. MED. 434.

[2] ROHAULT. ex edit. CLARKII p. 109. &  
plerique recentiorum.

[3] Leges earum adparitionum, quae in fluidis  
ex sola gravitatione contingunt.

[4] Περὶ τῶν ἐνιζωμένων τῷ ὕδατι.

[5] In tubis communicantibus fluidum homoge-  
neum unius tubi, sustinebit in eadem al-  
titu.



est, nulla habita ratione naturae singularis fluidi, aut figurae canalis. Quare, cum omnia liquida ex aequo regant, debent utique & de fluidis partibus corporis humani valere.

*Hydraulicae*] Ea voce etiam malumus vocare, quam receptiori, hydraulicae: haec enim videri potest ad solam aquam spectare, cujus non omnia adtributa in liquidis corporis humani vera sunt. Eae leges continent phaenomena corporum fluidorum, quae moventur per definitos tubos. Sed tubi in corpore alii sunt *cylindrici*, in quibus neque velocitas neque resistentia ex figurae ratione mutantur. Uti canales qui arterias finiunt, & venarum faciunt initium. Vel conici sunt, iique aut *convergentes* (6) in quibus lumen  
tubi

titudine liquidum alterius. In vasis ad perpendicularum stantibus, quorum bases aequales sunt, fundi premuntur in ratione altitudinum: quando vero bases differunt magnitudine, in ratione composita ex basi & altitudine: hae leges ad motus fluidorum corporis humani utique valent WOLF. *Hydrostat. Theor. 7. 9. 10.*

- [6] Namque in cylindro omnes unius diametri globuli juxta se invicem moti per lineas rectas, in una diametro arteriae, distendebant canalem impetu nullo, pergebant in directione impetu omni: si nunc dupla ratione inminuatur ea diameter, dimidia omnino pars momenti globulorum impendetur dilatando canali, donec fiat cylindricus, residuo solo movebitur. Qui conatus  
per-

tubi perpetuo fit angustius, atque resistentia augetur perpetuo, dum inpetus liquidi in canalem & frictio perpetuo majora fiunt: vel *divergentes*, quando lumen tubi perpetuo fit latius, atque sic resistentia inminuitur. Prior classis, in corpore humano, est in finibus arteriarum atque venarum initiis, in vasis exhalantibus &c. Secunda in arteriis & vena portarum postquam Hepar subit. Tertia in aliis venis omnibus & ductibus excretoriis.

*Mechanica]* Elementum fluidi est solidum, & si aliquid agit, aget omnino per eas leges, quibus solida reguntur. Et actio fluidi totius est summa actionum molecularum singularum.

*Ratio]* Sufficerent nempe leges hucusque dictae, si liquida corporis humani aqua pura forent, & vasa aenei tubi, in infinitum resistentes. Sed fiunt liquida nostra ex oleo, sale, terra, & aqua, varie se aut adtrahentibus, aut repellentibus. Solidae vero partes ex fibris elasticis, extensionem, & reciproce contractionem admittentibus. Quare liquida corporis humani, non pure & exquisite sequuntur leges, aut hydraulicas aut hygrostáticas, verum cum recessione quadam, quae est in ratione diversitatis inter aquam & liquores nostros. Non ergo reguntur venae nostrae legibus HERONIS, quas tulit, de liquidis infinite compressionem renuentibus, motis per tubos infinite resistentes.

perpetuo augebitur inminuto lumine, in ratione inversa & quadrata luminum.

stentes. Sanguinis particulae perpetuo se adtrahunt, atque pro ratione contactuum in mutuam cohaesionem ruunt: id non est in natura liquidi, sed ex propria & peculiari sanguinis indole. In febre tertiana aeger friget, concutitur, tremit, angitur, mox incalescit, & paroxysmus desaevit cum sudore, & urina lateritia, rediturus post 36. horas, & quidem periodum sequetur septem exacerbationum, ut morbus augeatur singula accessione ad quartam usque, & eadem denuo ratione inminuatur ad septimam. Causa manifesto est, obstructio in canalibus minimis. Nemo tamen mortalium haec phaenomena explicaverit, ex legibus hydraulicis, aut hygrostaticis, cum in sanguine, eae mutationes ex ipsa elementorum diversitate nascantur.

## §. XLII.

*Vitae*] Non potest tradi vitae definitio ante enarratam Physiologiam, est enim summa earum actionum, quas singulatim describit Physiologus.

*Quodammodo*] Difficulus aliquando, vivum a mortuo distinguimus: ut perfecte syncopiticum, submersum aquis, & absque vitae indicio extractum. In Brabantia, unica spes amplissimae stirpis, nobilis Juvenis aquis submersus, extrahitur, domum revehitur, exanimis, frigidus. Mansisset utique, qualem jam omnes proclamabant, mortuus, nisi aliquis, phisices non imperitus, cadaveri simillimum corpus super dolum

lium volutari, atque folle agitato per anum aërem inmitti jussisset, hominemque tamdiu vexavisset, donec recuperata respiratione, & sensuum usura, ad vitam rediret, multos post annos futurus certissimae morti superstes (1). Batavi, in coloniis Americanis viventis, filia junior perierat febre epidemica. Adcurrit ad feminarum ejulatus servus Angolanus, promisit, se vitae redditurum caram animam. Legit plantas acerrimas, mansit, expuit in nares cadaveris, cui os manu obprimebat, respiravit virgo, & revixit, postquam experimentum decies repetitum fuerat. Quid de vita in eo statu adfuerit, difficile est dictu. Substitit motus cordis, humorum, respirationis, erat, ex definitione recepta, perfecta mors. Servus autem Africanus, nactus corpus mortuum, a putredine tamen haëtenus non corruptum, acerrimis medicamentis nudos narium nervos ita vellicavit (2), ut sopitum id, quod nervos movet, ad motum revocaretur: atque sanguinem ipsum, contracto corde, cogeret moveri.

[1] Experimentum submersi juvenis, post plusculas horas suscitati, intusione spiritus salis Ammoniaci in nares vid. in *Mercurio Helvetico* 1735. passim. Confer CCHII.

[2] Neque mirum videri debet, quiescens cor posse suscitari, cum, inflatione per ductum Chyliterum, aut venas majores, facillime obtineatur, in omni animalium genere, v. PEYER. *Parerg. Anatom.* VII.



moveri. Videtur omnino status puellae fuisse inter vitam & mortem quodammodo medius, si vitam (3) voces humorum per cor, pulmones & cerebellum motum in circulum; mortem vero, destructionem organorum vitalium, tantam, ut restitui nequeant. Medius status erit, Quies circuli sanguinis suscitabilis.

### §. XLIII.

*Subiecta*] Alia enim est vita cordis, alia unguis aut pili; neque vitam universam intelligimus, nisi adcurate teneamus illas omnes vitas peculiares, ex quibus componitur vita hominis.

*Causae*] Ita vocamus (1) ens quodcunque A. causam entis B. quando, posito ente A., existit ens B., & non posito A, non existit, aut exsistere desinit ens B. Quamdiu cordis motus manet, vita etiam superstes est, quamprimum cor a motu cessat, vita & ipsa desinit. Est ergo motus cordis causa vitae.

*Instrumenta*] Causae intermediae, per quas causa prima producit effectum ultimum. Volo clavum infigere parieti ope mallei. Causa corporea prima, est motus  
in

[3] Vitam minimam, INST. MED. 695. de qua nihil potest demi, quin mors succedat

[1] A est causa entis B, quando in A est ratio, quare B potius existat, quam non existat. WOLF. *Metaph.* I. 29. *Germ.*

in corpore natus ad cogitationis inperium. Altera est influxus velocior succi nervorum, in musculos humeri elevatores primo, deinde flexores. Tertia est malleus determinata figura percutiens clavum. Erit ergo effectus ultimus motus in clavo quo se in parietem penetrat. Causa prima, motus in origine nervorum: Causae intermediae sunt Instrumenta; nervi, muscoli, malleus.

### §. XLVI.

*Incipit*] Ordo naturae jubet nos, facere initium historiae corporis humani, ab ipsis initiis corporis ipsius. Verum repugnat lex, qua jubemur incipere ab iis, quae evidentius cognoscimus. Fabricam, & naturam primordiorum corporis humani penitissime ignoramus: Prima quae de foetu nota habemus, viscera, vasa, intelligimus demum ex conparatione cum adulto, & quae ex adulto non licet in foetum transferre, ea fere ignoramus.

### §. XLVII.

*Ordine*] Veritatem quaerens, in universum ea lege utitur, ut nihil ponat, quod non in prioribus positionibus demonstratum sit. Sed in actionibus corporis humani, ubicunque interpretandi initium feceris, nunquam efficies, ut non cogaris ponere aliquid, nondum demonstratum (1). Cor  
uti-

[1] Id ut evitaret SCHREIBERUS tractationem suam

utique est primaria machina, a qua motus sanguinis & vita oritur. Verum cordis actio non potest intelligi, nisi prius exposita sit natura musculorum, sanguinis venosi, spirituum demum, qui ex cerebro & cerebello adveniunt: sed ii spiritus denuo oriuntur ex sanguine, propulso vi ejusdem cordis, de quo nunc demum incipimus philosophari; sic in circulum ambulat oratio, neque initium invenit in ulla particula, quae non necessaria sit notio, ingrediens ideam eorum, ex quibus eam ipsam particulam exponimus. Pulchre HIPPOCRATES (2), omnia in corpore humano ita  
 „ se

suam ab elementis orsus est, fibra & vase. Verum tunc in eam legem peccatur, qua jubemur ordiri a cognitis & facilibus; elementa enim & incertitudinem habent & summam obscuritatem. PRAECEPTOR humores corporis humani, concinno ordine, ab ipsa origine per omnes praeparationes secutus est. Verum in instrumentis praeparationum inepigit, dicere coactus de musculis, ossibus, glandulis, nondum definitis, separavit bilem ab hepate, diaphragma a respiratione, hanc a pulmonibus, omisit denique plurima, & universam imprimis ossium historiam, quam ob eam rem in Aphorismis practicis repetere debuit.

[2] *De locis in homine* I. p. 363. edit. LINDEN. ab initio. Hunc locum alii detorserunt, ut significaret sanguinis motum in circulum. Mihi videtur HIPPOCRATES

„ se habere ad modum circuli , ut finem  
 „ invenias , ubicunque principium quaeras ,  
 „ initium , ubi finem facere tentaveris. „  
 Et PITCARNIVS „ omnia vitcera simul  
 & eodem tempore creata esse , neque exstare  
 unum , quod altero sit antiquius. Omnes  
 enim effectus causae fiunt denuo suarum  
 causarum.

### §. XLVIII.

*Alimentis*] Si lex ordinis jubeat nos , a  
 primis originibus corporis humani initium  
 facere nostrae tractationis , alimenta certe  
 videntur primum locum etiam tunc mereri.  
 Id quod a parentibus habemus , exiguum  
 est ; grano quolibet tritici exilius , igno-  
 tum. Id omne , quo ejus grani magnitudi-  
 nem superavimus , debetur alimentis.

### §. XLIX.

*Liquida*] Quorum aliqua ex aëre am-  
 beunte adcedunt , resorpta per venas resor-  
 bentes (1). PARACELSVS adfirmavit , se  
 vidisse hominem , qui emplastri ope nutri-  
 retur , quod hypochondriis erat inpositum.

*Aqua*] Ex qua THALES (2), PARA-  
 CEL-

RES dicere de morbis qui ab una corpo-  
 ris humani particula , ad aliam transmit-  
 tant.

[1] BELLIN. *de Urin. & Puls.* p. 141. conf.  
 INST. MED. 421.

[2] DIOGENES LAERTIVS in ejus vita I. p.



CELSVS, HELMONTIVS (3), & BOYLEVS (4), origines omnium corporum, vegetantium & animatorum, deducunt; MOSES vero (5), divinis oraculis edoctus, aves & pisces, magnam utique animalium partem, natam esse testatur. Aquae in potu usus vetustissimus est, consentiente cum profana antiquitate Sacra Scriptura. Haec NOACHO (6), illa BACCHO, qui uterque diu post conditum orbem vixit, vini primam inventionem tribuit. Ante eos omnino sola aqua contentos fuisse mortales, merito concludimus, qua ipsa omnia animalia, & universum plantarum genus aluntur. Cerevisia, quam OSIRIDI (7) adscribit antiquitas, multis seculis post NOACHVM inventa est. Nostro etiam tempore & nobis ipsis verus potus est aqua, si quid additur, non ideo adiectum est, ut sit potus, sed ut gratiam addat potui.

Terra]

17. CICERO *de natur. Deor.* I. §. 25.  
ed. GRONOV.

[3] *De lithiasi*, p. 34. seqq.

[4] *Chym. Sceptic.* p. 60. 68. sed non sine dubio.

[5] GENES. IV. 21.

[6] GENES. IX. v. 20.

[7] DIODOR. SICUL. *Hist.* L. I. p. 17. ed. 1604. Sed is idem est BACCHO. ib. & uterque forte NOACHO; v. historiam diluvii imperante OSIRIDE, DIOD. p. 16. & PLUTARCH. *de Isid. & Osir.* p. m. 182.

H

*Terra*] Ante inventum usum aratri fructibus horaeis solis vixerunt mortales : eo invento diu absque venatione videntur fuisse, armis destituti (8). Deus primis parentibus generis humani solas fruges indulgit (9), carnes demum NOACHO (10). Neque recedunt fabulae de seculo aureo : Et PYTHAGORAS (11) antiquissimorum temporum

- [8] Certe usque ad tempora TUBALCAINI. Conf. PLUTARCH. in *declam. an carnes comedere liceat in Opusc. Moral.* Vol. I. vide etiam DICAARCHUM apud PORPHYRIUM & VARRONEM *de re rust.* L. II. c. I. TERTULLIANUS in *Epist. de cib. Indaic.*, non alium cibum in statu innocentiae admittit, praeter ea quae sponte terra dabat. Idem adfirmat HIERONYMUS *advers. JOVINIANUM* L. I. Dissentit quidem D. JUSTINUS *Quaest. CXLIX.* verum ex conjectura, ut rationem reddat sacrificii ABELIS. ASCLEPIADES Cyprius apud PORPHYRIUM *περι αποχης* L. IV. dicit tempore PYGMALIONIS, coepisse homines vesci carnibus, & eos *σαρκοφάγους* pro scelestis hominibus habitos exquisitis equidem tormentis punitos fuisse, nunquam tamen potuisse ad pristinam simplicitatem revocari, postquam semel carniū dulcedinem degustaverunt. (FELDM. vet.)

[9] GENES. c. II. v. 16.

[10] GENES. IX. v. 3.

[11] OVID. *Metamorph.* XV. At vetus illa aetas;

porum auctoritatem adtulit, quando homines carnibus iussit abstinere (12).

*Humores*] Lac & ova, quae hominibus in usum concessit PYTHAGORAS (13), naturam imitatus, quae nascenti homini lac destinavit, quo aleretur, atque instinctu proprio ad appetendum lac eum instruxit. Puer enim recens natus inter omnes actiones primo loco discit sugere, &, si uber non concedatur, admotum ori digitum labiis compressis exsugit.

§. L.

tas, cui fecimus Aurea nomen, Foetibus arboreis &c. & DIOD. SICUL. *Bibl. hist.* L. I. p. 8. ed. 1604. Verum sacrificium pecudum, oblatum ab ABELE, videtur demonstrare, eo jam aevo, & pecudes ali, & mactari coepisse. GENES. IV. v. 4. conf. WALLIS *Phil. Transf. abrig'd.* Vol. V. II. p. 234. Neque recedit natura dentium, qui in homine non ad comminuenda tantum semina facti sunt, molares, sed ad comprehendendas & lacerandas carnes, incisores & canini. Ut adeoque homo sit, ex ipsa Creatoris destinatione, ex eo genere animalium, quod *omnivorum* a cibo dicitur. TYSO contra WALLIS. *Phil. Transact. abr.* V. P. II p. 234.

[12] Bove solum & paucissimis animalibus. LAERTIUS p. 505. ed. Henr. STEPHANI.

[13] - - Nec vobis lacteus humor  
Eripitur, nec mella. . . . OVID. l. c.  
H 2

## §. L.

*Multi*] BRACHMANES (1), Philosophorum vetustissimi, a vestitu dicti Graecis *Gymnosophistae*, HERODOTI aevo ob antiquitatem & sanctissimos mores venerabiles, ab omni tempore, nonnisi vegetabilia, atque animalium superfluos succos inter cibos admiserunt. Non eo minus integra valetudine fuerunt, vitae longissimae, ad subtiles meditationes idonei (2), bonas disciplinas omnes curiose excoluerunt: imo vero dicuntur sapientiae auctores fuisse ZO-ROASTRI (3) & PYTHAGORAE. Sed & serioris aevi anachoretæ Christiani (4),

[1] Inclaruiffe videntur apud GRAECOS per expeditionem ALEXANDRI V. STRABO L. XV. p. 457. THEOPHRAST. *histor. stirp.* L. V. p. 337. ed. STAPEL. &, quod ad recentiorum Indorum mores, TAVERNIER. L. II. p. 429.

[2] Vide subtilissima INDORUM systemata de creatione, apud BERNIER. in *lit. post Iter Mogolicum*. Sed & fabulae eorum antiquissimae prostant, & numerorum inventio Indis debetur, conf. WOLF. *Elem. Arithm.* 51.

[3] Non invenio. A Magis ortos, LAERTIUS ex CLEARCHO p. 7. negat autem acerrime, GRAECOS sapientiam suam a Barbaris didicisse, in *tot. praef.*

[4] Conf. vitas PAULI & ANTONII, conditorum vitae monasticae, & FRANC. BAC. de VERULAM. *hist. vit. & mort.* P. 139. & p. 179.



dum saevitiam suppliciorum fugientes, per inhospitas arenas exsulant, sponte nascentibus herbulis, obviis radicibus, & tenui aquula sustentaverunt vitam, longissimam certe & salubrem.

*Vegetabilibus*] Imo vero prisci veteris Graeciae coloni vescebantur sola Fago, sive Quercu eduli (5), quae nostro etiam aevo in Hispania, & Lusitania mensis magnatum inferuntur (6). Vir singularis ingenii, in Batavia vivens, lautissimae vitae adsuetus, coepit solo gramine vivere, brevi equidem desistere coactus, ob ingruentem Diarrhoeam, quae tamen innoxia, & verno tempore, bobus familiaris est. Ita Persarum exercitus cum solis herbis aleretur, dysenterias immanes passus, magnam militum jacturam fecit (6\*). Tota illa ora maritima Asiae, a Balsora ad Gangem usque, per mille milliaria extensa, solis plantis vivit, incolis BRAMINUM religionem sequentibus. Brasiliae indigenae (7),  
robustioribus

[5] OVID. *Metamorph.* I. Contentique cibus nullo cogente creatis, Arbuteos foetus, montanaque fraga legebant &c. Est autem *Quercus parva, sive Phagus Graecorum & Esculus Plinii* I. B. I. L. II. p. 74. Rhizophagos Aethiopes habet DIODORUS III. 23. & Hylophagos ibid. c. 24.

[6] *Avantures de D. QUICHOTTE* passim in L. I.

[6\*] Xerxis ex Graecia protugi HERODOT. I. VIII. c. 115.

[7] PISO *hist. Basil.* L. I. p. 12. 15. LERY  
H 3 It.

robustissimi mortalium, qui frequenter septem pedum staturam adtingunt, ante Europaeorum adventum non magis centesimo anno decrepiti, quam Europaei, quando sexagenarii sunt, vivebant semine Mayz, saccharo, Aurantiis folis: nunc Christianorum mores morbosque ex contagio admiserunt.

*Foeno*] Puer (8) in deserto loco derelictus a matre, educatus inter Oves & Capras, didicit gramine vesci, atque, cum captus esset, feligere inter oblatas plantas, eas, quibus oves delectantur: Vox quae balantis pecudis fuit: In Batavia spectaculum ejus plebi datum est. Vir inter gubernatores Reipublicae Batavae, per totam Europam fama late notus, secum constituit, sumere in se ipso experimentum, quam parvo homo vivere possit, vixit per plures menses solis pis, cum, eodem tempore, mensa familiae regio adparatu instrueretur. Neque aliquid incommodi passus est, ex victu adeo a consuetudine remoto.

*Piscibus*] Τρεις πατριδες ιχθυοφαγοι HERODOTI (9): deinde populi, qui in finibus

*It. Bras. c. VIII. p. 139. Melle fere & Mandyocca radice, pomisque Acajou. Sed alibi & piscari & venari testatur.*

[8] TULP. l. c. *Obs.* L. IV. n. X. p. 296. Similes historiae & alibi leguntur.

[9] Ad Araxem populi L. I. p. 94. Ichthyophagi Babyloniae finitimi STRAB. L. XVI. 512. De populis *Gedrosiae* a Sinu Persico ad Indum usque habitantibus

bus Aethiopiae (10) vixerunt. Nostro etiam aevo Lappones (11) & alii ultimi septentrionis incolae (12), qui piscibus recentibus carniū loco, exsiccatīs vero ut pane utuntur.

*Carnibus*] Aethiopum gens (13), spretis cerealibus, carnibus solis & lacte vixit, ob longaevitatem nomen naſta μακροβίων, ad centum & centum viginti annorum aetatem non rarius pervenit, quam quidem nos ad ſeptuaginta annos. Hodie (14) pene eadem ratione vivunt eorum poſteri, qui Abyſſini dicuntur, ad quos LUDOVICUS XIV. legationem miſit, quae infidiis Nubiorum ad internecionem deleta eſt, pereunte, una cum

lega-

DIODORUS SICULUS L. XVII. c. 105, & fuſius NEARCHUS apud ARRIANUM in *Indic.* STRABO L. XV. p. 470. & inter recentiores TAVERNIER. L. I. c. IX. p. 258. ubi & ipſa armenta piſcibus & oſtreis aluntur.

[10] HEROD. III. p. 193. fuſiſſime DIODORUS III. c. 16.

[11] Pauciſſima vegetabilia in uſum admittunt, carnibus piſcibusque non ſalitis aſſueti, Cel. LINNAEI *Flor. Lapon.* 101. p. 70.

[12] Vid. deſcriptionem inſulae ſub Arcto ſitae, in L. *der Hamb. Patr.* Tom. III. p. 404.

[13] HERODOT. III. p. 193.

(14) Non invenio, radices certe, fruſtus holraeos, & duplicem quotannis tritici meſſem, omnino in victum adhibent ABYSSINI. V. HIERON. de LOBO *relat. Aethiop.* p. 85. ed. GALL.

legato du ROVLE, AVGVSTINO LIPPIO celebri Botanico. Carnium usum, protinus a diluvio, Deus permittit mortalibus, ea conditione, ut ne sanguinem comederent in quo spiritus vitae inest (15). Interpretari solent, animam brutorum habitare in sanguine, & eam ob rationem interdictum esse usu sanguinis. Verum omnino videtur voluisse DEUS, ne homines viva animalia, & spirantes eorum artus pascerentur, quod ex eo victu, feriores & perfidiores homines fiant; uti de Anthrophagis gentibus constat, quarum societas maligna, & mores belluini sunt. Plane uti bruta animalia, vivis carnibus vitam alentia, ferocissima, & indomita fiunt.

*Omne*] Nos Europae incolae, potum fermentatum varii generis, lac & aquam, omne avium, quadrupedum, & piscium genus, innumerabilia stirpium genera, cerealia, falia denique & olea, mista, cocta, condita, crudave, in quotidianum victum recipimus, vivimus tamen, & integra valetudine utimur, si sobrii fuerimus. Imo vero non CELSVS (16) solum, sed & sapientissimus BACO DE VERVLAMIO (17) simplicem, atque adstrictam severius victus ratio-

(15) GENES. IX. v. 4.

(16) *De Medic.* L. I. c. I. p. 20. ed. 1713.

(17) Laudat victus rationem, aut laxam insigniter, aut severissimam, mediocrem rejicit, *Histor. vit. & mort.* p. 176. seqq. p. 240. p. 332.



rationem damnat, variumque, laxum & mutabile vitae genus praefert.

§. LI.

*Commistis*] Idem vir illustris, quem diximus solis pisces vixisse, paulo post iisdem valedixit, atque ad solitas lautitias rediit, neque eo minus bene valuit.

*Crudis*] Vir eruditus, cum munitissimum castrum in Gallia, captus locorum amoenitate, delinearet, pro exploratore interceptus, & in carcere subterraneo custoditus est, atque, per aliquot menses, solis fabis fuillis cum aqua nutritus. Insolitus victus, primis diebus eum laedere visus, brevi ita familiaris factus est, ut post restitutam innocentiam homini libertatem, saepe sit testatus, se eo victu, eo loco viventem, sanum laetumque vixisse. Propter Podagare metum, solo lacte vivere per multos annos, etiam vulgare est. Ipse BOERHAAVIUS, fero lactis macilentissimo, solo cum pane bis cocto, aliquamdiu, robustus certe, & illaesis viribus ventriculi, supervixit (1).

*Reficitur*] Ex solo, molli, blandissimo lacte, nihilo minus solida ossa, tenacissimi tendines, invicti roboris ligamenta subnascuntur.

*Magnam*] Merae sunt fabulae, quod vini potiores ab abstemiis ipso mentis robore differant. Homini sapienti, sed irae promptissimae, BOERHAAVIUS per sex menses victum ex solo fero lactis imperavit. Obtem-

(1) Ob dirissimum Rheumatismum, quo anno fere 1723. laboravit.

temperavit consilio, defunctus tenuissimo victu, nihilo segnius excanduit. **CALANVS** (2) **Gymnosophista** solo frumento cum aqua pura viuens, ingenii velocitate & acumine nemini **GRAECORUM** secundus fuit (3).

*Materie*] Homo, qui pene omni corporum genere vescitur, & bos, sola gramina pastus, sanguinem habent simillimum, qui arte Chemica resolutus, discrimen sensibus nostris (4) percipiendum non exhibet. A piscium equidem repetito usu gravem & pisculentum odorem sanguis ipse contrahit (4†). Neque id mirabile est, cum animalium succi vitales, a vegetabilibus, unico quasi gradu diversi sint, neque nostri magis distent a succis animalium. Imo vero plantae

(2) **DIODOR. SICUL. L. XVII. p. 573.**

(3) Aliqua utique diversitas oritur, quam effectus medicamentorum demonstrat. In **Curlandia**, resinae **Jalappae** grana viginti vix alvum ducunt, nostratibus dena sufficiunt. **LENTIL. MISCELL. p. 214.** Verum, in ipsa natura partium liquidarum aut solidarum, conspicua diversitas non est.

(4) Diserte **HOMBERG. Act. Parisin. 1712. p. 9.** & ante eum, **BAGLIVIVS** in bile humana, atque vervecina, obscuram diversitatem adnotavit. Serum sanguinis in homine & bove pondere specifico & aliis proprietatibus convenire **TABOR. Tr. I. c. I. p. 65.**

(4†) De ovibus piscibus pastis in Sinu Persico **ARRIANUS in Indic.**

tae ipsae alimenta in suam diversissimam naturam ita noverint commutare, ut aloe amarissimum suum succum ex eadem terra paret, ex qua aliae plantae suavissimum aroma conficiunt: & in uno horto academico LEYDENSI aliquot millia stirpium eundem omnino succum ex communi matre adtractum, in totidem diversos liquores convertunt, quotidem ipsae sunt.

*Facultas*] Ungues intra sex septimanas toti a radicibus renovantur, in iis, qui ob munditiem eos certis temporibus refecant. Ossâ fracta intra duos menses conferruminantur. Capillitium intra quatuor menses totum mutatur, quod adparet, si computes pondus eorum capillorum, qui detondentur. Totum corpus humanum fere intra sex menses aliud est. Verum ea omnis moles, toties decedens, toties renovata, ex alimentis nata est. Quae cum diversissima sint in diversis regionibus, neque eo minus simillima corporum natura, similes ungues & capilli generantur, adparet utique, ex diversissimo victu, simillimas partes corporis humani fieri (5), si nempe ea vis adsit, qua possint in naturam nostram mutari. Quando vero ea vis deficit mutabitur alimentum in peregrinum aliquid & morbus fiet. HIPPOCRATES observat, primos mortales cum solo frumento alerentur multos morbos passos esse, qui praeparatis cibis nunc desinant obori (5†).

Con-

(5) De Nutrit. & increment. 434. &c. Aphor. Pract. 25.

[5†] Locum vide LIII. not. 2.

*Constituere*] Sint omnia in corpore humano eadem, deficiat alimentum, brevi certe peribit. Propinetur autem nonnisi panis aterrimus, aqua pura, generantur omnes corporis humani partes, certe aequae perfecte, atque ex lautissimo victu solent. Est ergo in corpore humano *aliquid*, quod ex aqua & pane, entibus a natura corporis humani alienissimis, conficiat corpus humanum; quod idem ex aqua sola producat omnes liquidas partes corporis, ab aqua diversissimas. Neque, si abfuerit illud *aliquid*, unquam ex iis corporibus, liquidis aut solidis, quibus in victu nostro utimur, si omne robur universae naturae conspiraverit, poterunt corpora nasci, quae liquidis aut solidis corporis humani partibus similia sint. Nunquam junctae vires universi corporei, elaborarent dentem unicum humanum, nisi in corpore humano adesset illud *aliquid*, quod ex cibo & potu dentem facit. Sed id ipsum *aliquid* vocant *Naturam*, quae est, collectio omnium functionum peculiarium, quarum opera alimenta, intra corpus adsumpta, transmutantur in similitudinem corporis humani.

*Cerealia*] Ita vocantur plantae, quae in stipite fragili, nodoso gerunt flores apetalos, & semina farinacea. Princeps est Triticum, deinde zea, secale, hordeum, avena, milium, oryza, gramen Mannae & Mayz. Accedit diversae indolis planta caule non nodoso, Fagopyrum (+). Ante frumentorum

[+] Et sesamum, quo pro Cereali utuntur in regionibus



rum tempora homines glandibus usi sunt. Inter vegetabilia avena & hordeum promptissime acescunt, adeoque salubrem dant panem, in morbis, ubi putredinem metuimus.

### §. LIII.

*Matura*] Ante maturitatem, cum aquosa sint, flatus generant, & exigui nutrimenti sunt.

*Siccata*] Diffusato nimio humore, qui non alit.

*Mundata*] Ab involucris, quae semen ab injuriis insectorum defenderunt, dura ipsa, neque concoquenda hominibus (1). A glutinis nempe debent repurgari, furfur vero sive membranam propriam seminis, male rejicimus cum salubrior fiat, si furfura non remota fuerint.

*Trita*] In far, vel purius ador. Verum & tunc mali nutrimenti sunt. Equi, cruda farina pasti, pingues fiunt, sed inertes & debiles.

*Aqua*] Ita fit in pulvem, quae viscidissima est, & leucophlegmatiam, sive aquosum languorem in corporibus humanis generat (2), neque dissolubilis est in aqua, pueri enim pasta ex hamo pendula utuntur ad capiendos pisces. Celeriter pinguefacit brute animalia, sed morbosa est ea obesitas, & saepe atiles volucres suffocat.

*Fer-*

nibus calidioribus, ubi triticum deficit.

DIODOR. XIX. c. 13.

[1] Purgantem vim inesse HIPPOCR. de diaeta II. fere ab initio.

[2] Conf. HIPPOCR. de Diet. L. II. §. p. 216. ed. LIND.

*Fermentata*] Farina, ab infectis & humiditate aëris defensa, per aetates incorrupta manet. Verum, si cum aqua subigatur in pastam ductilem, & accedat levis tepor, fiet cito se ipsa major, oborietur motus intestinalis in particulis ejus, concident foramina in superficie, exhalabit odor fortis & acetosus, nascetur sapor acidus & rodens &c. eam mutationem vocant *fermentari* (3). Farina hac ratione praeparata, glutinosam naturam exuit, fit friabilis, & aquae facile miscetur. Experientia autem constat, ea omnia digeri facillime, quae in aqua promtissime resolvuntur, non digeri aut difficulter quaecunque aqua non dissolvit, uti pingua in universum difficilis sunt digestionis. Cum autem sapor & odor acidus, eam palato reddant ingratham, atque insalubrem, debet fermentatio, aliquatenus protracta, opprimi adjecto igne, sive *coquendo* pastam farinaceam, ut fiat *Panis*.

*Cocta*] Igne liberatur pasta farinacea a majori parte humoris, quo ipso perit magnus fomes fermentationis (4). Ea vi ignis inducitur crusta dura, tota pasta fit sicca, durior, edulis. Si secundo coquatur igne consimili, fit *Panis biscoctus*, qui resistere possit calidissimo & humido aëri, qui sub Aequatore ferrum rodit, & ad futuros annos servari, si modo arceantur vermes:

is

[3] Exquifita historia fermentationis exstat apud BOERHAAVIUM *elem. Chem.* II. p. 166. seqq. conf. ejus historiam physicam apud HALES *vegetable statiks* c. VI. totum.

[4] BOERH. *Elem. Chem.* II. p. 187. ed. LUGD. BAT.

is panis licet videatur durissimus, diffluit tamen in aqua, minime glutinosus, & inter omnia panificia longe saluberrimus.

*Mundatas*] Ab immunditie & pilis, ne id nobis contingat, quod rupicarpis (5), ut pili deglutiti in ventriculo, glutinis viscosi ope, in pilam duram cogantur, dirorum maiorum & mortis causa futuri. Deinde a sanguine, juxta Moisis praeceptum, in calidis regionibus ideo utilissimum, quia caro, quae sanguinem proprium retinet, longe citissime putrescit.

*Tundendo*] Caro omnis tusa redditur (6) sapidior, & concoctionis faciliior: Succus enim ex effractis vasculis animalis effunditur, & aequabiliter distribuitur inter carnes. Idem facit fuga animalis, ante mortem canum terrore fatigati, unde vi captae ferae atque aves, ob saporem acutiorem longissime praeferruntur animalibus eorumdem generum domi enutritis, atque jugulatis.

*Aëre*] Carnes modico tempore adservatae, delicatiorum hominum gulae magis adrident, & facilius digeruntur, ut pondere duplo majori

[5] In vaccis, lingentibus vitulos, frequentes, foliis ex pilis. In rupicapris vero nascuntur Aegagropilae, ex plantarum conglobatis fibris, non adeo Doronici solius, (quae eadem sententia est WELSCHII & HARDERII E. N. C. Dec. II. Ann. I. App.) quam potius ex capillitis, quod praecedat nascentes plantas umbelliferas & capillares. Conf. SCHEVCHZER. It. Alp. IV. p. 186. VI. p. 448.

[6] VERULAM hist. vit. & mort. p. 336.

jori absque noxa possint adsumi. Quando nempe caro prima principia putredinis subit, humores ejus fiunt magis veluti volatiles, sales acutiores, solida teneriora. Verum idem aër, si frigidus fuerit, & ventis validis agitat, exorbto humore nimio, prohibet putredinem, maxime si fumus adcedat (7).

*Coquendo*] Carnes cum aqua coctae, vim suam pene omnem effundunt in jus (8), atque sola aqua renovata assiduo, ita educitur, quidquid fuit saponi & nutritii, ut non nisi effoeta, insipida, inutilis caro residua fiat. Inspissatum vero jus (9) integerrimas vires carniū possidet, & destillatum magna vi ignis, majorem copiam dat salis (10) volatilis, quam ipsa caro, saporior etiam, & longe velocius putrescens. Caro enim per triduum fere, sub coelo non nimis calido (11) ferri potest, jus post duodecim horas corrumpi incipit.

*Assare*] Hac voce intelligimus, carnis coctionem absque addita aqua, quae vel aperto igne vel in clauso vase perfici potest. *Assatio*

[7] In quo habitat sal volatile acidum ligni, inimicum putredini.

[8] Inde BACONI elixae carnes displicent, *hist. vit. & mort.* p. 334.

[9] *Consummé.*

[10] In DODARTII & GEOFROY experimentis, caro siccata insignem adhuc copiam salis volatilis dedit, v. *Mem. de l'Acad. des Sc.* 1730. 1732.

[11] In Insula Jamaica caro intra quartam horam putredinem contrahit. Sir. HANS SLOANE *Nat. Hist. of Jam. Introd.* XV.



fatio ad apertum ignem, crustam duram in superficie carnum exurit, intra quam coerciti humores, valida vi flammæ agitati, ad naturam alkalinam propiores redduntur, pinguedo flava redditur, & amarior, tota caro lapidior (12), ficcior, & bonæ concoctionis (13) fit. Ignis nempe apertus, intra modicum tempus, mutat sales acque valide, atque calor intra dies plures. Sed adhaerens præterea fuligo, quæ ab igne adscendit, & assatas carnes aliqua nigredine extus obducit, efficit, ut assatæ carnes majori copia adsumptæ, possint febres calidas (14) producere.

*Frixando*] Assatio cum butyro vel oleo. Ea ratione præparatæ carnes pessimæ concoctionis fiunt, & receptæ in ventriculum debiliorem, rancescunt cito atque pertinaciter; hinc febricitantibus veneni simillimæ sunt, et a salubri diæta longissime exfulare debent. Carnes nempe ea ratione longe validiorem ignem patiuntur, quam in elixatione, cum oleum 600. gradu ebulliat aqua

212.

[12] Omnium sapidissima, quando vivo igne, magna escara exusta, carnes torrentur, quod moribus barbarorum receptum est. LERY *It. Brasil.* p. 152. & inter recentiores, LABAT. in *Itin. American.*

[13] Modica assatio omni alteri præparationi præfertur a VERULAMIO l. c. p. 305.

[14] Ab usu carnis assatæ, per aliquot menses absque ullo alio cibo adsumptæ, ex consilio empirici, febrem hæcticam funestam vidi.

212. Quare omnes salis carnis & olea acriora fiunt.

*Condiendo*] Cibi condiuntur, vel ad arcendam putredinem, vel ad augendam gratiam saporis, vel ad faciliorem digestionem. Condimenti prior classis perficitur frictione cum sale marino, nitro, alumine, vino, aceto, exsiccando in furno, ad ventum; ad secundam pertinent sales & acetosi, & dulces; ad tertiam aromata.

### §. LIV.

*Sal*] Caro, quae, sibi relicta, intra triduum corrumpitur, potest in multos annos fervari, si sicco sale marino saepius fricetur, vel sali eidem in muriam resoluta inmergatur. Eadem est efficacia salis communis, salis gemmae, ammoniaci, nitri, & aluminis, nisi quod alumen saporem ingratum carnibus addat (1).

*Acetum*] Saluberrimus potus aceti aqua diluti fuit apud militem Romanum. Eundem SERVATORI exspiranti obtulerunt, non irrisuri, sed de proximo potum quae-rentes. Vinum atque acetum, putredinem carnum inpediunt, ex acida sua natura: Ita aprugna caro in vino conditur.

*Aroma*] Pipere aut Zingibere saepius perfricta caro non putrescit, aroma nempe infecta abigit (2), & exsiccat humiditatem.

*Oleum*]

[1] Conf. de admistis ad carnem salibus variis experimenta PETITI Medici, *Mem. de l'Acad.* 1732.

[2] RHEDI de anim. intra anim. p. 179. ed. BAT.

*Oleum*] Carnes ex Britannia in ultimas Indias avari possunt, si butyro contegantur, & sal super adspargatur, observante BOYLEO (3).

*Conditorum*] De iisdem omnibus, de quibus dictum est, tamquam praesidiis conservandarum carniū, superest, ut dicamus, ob eam efficaciam consideratis, qua palato placent, cibosque reddunt gratiores. Huc ergo uti veniunt I. *sales* omnes. Quorum alii *acidi* sunt, Vinum, succus citri, limonum &c. Ea acida grato acumine stimulant torpentem ventriculum, resistunt nauseosae rancedini, quae a pinguibus & carni- bus solis facile oboritur; neque ideo (4) appetitum ciborum suscitant, quod fermentum ventriculi augeant: tantum enim abest, quin ciborum concoctionem adjuvent, ut potius carnes per annos intemeratas conservent. Alii sales muriatici, praeter acidam latentem naturam, inimicam putredini, atque salivam cientem, aliquid habent singulare, quo paucae omnino gentes carere possunt (5): *Acetum* porro sal est (6) acidus, sed volatilis, generatus a repetita fermenta-  
tione:

[3] *Exper. phys. mech. de aëre nov.* p. 209. Namque insecta arcet, & aërem excludit, absque quo nulla oritur putredo. Vid. BOYL. *cont. Exp. Phys. Mech. de natur. Aër.* ubique.

[4] Confer ea quae dicuntur ad INST. MED. 88.

[5] Lappones sale nunquam utuntur LINNAEUS *Fl. Lap.* 70.

[6] *Elem. Chem.* II. *Proc.* L.

tionē: Grata est in eo aciditas, neque cogit (7) humores nostros, solo lacte excepto, quidquid fabuletur inperitum vulgus, sed diluit, roborat, mobili aciditate resistit putredini, & solida aliquantum constringit. *Aroma* vocamus omne vegetabile, quod saporem atque odorem prae caeteris eximium prae se fert, cum vi insigni calefaciente, sive ex Indiis advena sit, sive Europae indigena. Nobis Angelicae radix (8), Abrotanum, Acorus &c. (9) aequo jure dicuntur Aromata, quam quidem Piper aut Galanga. Constant vero Aromata copiosissimo oleo, in quo latet mobilissimum illud Aromatis robur, quod *spiritum rectorem* (10) dixerunt Chemici. Quare mirifice excitant nervos, stimulant partes solidas corporis humani, motus quoscunque augent & incitant. Quae ipsa causa est, cur calida dicantur, nam a motu calor est. Thermometrum certe insertum acervo Piperis, nullo gradu adscendet; mortuo cadaveri piper admotum quavis ratione, caloris nihil reddet. Sed adsumtum intra vivum corpus, stimulis villis solidis, contractione vasorum aucta, motum sanguinis reddet citatiorem, calorem generabit.

His demum subjiciendum est omne genus muriarum, quae irritamenta gulae luxuria nostra quovis anno novis inventis auget.

Eae

[7] L. c. & Proc. 127. p. 378.

[8] Caulis ejus princeps est aroma Lapponum  
LINNAEUS *Flor. Lapon.* 101. p. 69.

[9] BOERH. *Chem.* II. p. 18. catalogum habet  
Aromatum.

[10] II. p. 127. &c.



Eae vero omnes ad aliquam classium jam enarratarum referri possunt. Huc celebre illud Romanorum *Garum* (11), ex hepate scombri piscis, cum acerrimo sale intime misto. Quale est *Caviaro* (12) Russorum, semiputridum ovarium piscis Accipenseris, *Botargo* (13), *Ansiouis* (14) &c. Quae omnia vim suam a sale marino fere habent.

### §. LV.

*Horaeorum*] Nomen habent ab anni tempestate, quod eorum proventus ad certos menses adstrictus sit. Omnes pulposi sunt, mollesque, omnes in acidum propensi. Quando maturi sunt, quod in malorum genere ex nigro colore seminum cognoscitur, & eo sapore, qui in quoque genere perfectissimus est, tunc facilis concoctionis sunt: nisi quod universi flatu scateant, eumque, igni admoti, cum sibilo, & amata pueris cantilena, emittunt, poma in primis & rapa. Pomum certe, vacuum BOYLEANUM, in quo positum est, vigesies se ipso

[11] PLIN. *histor. mund.* XXXI. c. 8.

[12] TAVERN. l. c. VII. p. 90. ed. BAT. TOURN. *Voy.* L. III. p. 130, Tom. I. Sed III, L. XX. p. 259. videtur utrumque distinguere, non sine contradictione aliqua.

[13] Ovarium mugilis piscis in Galloprovincia salitum dicitur *Boutargue*. TOURN. *Voy.* Tom. I. L. III. p. 130.

[14] Encrasicholus piscis AELIANI. V. ARTE-  
DI *Ichthyl.* *Synonym.* p. 17.

ipso majus, intra unum diem naturalem replet aëre elastico, qui aliquando praeterea duplo est aëre, quo utimur, ponderosior (1). Cum ergo fructus horaei, & acidam naturam habeant, & flatulentam, fermentationem concipiunt ingesti ventriculo, si crudi sint, & calida tempestas. Aër elasticus & ex fermentatione generatus, si per ructus & alvum viam sibi faciat, bene est; si vero constricto ventriculo retineatur, tumorem in eo excitat, dolorem, inflammationem, mortem ipsam. Vim (2) pestilentis halitus, qui ex succis fructuum horaeorum, in fermentatione ipsa, per angustam rimam dolii erumpunt, funesti eventus declarant. Sed ignem passi fructus horaei, ejecto aëre omni, jam noxa carent (3).

## §. LVI.

- [1] BOYLEVS mercurii ope definivit aërem generatum intra vacuum, vid. *Experim. Physf. Mech.* cont. p. 30. &c. Sed elegantius longe HALE's vim generati aëris ex aquae compressione aestimavit, atque revera reperit, pomum gignere aëris volumen quadragesies & octies (*Vegetable statics Experi.* LXXXVII. p. 202.) toto pomo majus, eumque aërem, qui duplam omnis atmosphaerae pressionem sustineat, (ib. *Exper.* LXXXVIII.) ex uno pomo natum, vim exserere 11776. (p. 209.) librarum.
- [2] E. N. C. *Dec.* III. *Ann.* II. *Obs.* XLV. p. 56. & *Ann.* III. *Obs.* CLV. atque ipse BOERHAAV. *Elem. Chym.* II. p. 180.
- [3] Quae vix quartam partem generant ejus copiae aëris, quae ex crudis provenit. BOYLE l. c. p. 32.

§. LVI.

*Aqua*] Potus communis omnium quae vegetant, *Vinum Catholicum* Alchemistarum (1), absque quo nihil crescere dixerunt, live planta, live animal fuerit, live metallum.

*Pura*] Quae simul levissima est; omne enim peregrinum, quod aquae miscetur, ponderosius est, terra, sabulum &c. Inde factum est, ut illi Aethiopes fuerint *μακροβιοι* (2), quorum aquae levissimae ligna non sustinent.

*Cursu*] Aqua purissima (3) est pluvia, non ea quae ex coelo delabitur stillicidio, & lixivium est salium omnium qui per aërem obvolitant, sed quae, lapsa coelo, per lapidosa summorum montium percolata (4) est, & de-

[1] Vid. BOERH. *Elem. Chem.* Tr. de aq.

[2] HEROD. III. p. n. 191. Sed ad ligna ponderosa regionum calidarum sapienter refert BOERH. *Elem. Chem.* I. p. 551. 611.

[3] Purissima quae fit ex nive in nivem delapsa, in loco deserto BOER. l. c. 601. Sed pura nunquam habetur.

[4] Quae communis est origo scaturiginum, & saepe mihi visa in summis Alpibus, fractis ad scopulos summorum verticum nubibus, atque in pluviam resolutis, quoties levior aër eas desinebat sustentare. Neque video refutatam esse hanc sententiam a DERHAMO *Theol. Physic.* p. 70. Namque aeterna lege, ne unicum fontem aut lacum vidimus in vertice, quo non superio-

deposito, quod peregrinum vexerat, purascaturit, fluitque praeceps per alveos arenosos (5), puros.

*Crudus*] Aqua pura cruda optima est; neque sapienter fecit NERO (6), quando exhaustis omnibus luxuriae irritamentis, nauseans ad omne vinorum genus, aquam decoctam, ex aureis vasis potitavit.

*Coctis*] Aqua ex coelo delapsa, & protinus vasis recepta, plena est ovis insectorum (7), & plantarum seminibus visum fugientibus. Quare sibi commissa, varium algae genus, & minutissimas animalium species citogignit, si quam maxime puro vitro sollicite aservetur. Quando vero unica ebullitione praeparatur, tunc omnis vis germinans plantarum & animalium perit: Plures ebullitiones nocent, & aqua eo plus sedimenti (8) deponit, quo coquitur diutius.

*Coctis*] (9) Sequitur naturam massae non fermentatae, (LIII), & flatulenta est, quod in-

riores sint rupes, colatoria pluviae, aut deliquescens nix defluat.

[5] Cum arena sit merus crystallorum acervus, variorum colorum, REAUMUR *Mem. de l'Acad. des Scienc.* 1718.

[6] SVETON. in *vit. Neron.* p. m. 247.

[7] LEVWENHOECK in unica aquae gutta vidit animalcula 27, 300, 000. *Contin. Arcan. natur. detect.* ep. XVI.

[8] Sola repetita decoctione pene tota in terram abit BOYLE *de orig. form.* 259. & NEWTON. *Optiks Quer.* 22.

[9] Huc omne genus emulsionum, succi citri &c. aquae misti.



incommodum in decocto hordei maximum effecit, ut GALENUS (10) ei praetulerit decoctum panis, in quo fermentatio flatus consumsit.

*Cerevisia*] *Vinum ex Cerere*, inventum Osiridis (11), cum orbem obeuns, regiones viti alendae aptas artem conficiendi vini doceret, alias, quae frigidiores terras colerent, aut nimis depressas, artificio donavit ex tostis, atque infusis cerealibus *Cerevisiam* coquendi, quae a vino non admodum differet. Apud Germanos (12) certe, usus *cerevisiae* est antiquissimus. Haec autem est *cerevisiae* praeparatio. Cereale aliquod, ut hordeum, integrum, cum glumis, & cortice, calenti aquae injicitur, tumet, maceratur. Mox grana aquae exempta colliguntur in acervos, ea vero quiete, & fermentationis initiis incallescunt, ut manus calorem vix tolerare queat, & singula grana sua germina protrudere incipiunt. Ne autem germinatio perficiatur, disjicitur acervus, & frumentum omne torretur super craticulam ad ignem, fit *Malta* (13). Ea viscosa est, & dulcis, atque cum aqua vim suam omnem facile com-

[10] Plus nutrire panem, quam Ptisanam etiam optimam L. *de Ptis.* c. V.

[11] DIOD. SIC. L. I. p. 13. aut BACCHI *id.* L. III. c. 73.

[12] Apud TACITUM *de mor. Germanorum*, & Gallos apud DIODORUM *Bibl. Hist.* V. c. XXVI.

[13] Totam historiam breviter exponit BOERHAAVE *Elem. Chem.* II. pr. XLIII. p. 192.

communicat: Injicitur ergo Malta aquae ferventi, educitur farinosum omne. Id decoctum coquitur, inspissatur, reponitur, & si tunc bibatur, resolvit omnes humores adusque diarrhoeam, vel dysenteriam (14), neque inebriat. Sed collectum in cados, fermentaretur, laceret; id ne fiat reponitur in calore sexaginta graduum, & injicitur planta amara quaecunque, v. c. lupulus. Atque sic paratur potus inebrians, qui si bonae notae (15) fuerit, praebet Alcohol, non deterius eo, quod ex vino stillat. Verum meracissima (16) ea cerevisia robustis corporibus non convenit (17).

*Vini*) Inventum NOACHI (18), prior antiquius, nomen suum vetustissimum *ין*, in radicalibus linguis conservat. Invenienti causa fuit (19), quod incolae regionum calidarum aquas parcas, saepe impuras haberent,

[14] Quae frequens a cerevisiis, non perfecte fermentatis, qualis est *Moll Batavorum*.

[15] BOERH. I. C. Pr. XLV.

[16] Quae calorem aequatoris fert. *Transf. abrig'd* III. P. II. p. 547.

[17] Neque in universum Cerevisiae potus potest inter naturales recenseri. HOFMANN. *Med. Syst.* I. p. 549.

[18] GENES. IX, 20.

[19] Non videtur. Namque regiones ardentissimae, sub Tropicis sitae, vino carent. Incipiunt autem vina ad gradum latitudinis fere 22-30 inde nascitura ad gradum latitud. 51. vel 52. postquam ad 70. cerevisiam coquunt. Ultimus septentrio aquam puram bibit.

rent, & a potu protinus diffolato, exhausti solis ardore, deficerent viribus. Quare quae-fiverunt potum salubrem, aromaticum, ca-lesfacientem, & pleraeque quidem gentes in uvas inciderunt. Vinum vero exquisitissi-mum paratur, si uvae maturae reponantur, tuncque ex uvis sponte crepantibus stillans *Nectar Vini* (20) colligatur. Id antequam fermentetur, frigidum & flatulentum est, ac Dysenterias efficit. Sed perfecta fermen-tatione, acidum, mite, calidum, inebri-ans redditur. Vulgatior autem modus est, ut uvae pedibus hominum aut ma-chinis calcatae, cogantur humorem suum fundere, copiosorem, sed viliores priori. Pot-est autem vinum etiam dici quilibet fermenta-tus liquor, etiam si ex fragis, aut sambuco, aut alia bacca paratus fuerit. In universam vinum praestat, quoties stimulo & calore opus est in corpore humano. In sano ho-mine, & in febriente aqua diluendo acria, resolvendo spissitudinem sanguinis, magno praestat intervallo.

### §. LVII.

*Attenuatio*] Ita vocamus divisionem cor-porum in moleculas minores, qua eadem opera augetur superficies (CCXX.). Sed superficiei corporum adplicantur vires cor-porum vicinorum. Ergo augendo superfi-ciem, augeo vires humanas, quibus cibus subigitur.

*Mistio*]

[20] Vid. MILLER *Gardeners Dictionary* sub nom. *Wine*.

*Mistio*] Non alia praeparatio ad vitam nostram conservandam magis necessaria est. Sed ei adtenuatio maxime favet.

*Lubricitas*] Fit a molecularum superficiibus adeo politis, ut facillime, & absque adritu super se invicem moveantur. Id fit repetita varietate motus.


*Fluiditas*] Infima plebs saepe varia pene absque potu ingerit, digerit tamen facitque fluida, id fit ab adtenuatione molecularum & levitate superficierum.

*Facilior*] In alimento aliae partes sunt, quae superantur a viribus nostri corporis, atque in naturam nostram transeunt. Aliae partes nulla vi nostra superantur, sed egeruntur non mutatae, uti pelliculae cerasorum, grossulariae &c. Eae partes ergo debent separari: & vires, eas separantes, in corpore humano adsunt. Verum praeparationes possunt praemitti vicariae digestionis humanae. Qui jus carniū biberit, non eget iis viribus, a quibus fibrae carnae debent diffringi, ut succum effundant. In Juvene pene enecto perpetuis haemorrhagiis, solum jus carniū perpetuo assumptum in tanta debilitate se obsequiosum praestitit, ut vita potuerit conservari ab alimento facillimo; testis historiae est LOWERUS. Omnes ergo praeparationes alimentorum sunt imitamenta quaedam naturae (\*).

MAN-

[\*] *De mot. Cord. c. II. p. m. 70.*





## MANDUCATIO CIBORUM.

## §. XLIII.

*Cibi*] Ordo jubet ut consideretur I. Alimenti natura §. XLIX. - LVII. II. Instrumenta, quorum ope alimentum in naturam nostram convertitur LVIII. - - CCCCXXXIII. III. Historia ejus, quod de alimento adponitur ad corpus humanum. CCCCXXXIV. - CCCCLXXX.

*Manducatione*] Ita vocatur alimentorum in ore adtenuatio per tritum peracta, conjuncta cum dilutione, quae accedit a saliva. Ejus objectum primum sunt cibi solidi, qui adtenuari debent, ut majorem superficiem praestent viribus humanis, quae digestionem perficiunt. Secundarium objectum aromata & alia, quae ob voluptatem magis, quam alimenti gratia in ore comminuuntur. Explicare manducationem, est adsignare causas, a quibus cibi in ore conteruntur.

## §. LIX.

*Morsus*] Actio, qua cibi duri in suas particulas resolvuntur efficacia Dentium. Quam necessariam esse demonstrat durities eorum ciborum, qui aliquando hominibus offeruntur, nucleorum &c.

*Maxillae*] Quae in foetu duplex (1) est,  
ut

[1] KERKRING. *Osteogen. c. IX.* ALBIN. *Osteogen. f. 43.*

ut eo felicius incrementa sumere possit, in adulto simplex. (2). Inferioris maxillae defectus deglutitioni etiam nocet. Fuit in exercitu Dux non mediocris famae, cui ab inpetu globi plumbei maxilla inferior destructa fuit. Is quoties cibum adsumeret: cogeatur propria manu linguae inponere (†). Eadem movetur variis modis, deorsum, sursum, antrorsum, retrorsum, dextrorsum, sinistrorsum, atque motu ex his omnibus conposito, *molitorio*. Uti enim in molendino molaris lapis super subiectum firmum lapidem fruges comminuit, ita maxilla inferior similem commolitionem perficit mota ad immobilem superiorem maxillam.

*Tuberculo*] Omnes anatomici in ea sententia fuerunt, articulationem maxillae inferioris cum osse temporum committi in fossa partis squamosae, ante meatum auditorium posita. Primus autem RAVIVS (3) &

[2] Male ejus duas partes esse GALEN. *de ossibus* cap. V. Text. I. quem & VESALIUS L.I. p. 38. & INGRASSIAS in GALEN. l. c., & FALLOPIUS, & alii refutant.

[†] Rationem vide LXXI. not. 2.

[3] Vid. ERNDL. *It. Angl. Batav.* p. 96. Eum PALFYN. in editione priori Osteologiae (1702.) secutus est, (namque in posteriori sententiam mutavit 1727. p. 208.) BOERHAAVIUS ipse credidit RAVIO, novam fabricam tradenti, adeo certe persuaso, ut omnia scelesta sua in eam sententiam filis aeneis figuraverit, ALBIN. *Catal. Leg. Raz.*

& in se ipso, & in dissectis cadaveribus dicit, fossam eam plenam esse materie glandulosa & subpingui, quae ad motus celeritatem & facilitatem faciat, quae si absit, ingratus strepitus inter manducandum oboriatur; Processum vero obtusum maxillae inferioris dearticulari cum tuberculo ossis temporum, ante eam fossam posito, ad cuius naturam processus maxillae inferioris formatus sit, ut secum conveniant.

*Lamel-*

*Rav. praef. & p. i.* Sed contraria sententia ab HEISTERO (*de mast. p. 9.*) ALBINO [*de Ossib. §. 110.*] WINSLOWO [*des os frais*] Tom. I. §. 347.] aliisque defensa est. Nobis non admodum videtur errasse RAVIUS. Certum est, & tuberculum, & fossam, crusta cartilaginea obduci; etiam certum, maiorem esse portionem cartilagineam tuberculi, minorem quae in fossa est [MONRO *Act. Edimburg. I. Art. XI. p. 125.*] & in ea fossa glandulosam, adiposamque materiem reperiri [v. MONRO p. 126.] & nuperrime, in cadavere recente, sibi permissam maxillam, compositis in mutuos occursum dentibus, ad tuberculum haesisse, retrotractis dentibus inferioribus demum delapsuram in sinum. Et si consideres, motum omnino ad utramque partem perfici, non erit absque fide, variam esse articulationis naturam in variis corporibus, & in aliis vulgarem, in aliis novam sententiam verior esse, semper autem & tuberi, & fossae condylum committi.

*Lamellae*] Vbique ad ossium articulationes conveniunt : I. Lubricae cartilagines, obductae capitibus eorum ossium, quae committuntur. II. Ligamenta, atque capsulae comprehendentes commissa capitula, orta ex conjunctione ossis cum Epiphysi, quod solus COLUMBUS (4) verissime docuit. Sed Epiphyses in junioribus ab osse discedunt, & ab ossibus suis separatae habentur in Thesauris RAVIANIS (5). III. Humor lubricus, albumini ovorum similis, stillans ex arteriis (6), & glandulis HAVERSII (7). Verum praeter haec omnia, quae ubique reperiuntur, haec maxillae inferioris dearticulatio, propriam machinulam habet, qua cavetur, ne frequentissimo motu & adfrictione quotidiana, consumantur (8) crustae cartilagineae maxillae & ossis tem-

[4] *De re anatomica* I. c. II. p. 5. ubi addit, hunc primarium usum esse Epiphysium, refutatus a Cl. PLATNERO *de Epiphys.* XIIX.

[5] Vbique in *Catal. Thes.*

[6] RUYSCH. *Advers.* II. n. III. T. III. f. 3. quo refert glandulas HAVERSII, quas glandulas esse negat.

[7] Magnis, conglomeratis, in ossium recessibus nidulantibus, v. HAVERS *Osteol. nov. Disc.* IV. p. 188. T. I. f. 2. Adde medullam transfudantem per crustas tenuissimas Epiphysium, mistam cum HAVERSIANO liquido. conf. HAVERS. l. c. *Disc.* IV. & III. MONROO *Osteol.*

[8] MORGAGNVS vult, eam repellere maxillam



temporum. Namque, praeter eas crustas, inter processum (9) maxillae, & ossis temporum tuberculum, interponitur meniscus (10) cartilagineus, utrinque excavatus, utrumque tuberculum recipiens, per ambitum ligamentis (11) firmatus.

### §. LX.

*Actio*] Maxilla inferior a superiori ducitur, ut in intervallo secunda pollicis phalanx contineri possit (\*). Si hiatus amplior fuerit, periculum est luxationis.

*Biven-*

lam inferiorem elatere suo, & juvare debiliorem actionem musculorum detrahentium ADVERS. III. §. 31. p. 66.

[9] Quem in medio elevatum, ad latera depressum, melius exprimit CASSER. L. II. T. VII. f. 2. apud SPIGELIUM.

[10] A MORGAGNO post VESALIUM, VIDIUMQUE depictus eleganter *Adv. c.* Tab. f. 1. 2. 3. tum a MONROO *Act. Edimburg.* T. II. d. e. Nobis visa est cava, versus maxillam utrinque, versus tuberculum vero, crassioribus oris, medio depressior, quales icones sunt MONROI.

[11] Sic ut praeterea inferantur ei aliquae fibrae Musculi Pterygoidei externi, DOUGLASS. *myogr. comp. spec.* p. 58. nobis visae constantes esse, cum MONROO p. 127. Adnascitur vero sinui, tuberculo, & condylo, cum mobilitate aliqua, conf. ALBIN. *de ossib.* 30. magis vero tuberculo.

[\*] Facile amplius & duorum pene pollicum intervallo.

*Biventrium*] Hoc nomine etiam veniunt, qui *Coracohyoidei* dici solent, sed addito colli nomine, neque quidquam cum nostris commune habent.

*Mechanismi*] Musculus omnis, quando agit, brevior fit, & partem mobilem, cui annexus est, trahit ad alteram firmiorem, secundum eam lineam, quae est rectissima, Eo modo si motum suum perficerent Biventres, elevarent retrorsum inferiorem maxillam, nunquam deprimerent. Verum in itinere suo trochleam sunt nacti, quae in pueris membrana callosa, in adultis cartilagineus est anulus. Ad eam reflectuntur, & ea ratione punctum fixum eorum est ad os hyoides (1), ita, ut, trahente ventre

- [1] Non quidem, quod Trochlea adsit, neque ob perforationem musculi Stylohyoidei, quae neque perpetua est, neque valet, ob debilitatem Stylohyoidei, mutare potentioris Biventris efficaciam: Sed ob fibras tendineas valentes, ortas a tendine Biventris haud longe ab osse hyoide, insertas late, debiliores quidem ossi hyoidi, [MONRO. *Act. Edimb.* III. T. II. f. 1. 2.] robustiores partim ipsi Mylohyoideo CASSER. l. c. C. partim cingulo variae figurae facto concurrentes sub eodem Mylohyoideo, saepe nobis viso, dicto etiam Cl. ALBINO 208. & MONRO l. c. f. I. P. quibus omnibus fit, ut Biventris punctum firmius fieri possit os hyoides, quoties per suos musculos id detractum & firmatum est, & tunc quidem os aperit. Quo ipso  
non

tre primo, sequatur venter secundus, detractus maxillam, non ad originem suam, sive processum mamillarem, verum deorsum ad os hyoides.

*Artificio/ae*] Ad detrahendam maxillam inferiorem, oportebat musculos adesse proprios; non magnos equidem, cum pondus & directio libera maxillae, ejus decensui ita faveat, ut in dormientibus, apoplecticis, paralyticis, spurco hiatu, maxilla prolabatur. Sed aliqui tamen muscoli requirebantur. Neque vero sufficebat Latissimus Colli; cujus fere omnis potentia consumitur in reduplicanda cute menti, neque

non negamus, firmata maxilla, ab hoc eodem Biventre elevari posse os hyoides, sicque hunc esse validissimum ex musculis in deglutitione elevantibus Pharyngem, quae sententia proposita a MONROO *Art. Edimb.* I. p. 137. & WINSLOO II. 1231. seqq. non placuisse videtur WALTHERO de *oscitat.* p. 11. Quod si demum maxilla firmata sit, poterunt junctis viribus Biventer uterque, os hyoides retrorsum elevare: & iidem denique cinguli instar sustentare Mylohyoideum, ipsamque Linguam, emulgere Glandulam WHARTONI, &c. Sed & caput deprimere ALBINUS L. III. c. XLI. qui cum WINSLOWO 1228. omnem nexum Biventris, ad os hyoides, non ob deprimendam maxillam factum esse contendit, & experimento probat, cui contrarium opponit MONRO l. c. 134.

que praeterea locus idoneus (2) supererat in sterno, aut claviculis, a quo musculus maxillae detractor ortum duceret, neque qua viam faceret per collum ad inferiorem maxillam. Quare fabrica pulcherrima effectum est, ut musculus defungi posset eodem officio, quo defungeretur contraria sede ortus. Sed probabile videtur praeterea, posse ad os aperiendum aliquid conferre maxillam superiorem, discedentem ab inferiori, per efficaciam robustissimorum extensorum Spleniorum, Complexorum &c. Namque canis vitus est, maxilla inferiori firmata super columnam marmoream, nihilo secius rictum diduxisse (3).

## §. LXI.

[2] Utique huc facit. Aperto enim ore corrugationem Latissimi per universum collum, & per ipsam superiorem sedem pectoris, facillime percipimus. Imo vero ad detrahendam maxillam omnino confert, firmato hinc osse hyoide, Geniohyoideus, & ea portio Genioglossi, quae inseritur ossi hyoidi, & opitulantes hisce, Coracohyoidei, Sternohyoidei, Sternothyroidei, qui os hyoides primum, deinde maxillam detrahunt. Conf. nobiscum sentientem MONRO l. c. Vol. I.

[3] Experimentis hanc sententiam firmat MONRO Vol p. 139. I.

## LXI.

[1] *Acceptis in Text.*] Nobis non videtur, ab ossea parte jugi, fibras habere Temporalis, verum ab involucro suo tendineo & membraneo, quod ex omni ejus origine pro-



## §. LXI.

*Exteriorum* [4] ] Hi maxillam antrorsum trahunt, cum ferantur ab origine immobili retrorsum. Retrorsum vero trahitur maxilla, a conjuncta vi Biventrium, & Temporalium.

*In-*

productum, tegens fibras carneas, inseritur jugi parti superiori : id vero fibrarum genus a tendinea expansione ortum familiare est musculis tibiae. Inter Jugum atque musculi carnem multa pinguedo interposita est.

- [2] *Circumquaque, in Text.*] Radiatim colliguntur fibrae ejus musculi, & anteriores retrorsum, posteriores vero insigniter antrorsum descendunt, circa jugum reflexae. SANTOR. *Observ. Anat.* c. I. §. 37. p. 35. EUSTACH. T. XXXIII. Inseruntur vero, non processui coronoidi solum, sed parti non minimae sinus semilunaris processus separantis, in sede ejus anteriori DOUGL. *Myogr. spec.* p. 54.

- [3] *Masseterum, in Text.*] Triplex validissimus musculus, cujus capita duo anteriora, in decussim lata, ab osse malae retrorsum. & ab osse temporum cum malae osse jugum faciente antrorsum descendunt; tertium posterius est, ortum ab eodem jugo qua ad malam spectat, insertum & prioribus, & maxillae inferiori, DOUGL. *Myogr. Comp.* p. 55. & WINSL. *des Muscl.* 828.

- [4] Aliae etiam fibrae oriuntur ab osse maxillae,

*Internorum*] Horum unus, si solus agat, deducit maxillam ad latus, bini simul trahentes elevant (4\*).

*Incredibili*] Canis Britannicus (5), Leo, & omne voracium animalium genus, omne robur suum positum habent in his octo mu-

qua parte lacunar inferius magnae rimae orbitariae facit, & ab ossis palati parte se interferente ossi maxillae superioris & multiformi, ALBIN. *de musc.* c. LXX. p. 269. conf. DOUGL. c. 21. p. 58. Insertio alia etiam est, in capsulam articulationis maxillae cum Temporum osse, & in cartilagine inter articulare DOUGL. l. c. ALBIN. Icon ex VERHEYENO excitata valde rudis est, melior EVSTACHIANA T. XLVII. f. 13. in utroque latere, & COWPER. 1724. T. XXIV. 70. Maxillam inferiorem trahunt antrorsum, cum e directo posteriora petant, & ducunt dentes inferiores ante superiores. Inventor est FALLOPIUS.

[4\*] A fossa pterygoidea, tum a multiformi, tum a Palatino osse, & a lamina interna processus externi, atque radice hamuli: Elevat & ad latus ducit maxillam. Iconem in vero situ habet EVSTACH. l. c. lat. dextri.

[5] Genus caninum, felinum, leoninum, amplissimos temporales habent, qui totum sinciput replent, & nonnisi eminentem angustam cristam liberam relinquunt. Conf. in Leone, *Acad. Paris. diss. animal.* ab in. A temporalibus & masletere fit rotunda facies, in capite canis Britannici, felis, Leonis, quae deletis musculis evanescit.

musculis. Vidit VESALIVS (6) histrionem, qui ferreum palum viginti quinque librarum pondo, prehensum mordicus, reclinato capite, retro projiceret, tanto impetu, ut ad triginta novem pedum distantiam in trabe haereret: Alium, Turcam, qui circumgeret ex ore pendulam trabem, justum onus robusto homini. Vidit [7] BOERHAAVIUS, qui mordicus prehensum dolium centum *Stoparum* capax, [een Ooxhooft] vacuum equidem, facillime circumgestaret, & alium, qui funes in lignia pondera trahentes, dentibus elevaret. In phreniticis tanto impetu maxillae colliduntur, ut de durissimis dentibus fragmenta decutiantur. [7\*] Maximam vero

[6] *De corp. hum. fabr.* L. II. c. XV. p. 190. ed. LVGD. BAT.

[7] BORELLVS (*de Mot. anim.* I. Prop. LXXXVII.) elevatum vidit pondus 160 lb. cum vero muscoli omnes proxime ad hypomochlium inferantur, erit ea vis ad 500 lb. & ex Theoremate I. XXXIV. ad 1000 HEISTERS ex diffractis ossiculis pomorum perficorum, trecentas libras sustinentibus, vim trecentarum librarum obtinuit, quae ex natura vectis, erit librarum 900. (*de masticat.* p. 29.) & ex Theoremate BORELLIANO 1500. Verum cum musculorum Temporalium, Masseterum & Pterygoidei interni, non directa ad perpendicularum sit linea tractionis, etiam exinde damnum nascitur viribus absolutis, quae, cum latera sint parallelogrammi, effectum edunt, non nisi diagonali aequalem.

[7\*] Spasmo cynico bacillos durissimos confractos

vero vim istam sustinent inprimis dentes incisorii (8), ad id ipsum compactae & durioris naturae creati, quam quae molarium est.

*Dentium* ] Dentes universi possunt in quatuor series distribui (9). I. *Incisores*, radice unica, solidi, hinc recti, inde in lineam acutam leniter excavati, utrinque quatuor, in quavis ergo maxilla octo. Hi adripiunt & mordent, non manducant. Primi prodeunt puerulis, eo tempore, quo pasti solis fluidis non egent manducatione. II. *Canini*, undique unus, in quavis nempe maxilla duo, radice etiam unica, toti conici, in acutum verticem fastigiati, robustissimi. Hi ad mordendum, & diffringenda corpora dura idonei. Iis destituuntur bruta animalia, quae ruminant. Firmitas major est, & comprehensos cibos continent, ut a reliquis dentibus discerpi possint. III. *Molares priores*, (10) undique bini, in quavis ergo maxilla octo, facie quidem plana, & scrupea, sed mediocriter lata, radice duplici. IV. *Molares poster-*  
*rit-*

ctos HILDANUS in *Cent. obs.* V. n. IX. Ignis dentibus excussus RHOD. *obs. med.* l. 96.

Trabs 250. gestata *id.* l. 97.

[8] Ut, qui in extremo vecte, longissime ab hypomochlio positi sint.

[9] Quod EUSTACHIO placuit, in absolutissimo opusculo *de dentibus*.

[10] Eorum radix primo varia, secundo simplex. Plerumque tamen in maxilla superiori, una radice superant numerum radicum in maxilla inferiori. Conf. VESAL. L. I c. XI. EUSTACH. l. c. c. XI. & *Tab. posth.* XLVII. f. 10. 12.



*riores*, duodecim, lata corona, plana & scrupæa superficie distincti, radice trifida, quadrifida, super quos præcipue perficitur ciborum comminutio in particulas minores, atque uniformem massam, uti fruges inter obpositos lapides conteruntur in molendinis. Quare aves granivoræ, cum dentium molarium auxilio fruges comminuere non possint, nactæ sunt durissimum atque validissimum ventriculum, qui defectum dentium molarium compenset. Radices & interior dentium substantia ossea [11] sunt:  
ex-

[11] In foetu dens nonnisi folliculus est, materie mucosa plenus, figurae utcunque orbicularis, in alveolo latens. Paulatim crusta solida, alba oritur, tenuis; deinde dens, absque radicibus, quæ diu mucosæ manent, postea tubuli instar progerminant, qui simplex, cum tempore finditur; & tunc quidem insigniter cava radix arteriam, venam nervumque recipit, quod foramen per ætatem obliteratur. Radix ossea manet, & centrum dentis; ambitus omnis aëri expositus tegitur crusta marmorea ex fibris radiatis, in ossea parte radicatis, firmissimis, transversis. Sed & periosteum radix habet, ad ortum coronæ fortiter adhaerens, dens exterior nullum. Vide pro incremento dentis in foetu & adulto homine ALBIN. de *Offib. foet.* EVSTACH. c. XV, XVI. XVII. XVIII. FALLOP. *Observ. Anat.* p. 52. 53. & de *Off.* Pro fabrica interiore HAVERS. GAGLIARD. c. II. Obs. II. MALPIGH. in *posth.* p. 73, Edit. Amst. &  
in

exterior crusta, durissima, marmorea, diversae fabricae a reliquis ossibus.

### §. LXII.

*ArElantur*] Musculi, qui tam multi sub hoc numero recensentur, reguntur omnes voluntatis arbitrio: Ita vero sibi invicem connexi sunt, quotquot sunt, ut uno paralytico facto, protinus reliquorum jam non coërcita vis, cibos in eam sedem omnes compellat, atque aeger manu ad buccas appressa efficaciam musculorum imitari cogatur. Iidem, si vel unam guttulam salivae deglutire velimus, ita nullam faciunt cavitatem buccarum, ut saliva omnis in dorsum linguæ recipiatur. Eos vero nemo felicius depinxit EUSTACHIO [2], quem certe non solum cadaverum copia adjuvit, sed multifor-  
mes etiam & macilentae facies Italorum [3],  
in

in *Anat. plant.* p. 37. LEUVENHOEK  
cont. *Epist.* ab init. la HIRE *Mem. de l'Acad. des Scienc.* 1699.

[1] *Scrupeas, in Text.*] Cuneos nempe breves eminentes inter rimas coronae. Eas duas fere habent Molares priores, tres, quatuor & quinque vero in posterioribus adsunt.  
WINS. 475.

[2] T. XLI f. I. III. V. XI. & T. XXXV.

[3] Alter Italus SANTORIN. in *Observ. Anatom.* Cap. I. & T. I. multo magis mirabilem horum musculorum multipliciter tradidit. Conferendae vero omnino tabulae COWPERI *Mot. ed.* 1724. Tab. XXI. XXII. XXIII. XXVI. longe certe meliores

in quibus inplexi cuti adipique muscoli, longe parantur facilius, quam in faciebus obelis, sui-

res prioribus, quas ex Myologia minore ed. 1694. excitat BOERHAAVIUS.

- (4) *Coronordis, in Text.*] Haec una origo, cujus fibrae leniter adscendunt. Verum alia, ab osse maxillae superioris, supra ultimum dentem molarem ALBIN. *de musc.* c. XVI. orta, descendit potius, v. CANT. *Impet. Anat.* Tab. I. & imprimis COWPER. 1724. Tab. XXII. Atque inter has origines, & a ligamento duas maxillas colligante, & ab hamulo Pterygoideo SANTORIN. c. I. §. 35. DOUGL. l. c. p. 23. ALBIN. &c. Quare & diducere potest ad latus os universum, & elevare angulum oris, & deprimere. Deinde buccas inflatas coercere, atque in planitiem extenuare. Bona icon COWPERI modo excitata.

- [5] *Orbicularis*] Quem verius in duos semiorbiculares dividit WINSLOW. IV. 553. cum fibrarum decussatio in angulis labiorum sit manifestissima. In eum terminantur fibrae reliquorum musculorum hujus numeri, & ipsum tenuem, si absque eis foret, augent, fibrarum robore. ALBIN. c. XVII. p. 163. Contrahit os clauditque, explanato in rectum arcu superiori, & inferiori, ut os in rimam rectam & linearem extenuetur.

- [5] *Zygomaticus, in Text.*] Perpetuo adest major alius, vulgo notus, ab inferiori parte ossis malae, ea in sede quae temporibus conjungitur, inspersus hinc quidem Orbiculari oris (SANTOR. ad x) inde Triangulari labii inferioris (SANT. ad g). Eum EVST. l. c.

fuique fere similibus populorum, qui Boreae propiores vivunt. Et SANTORINUS ipsam EUSTACHII industriam superavit in *observationibus*.

Buc-

l. c. semper divisum, COWPER. vero solum & integrum (T. XXII habet. Verum *Zygomaticus minor*, EUSTACHIO primum visus T. XLI. f. I. alias ab osse malae solo, supra priorem & magis interius, in dimidia fere altitudine sub orbita CANT. *Impet. Anat.* T. I. SANTORIN. Q. alias ab orbiculari palpebrarum EVST. & WINSL. IV. 560. alias ab utraque origine aut conjunctis principiis ALBIN. aut separatis (SANTORIN. l. c. lit. Q & O) Portio ab orbiculari, aliquando gracilissima, pene evanescit in adipe sub mala congesto.

[7] *Communis, in Text.*] Inventus a FALLOPIO nomine paris 4. p. 710. *Observ.* LVGD. BAT. nitidius a SANTORINO T. I. lit. R. Oritur a fornice foraminis infraorbitalis. v. SANT.

[8] *Unius, in Text.*] Est Elevator proprius labii superioris fere omnium Auctorum SANTORIN. T. I. R. qui bene expresseit ejus latitudinem, & *Incisivi lateralis* WINSLOWII pars altera IV. 563.

(9) *Alterius*] Levator labii superioris & alarum nasi ALBIN. c. 8. p. 151. insertus, & labio superiori (SANTORIN. l. c. S.) & alae narium in mobilem cartilaginem (SANT. l. c. T.) Utramque insertionem habet etiam EVST. T. XLI. f. I. Huc *Incisivi lateralis* WINSLOWI pars prior 562.



*Buccinator*] Hujus magna est efficacia, tum in buccarum ad dentes adpressionem, qua exinanitur cavitas prima oris, tum in exprimendis glandulis buccarum, quas ad uberiolem secretionem sollicitat. Hi si paralytici fuerint, deficit tota manducatio atque

562. & *Musculus lateralis Nasi ejusd.* 331.

Origo itidem visa duplex, distincta intercedente arteria.

(10) *Depressoris labii inferioris proprii.*] Sunt fibrae pene transversae, inter fibras depressoris obliqui positae (EUST. T. XLI. f. I. & XXXV.) quas *Protrusorem menti* vocat SANTORIN. l. I. §. 31. T. I. t. t. Icon COWPERI T. XXI. XXXI. no. 25. cum SANTORINO convenit ALBINUS videtur ad *obliquum* referre. L. III. c. XIV. Nobis aliquid SANTORINIANAE descriptioni simile visum, sed vix extricabile, aut a *cutaneo* separandum.

(11) *Obliqui, in Text.*] A Latissimo colli provenit cutaneus, atque intricatus cum suo conpare adscendit in orbicularem (EUST. T. XLI. f. I.) decussatus. SANTORIN. T. I. y.

(12) *Elevatoris labii inferioris proprii, in Text*] Oritur inter eminentem alveolum canini & maxillae symphyfin (ALBIN. p. 168.) ut alter alterum non decussaret (qualem habet SANT. l. c. q. r.) sed osseam eminentiam interjectam habeant, inferius conjuncti, efficiunt magnam partem menti, idque elevat toti breves. Est *Incisivus inferior* WINSLOW. IV. 568. vid. COWPER. T. XXXI. 26.

que saccus nascitur, in quem compellitur, quidquid ore adsumtum est.

*Carnosi*] Qui musculus (14) occasionem dedit GALENO (15), ut fingeret panniculum

(13) *Communis depressoris labiorum, in Text.*]

Aliquot a mento lineis ortus, ante proprium Depressorem (10) & Buccinatorem, adscendit extrorsum, continuatur Zygomatice (EUST. T. XLI. f. I. & SANTORINI. l. c. X. 10.) & Elevatori communi labiorum, COWPER. T. XXII. 22. & Orbiculari. Bona est icon SANTORINI.

[14] *De admin. anat. L. III. c. 2.* licet non ignorasse videatur, hanc membranam carnosam, a cute plerisque locis aegre separari posse. VESAL. eandem serio tuetur. L. II. c. V. Primus errorem epidemicum evertit STENONIS *myolog. spec.* p. 99.

[15] Inferitur maxillae inferiori, late a symphyssi ad Masseterem usque, deinde edit *Depressorem labii inferiori* SANTORINI, cutaneum, atque mox Depressori communi labiorum; inde varie terminatur supra masseterem, & partim angulo oris, partim Masseteris membranae exteriori se inferit. EUST. T. XXX. bene & COWP. T. XXI. 18. Ejus portio, aliquando distinctus musculus est RISORIUS SANTORINI T. I. l. n. a masseteris involucri, vela latissimo ortus, oblique adscendendo angulo oris adfixus. vid. ALBIN. IV. c. XXXV. p. 194.

[16] *Omnes, in Text.*] Industria SANTORINI aliquos addidit, quorum nonnullos denuo  
ALBIN.

lum carnosum, & omni cuti hominis musciculum cutaneum latissime subtendi adfirmaret. Quae fabrica, bestiis data, homini manibus ad arcenda insecta instructo non fuit necessaria.

Lin.

ALBINI prudentia exclusit. Superest omnino *Nasalis Labii Superioris* ALBIN. ab ima parti septi narium, junctus compari, se demittens in orbicularem labii superioris, id elevans. SANTORINUS *tertium* dixit *ordinem orbicularis labiorum*, & iconem dedit I. I. Elevat labium superius. Sed & *Productorem labii inferioris* Santor. C. I. §. XXX. & T. I. S. aliquando vidi, & *Rhomboideum* ib. f. ossi undique instratum, & musciculum *Transversum menti*, Santorin. c. I. . XXVIII.

[17] *Simul, in Text.*] Hae voces ita interpretandae,, quoties os firmatum est, aequilibrio quodam musculorum contrariorum, tunc muscoli buccarum ori inserti, inter hoc ipsum & osseas origines arcuum instar fornicati, se in directum explicant, interceptum spacium buccarum delent, atque cibos dentibus malisque adprimunt. Quando vero unicus eo modo agit, firmato ore, ne obsequatur, expellit cibos ex ea sede, quam protegit: Quod dum ex ordine faciunt varii, cibi, a quavis sede in omnem aliam, & inter ipsos dentes compelli possunt. Iidem os non firmatum, diducunt, & aperiunt, si omnes agant, aequabiliter, si aliqui ad latus suum.

[18] *Genioglossos, in Text.*] Horum duae partes sunt, non modico hiatu, atque membranis

*Linguam*] Linguae utilitas adeo multiplex est, utvix omnem enarrare possimus. Gustus organum est; loquelam moderatur; ad deglutitionem facit; Sed magnas etiam partes sustinet, in manducationis negotio, quae a deglutitione diversa est (19), atque  
fi

nis separati. Interior, media, & ad basin ossis hyoidis (EUST. T. XLI. f. VIII. & ad pharyngis membranam (qui *Geniopharyngaeus* WINSL. 480.) & in linguae basin. Lateralis, & profundior, totus ad linguam abit (EUST. T. XLI. f. XI.) conf. ALBIN. L. III. c. 52. Quare hic musculus, potest os hyoides ad maxillam antrorsum ducere in deglutitione, eademque opera membranam pharyngis ad anteriora tractam tendere, eamque dilatare, & linguam expandere, & ejus apicem extra os ducere, imo vero, firmato osse hyoide, etiam maxillam inferiorem aperire, conf. WINSL: IV. 522. DOUGL. c. XIII. p. 34.

[19] Mobilissimo suo apice cibos modo dentibus diligentius adterendos subdit, modo ex cavo anteriori, quod inter buccas & dentes est, conquisitos, pone dentes retrorsum convehit, modo dorso impositos versus uvulam revolvit.

[20] *Ceratoglossos, in Text.*] Carneus latus musculus, modo continuus est, (DOUGL. c. XIII. *Morg. Adv.* II. p. 33, & WINSL. IV. 520.) & ab laterali anteriori parte baseos ossis hyoidis, & ab ejus cornu ad initium ortus; modo distinctus, interjecta pinguitudine, in partem aliam a basi ortam  
(Ba-



si linguae dimidia pars paralytica fuerit, in eo latere manducatio nulla fit.

*Styloidis*] Os styloforme non est processus ossis temporum, uti vulgo solent sumere anatomici, sed proprium os (20\*), quod ad os petrosum ligamenti revincitur, uti primus nobis demonstratum dedit RUYCHIVS (20\*\*). In senioribus equidem coalescit

(*Basiglossus Comperi* 1724. T. XXVIII. f. I. 5. ALBIN. IV. c. L. EUST. T. XLI. f. 8. & 11.) aliamque exteriorem, latiorē, obliquiorem a cornu (*Ceratoglossus* plerorumque & ALBINI. EUST. l. c. forisim & *Comperi* l. c. 50.) Uterque linguam ad latera & retrorsum ducit. *Chondroglossus* VERHEYEN. IV. c. 19. T. XXIX. f. 9. D. & ALBINI IV. c. 51. exiguus, neque perpetuus est. An depictus ab EUST. T. XLI. f. XI. in situ, resectis *Basio-* & *Ceratoglossis*?

[20\*] *Epiphysin* esse dudum FALLOPIUS *Observ. anat.* p. 39. 47. ed. 1606. atque ex eo MOLINETTUS *Dissert. Anat. Pathol.* p. 27. qui ex ea ipsa mollitie hujus particulae *infantiam* puerorum explicavit, & inarticulatas voces. Et certum est, in recens nato cartilagineum processum styloformem, mobilem undique & elasticum, inmitti in proprium sulcum ossis temporum, quem *capsulam processus styloformis* dicit WINSLOW: 259. Per aetatem & ipse osseus fit, & absque medio capsulae suae infixus connascitur.

[20\*\*] *Advers. Anatom.* Dec. III. n. IX.

ticulatio, & os styloforme petroso connascitur. Verum etiam in adultiorum craniis facile defringitur, & raro in ficcis coemeteriorum capitibus reperitur.

*Corpus*] Musculi ipsam linguam pene omnem constituentes, maximam omnino partem absolvunt summae illius volubilitatis, quae in lingua humana est. Namque interior fabrica linguae, verus est, sed inextricabilis musculus, cujus naturam nemo ante MALPIGHIVM (23) perspexit. Ne-  
que

[21] *Styloglossos, in Text.*] A parte anteriori Processus cartilaginei styloformis, tendineus, in progressu saepe valido ligamento adhaerens ad angulum maxillae inferioris EUST. XLI. f. XI. quod & carneas fibras habuisse vidi, (COWPER. T. XXIII. E.) fit carneus, instratus membranae oris, & ad apicem usque, juxta Cerato- & Genioglossum repens; Linguam retroducit, cibos ei inpositos ad palatum refert, latera elevat & mediam fedem excavat.

[22] *Mandibulae, in Text.*] *Myloglossus* VERHEYENI, dictus etiam WINSLOWO IV. 517. ab ALBINO omittitur, nobis vero a Mylopharyngaeo non videtur diversus esse, cujus pauculae fibrae, anteriores, linguam adeunt.


[23] NICOLAUS STENONIS proposuerat exteriores longitudinales, interiores, alias ad perpendiculum secantes linguae planitiem superiorem, alias huic ipsi parallelas: easque in homine observavit *de Musc. & Gland.* p. 14. Sed neque diversissimos illos MALPIGHIANOS tractus, in vitulo distinxi

que ipse tamen MALPIGHIUS in humana lingua texturam fibrarum evolvit, verum in vitulina. Hominis enim lingua adeo parva est, adeo tenera, adeo intertexta pinguitudine, adeo variae structurae, ut nihil distinctum, aut perpetuum definiri possit. Bubula, non magnitudine sola se conspicuam reddit, sed cum demetendis pratis destinetur, tota robustior, fibras habet magis evidentes. Atque earum directio adeo multiplex est, ut nullus arcus circuli sit, quem mobilitate sua lingua non possit describere. Eam si dissecare velitis, coquite in aqua saepe renovata, donec nihil quidquam pinguitudinis se aquae admisceat, tunc aciculis firmate, & removete epidermidem, deinde perforatum corpus reticulare, porro papillare involucrum, & conjunctam cum papillis pinguedinem. Ita nudos habebitis musculos.

## SALI-

stinxi unquam, neque oculatissimus LEUWENHOECKIUS *Arcan. & Contempl. Ep. LXXXII. p. 408.* qui in bove duo tantum genera vidit, directas juxta longitudinem, & alias ad hasce perpendiculares. Longitudinem equidem sequitur *Lingualis* perpetuo visus DOUGLASSIO c. XIII. p. 36. & ALBINO IV. c. LIII. dictus, continuatus Genioglossa, Basioglossa, Ceratoglossa, Styloglossa, cujus termini ad apicem linguae pertingentes vix possunt satis definiri. Reliquae fibrae, breves, variae, implexae, vix integra strata faciunt, totae sparsae atque intertextae prioribus. Linguam in universum retrahit, & efficit brevior.





# SALIVAE ORTUS, NATURA, ADMISTIO.

## §. LXV.

*Explicatae]* Bos solo, & ex succo foeni pascitur, ex eo ut succum natura eliciat, multiplici usa est artificio. Deglutit equidem integros, & maximos globos, quos nunquam digereret. Id foenum in primo ventriculo adfluens succus gastricus emollit, atque fibras ad dissolutionem praeparat. Tunc animal ruminando eructat foenum, & lente, atque diligenter, super dentes molares molit, ut uberrimam spumam agat subacta cum foeno saliva, ita vascula foeni emollita franguntur, atque deglutitum denuo foenum, in ventriculo liquores nutritios facile dimittit. Id artificium si prudentes imitemur, poterimus cum eodem cibo famem tolerare diutius, cum plus ex eodem cibo adsumamus alimenti, quam vero extrahere poterimus, si integra frustra vix manducata devoraverimus.

*Conglobatam]* Singularis haec est proprietas Parotidis, quod, praeter conglomeratam fabri-

[1] *Conglomerata, in Text.]* Glandula magna, acinosa, involucri membranaceo tenaci tecta, incumbit Masseteri; protinus sub jugo, deinde adusque Biventris transitum, ita



fabricam, quarum emissaria in unum excretorium ductum conveniunt, unum etiam, *et aliam in os* majo-

ita ut inferior & superior sedes introrsum in cornu producat, media reductior sit. Replet praeterea, quodcunque foveae est ad posteriora maxillae inferioris, firmiter adhaeret margini meatus auditorii, qui obpositus est maxillae inferiori, inmittitur hujus articulationi, ipsique sedi posteriori foveae temporalis, terminata tandem Processus styloformis margine superiori. Inferius autem cornu trans Sterno-Mastoideum, atque divisionem Venae Jugularis, ad ipsam Maxillarem glandulam educitur, a qua vena angulari sola distinguitur. Sed praeterea, Masseteri supremo interius, sub itinere nervorum durorum, incumbit Glandula, modo rotundula, qualem habet SANTORINI T. I. modo & ipsa continua Parotidi, & in longumeducta, quae ductui STENONIS peculiarem canalem infundit, dum sub margine imo hujus glandulae transit. Oritur nempe STENONIS ductus, ab ima Parotide, adscendit, marginem ejus paulatim attingit, & interioram oram Glandulae legit; ad eam sedem, per cornu os respiciens superius, transversim, ante supremum Masseterem, sub nervis a duro pare, transit, aditurus Buccinator, quem dum adit, copiosa fulcitur pinguedine, & ea remota arcum facere videtur; perforat Buccinatorem, aliquamdiu eo tectus procurrit ante nudam oris membranam, conspersam copiosis buccalibus glandulis, atque obliquo tractu, ut

majorem folliculum (2). habeat, ex quo unicus ductus se conjungat majori ductui. Quis finis naturae? an ut Lympha adfusa salivae, longiusculum iter facturae, conciliet fluiditatem?

*Arterioso*] Idem certe sanguis (3), de quo cere-

setam modice repellat, etiam hanc perforat, & non minimo osculo, supra secundum dentium molarium patet. Totus ductus, fungosa substantia cinctus, hinc firmus, vasculosus, cavitate non respondente diametro canalis.

(2) An STENONIS glandulam conglomeratam genalem viderit, non dixero, situs certe idem est. Sed glandula Parotis, non unam conglobatam, verum tres, quatuor & decem junctas habet comitesve, alias supremae orae, ubi vasa exeunt, alias inferiori viciniore. Verum nihil hae habent cum saliva commune, & meram lympham excipiunt, atque expellunt: quod de aliis conglobatis contra WHARTONUM demonstravit N. STENONIS de *musculis & glandulis* p. 44. Saliva nempe volatilis avolat, lympa ad ignem cogitur. Sed *Genalis glandula* picta a SANTORINO, ductum inferit STENONIANO perpetuo, neque mirum, cum & conglomerata sit, & Parotidis quaedam appendix.

[3] Ampli & plurimi rami, a trunco arteriae Carotidis externae, per ipsam glandulam Parotidem adscendente. Verum arteria Carotis externa e directo est Carotidis communis, & sanguinem nihilo minus ex directo habet quam Interna. Venae, ad

cerebrum subtilissimum fluidum fecernit. Idem ad glandulam Parotidem multis ramis spargitur.

*Ductui*] Qui patulus est, & pressus, non minimum filum salivae edit: Ex eo ductu, quando frigidus aër exteriorem cutem faciei adflat, gelidae guttae in oris caveam exstillant, mera, nempe saliva intra glandulam suam, quae subcutanea (4) est, magis refrigerata, quam os clausum & musculis defensum.

*Dentem*] Ostium ductus est in papilla (5) eminente, orbiculari, quae salivam in os libere admittat, stylo quem ex ore inpellis,  
vel

ad communicantem Venarum Jugularium, & ad Jugularem, quae in Temporalem fit. Nervi, ab inferiori ramo partis Durae.

[4] Vnde inventor N. STENONIS ductus primum visos 8. Apr. 1660. dixit *Exteriores*. GALENI certe voces obscurae sunt; CASSERIUS ductum vidit, naturam ejus non perspexit; NEEDHAMUS inventionis anno 1657. factae gloriam nullis idoneis argumentis sibi vindicavit; BLASIUS, neque monitus ductum satis notum habuit, quem volebat a se inventum esse. (conf. BARTH. EPIST. Cent. III. quae XLIII.) STENONIS, in corpore bruti animalis, & primus, & curiose descripsit, figuramque dedit. Humanarum nulla placet, minime omnium NUCKIANA & VALSALVIANA.

vel cuicunque alii corpori, valide renitatur.

*Buccinatorem*] Emulgetur ductus STENONIANUS efficacia Masseteris & Buccinatoris. Verum non subjicitur (6) his musculis, ne nimis valide pressus salivam aegrius vehat. Caeterum in hac ipsa glandula parotide, saepe post diuturnas odontalgias oriuntur tumores, nunquam tentandi ferro. Namque salivalis ductus resectus nunquam coalescet, fistulam relinquet insanabilem, perpetua saliva madentem (7), & in iis hominibus ea pars oris perpetuo sicca est, cujus ductus vim accepit.

*Du.*

- [5] STENONIS *de Gland. oris* p. 12. no. 14. Papilla nobis non visa, sed resecti ductus ostium aliqua marginum duritie se sustinet. Stylum repellit, ob iter obliquum & inflexionem flaccidi canalis, ubi buccinatorem perforat. Circa ostium Stenoniani ductus, decem aut plura oscula glandularum buccalium conspiciuntur. Novem glandulas Buccales novas demonstravit. I. W. PAULI in *comment. ad HORN.* p. 35.
- [6] Habet consentientem CHESELDENUM *Anatomy of human. bod.* 1726. p. 151.
- [7] Exempla habet NUCK. *Sialograph.* C. I. tot. II. RUYSCH. *Adv. Dec.* II. p. 15. CHESELDEN l. c. HELVETIUS in *Comm.* ann. 1719. Eadem Parotis sedes est crasseos malignae in acutis, dubii omnino eventus. V. DVRET. in *Coac. praen.* I. n. 110.



*Ductum*] Primum inventus est a WHARTONO (11). Ductus ampli sunt, & in jejunum

[8] *Maxillaris, in Text.*] Ad angulum maxillae inferioris sub cute, involuta membranaceo quodam, sed robusto involucro, ad exteriora Parotidem habens, supra se interius Biventrem, & ubique Mylohyoideum; & minori lobulo, recondito magis, fulta Pterygoideo interno. Ex lobo majori educit rostrum, quod plerumque conjungitur glandulae Sublinguali, supra Mylohyoideum productum & latens. Ex universa glandula nascitur salivalis ductus, auctus simili ramo ex minori lobo, educitur ex rostro modo dicto, trans Cera- toglossum, & inter glandulam sublingua- lem, atque Genioglossum, tectus Mylo- hyoideo & Biventre, educitur ad apicem linguae, apertus in vertice papillae flexilis & conicae, quae ad imum apicem linguae, proxima est frenulo. Ductus STENO- NIANO tenerior est, cavitate vix cedit. Icon optima est COWPERI *App. ad BIDL. f. 19.*

[9] *Internae in Text.*] Externae enim sunt Lym- phaticae, conglobatae, Lymphaticis vasis divites, a CL. HALE bene descriptae *Phil. Transf. n. 364. 11.* & a WHARTO- NO (*Adenogr. p. 119.*) atque BLASIO male pro conglomeratis, & fontibus du- ctus maxillaris habitae.

[10] *Eodem, in Text.*] Ramis arteriae quae per angulum menti transit (COWPER. T. XXII.)

[11] Praesente GLISSONIO WHART. *Adenogr.*  
L 5

jejuno homine ad speculum, admoto fapido corpore, tenuem aquulam longo siphone projiciunt. Ejicitur vero vi agentium muscutorum Pterygoidei interni & Biventris (12). Et in eo saepe nascuntur concrectiones calculosae (12\*).

*Lin-*

*nogr.* p. 116. f. p. 120. Ed. BAT. Et icon & descriptio longe a fabrica humana distat.

[12] Anterior Genioglossi stratum laterale, & Mylohyoideus, posterior Biventer, & Ceratoglossus medium intercipiunt, universam vero glandulam Latissimus colli.

[12\*] Exempli existant abunde. Ecce duo ex COMM. LIT. PHYS. TECHN. MED. NOR. KRAMERI 1732. n. 49. & SLEVOGTI 1733. n. XI.

[13] *Plura, in Text.*] Observatio RUYSCHIANA videtur pertinere ad insertionem Ductus BARTHOLINI, proximam WHARTONIANI osculo.

[14] *Sublingualcs, in Text.*] Glandulae longae, angustae, vel continuatae Maxillaribus, vel proximae, infra membranam linguae, ad exteriora Geniohyoidei, & Genioglossi, interiora Styloglossi, longo tractu exporriguntur ad apicem usque linguae. Salivam effundunt, plerumque per meros ductus minores, inter se parallelas, frequentibus osculis longa serie a WHARTONIANO retrorsum juxta linguam in membrana os succingente apertos, quae STENONIS de *Gland. or.* p. 19. MORGAGNI *Adv.* VI. WALTHERI de *lingua* ubique. HEISTERI

*Linguae*] Praeter tenuissima vascula, in quae aliquando sibi viam fecit RVYSCHIANA (17) cera, adest in lingua expansio glandulosa, facta ex confertis acinis, qui liquo-

STERI. *Compend. Anat.* not. 55. ic. 33. p. 130. WINSLOW. IV, 582. sententia est. Non infrequentius, ductus unus longus, a posteriore parte glandulae prodiens, aut inferitur WHARTONIANO, aut comes fit adusque linguae apicem, plane uti in brutis animalibus depingit BARTHOLIN. in *fig. I.* cum WHARTONIANO communi osculo apertus, quae unica NUCKII (T. I. *Sialogr.* f. 4. *explic.*) observatio est: a COWPERO vero *expl.* f. 19. in *app.* ad BIDLOO. RAVIO apud ERNDL. *Itin. Anglic. Bat.* p. 110. pro constante habetur. Cui ductui majori, parallelum alium, neque minimum vidi. Vasa glandulae, Arteriae a Linguali media, Venae a Raninis.

[15] RIVINIANAE, in *Text.*] Fuit utique RIVINUS verus inventor, & ductus alios minores, peculiares, alium anteriorem, junctum WHARTONIANO observavit, in vitulo, (*Diss. KUNNE de Dyspepsia* 1679. Coroll. I.) plane uti WALTHERUS.

[16] BARTHOLINIANAE, in *Text.*] Serius, & post RIVINUM, nisi forte ejus DISS. non viderit, anno 1682. unicum ductum parallelum WHARTONIANO, de *Duct. saliv. nov. Hafn.* 1684. 4.

[17] Non invenio, sed Cl. ALBINUS olim demonstravit linguas, ex quarum arteriosis villis materia ceracea erumpebat, plane uti in Intestinis, *INST. MED.* 92.

liquorem eum fundunt, quo lingua perpetuo madet. Eam celeb. VATERUS (18) primus descripsit.

*Palati*] Membranaceum involucrum, idem, undique sibi continuum, plenissimum

[18] *Propria dissertatione de novo ductu salivali linguae.* Nempe SCHRADER. *Dec. I. obs. 3.* & MORGAGNUS descripserat foramen coecum dorsi linguae (*Adv. I. p. 4. 5. T. I. lit. I. & Advers. VI. p. 121.*) atque in eo, fere in quarto quovis corpore, observaverat canalem, quem esse communem excretorium glandularum ibi sitarum, existimavit. Id & HEISTEROVISUM, pictumque fuerat, cum ductu duplici (*not. ad Comp. Anat. 56. & Fig. 34.*) Id ipsum inventum auxit VATERUS, ut late expansam glandulam conglomeratam linguae, per hunc ipsum ductum repletum se crediderit detexisse. (f. 1. f. 2.) Nobis foramen coecum pene perpetuum visum, frequenter papilla fartum, aliquando ductu patens; sed glandulosi acini perpetuo distincti, exilibus foraminibus patuli, communis ductus minime indigi. Eorum acinorum, aliqui aliquando in foramen coecum patentes, ductus speciem prae se tulisse potuerunt. Nobiscum facit WALTHERUS de lingua p. 34. TREW. *Epist. de Vas. salival. p. 10. & Tab. III.*

[19] *Palati, in Text.*] Quod praeter glandulas discretas, sparsasque per callosum suum involucrum, STENONIS de *Gland. or. p. 17. & f. 4.* habet majores *molares* ad postremos dentes sitas HEISTERI, & alias, quarum ductus radiati, vorticis instar in gyrum ponuntur, ad occursum ossium palati.



mum glandulis simplicibus, investit palatum, nares, fauces, sinus pituitarios, gulam, laryngem, asperam arteriam, ventriculum, intestina. Eam ab inventore, (21) solemus SCHNEIDERIANAM vocare. In glandulis, quas habet, simplicibus, seceratur humor tenuis equidem, sed tamdiu manens in suo folliculo, donec mora factus crassior, mucus (22) fit, exprimendus, quotiescunque usus postulaverit.

*Necessitas*] Simillimae mucosae cryptae, in Epiglottide, Uvula, glandulis ad Isthmum sitis, dispersae sunt. Morbi (23) huius membranae, communi voce, dicuntur *Catarrhales*. In naribus *Coryzam* dicunt, in faucibus *Anginam*, in Larynge *Cynanchen*, alibi aliter. Ex hac membrana gignitur omnis illa vis muci, quae in sano neque emungitur, neque excreatur, & a cerebro derivata est perperam, consensu totius Antiquitatis. Neque est, cur obijciatur, liquidum adeo viscidum, nunquam fuisse tenue. Audacter adfirmo (BOERHAVIVS)

non

- [20] *Labia, in Text.*] Tota farta simplicibus glandulis, per minima foramina tenue liquidum fundentibus, HEISTER. fig. 36. Simillimas alias buccae habent, quarum majores, non paucae, circumstant ostium ductus Stenonis.
- [21] SCHNEIDER *de Catarrh.* L. III. S. II. C. III. copiosissime per omnia animalia.
- [22] Sunt enim verae glandulae simplices, vid. pulcherrime BOERH. *de fabr. Gland.* ad RUYSCH. 5-21.
- [23] SCHNEIDER. L. IV. *sect.* I. copiose.

non alios liquores in corpore humano fecerunt, nisi qui tenues sint fluidique: eos vero, qui crassi sunt, mora tales factos esse ex tenuibus, neque fluere, nisi per intervalla (24). Semen, Bilis, cerumen, pinguitudo, qui humores tenacissimi, ii ipsi, dum feceruntur, tenues sunt atque limpidi, & quietem in folliculis agendo spissescunt. Dedit autem provida parens Natura, mucum tutamen (25), omni parti corporis humani, quae vel acria liquida mota vehit, vel adtritum majorem patitur. Quare, non solum viae aëreae & cibariae, mucum habent, de quibus glandulis quinque spissa volumina scripsit SCHNEIDERVS: Verum universum iter urinae, vesica, urethra, vagina muliebris, uterus, partes genitales externae, mucilaginosae cryptis abundant. Is vero mucus, non aquosa tantum natura, sed ex oleosa mista constat, ut eo lenior mitigaret rosionem, adtritum. Imitantur naturam nautae, qui, madidos rudentes dum tractant, vi venti stridulos funes rapiente, saepe manus excoxiarent, nisi providi, manus pice vel oleo inungerent.

*Alius*] CL. ANTONIUS NUCK in cane (26) invenit ductum salivalem, qui ex

[24] INST. MED. 245. 246. 251.

[25] Mucus est, liquidum fila trahens, pellucidum, lentum, iners, insipidum, inodorum, lubricum, aquae miscibile, cum parvissima olei temperatione, in lemas concrelescens BOERH. de fabr. Gland. p. 9.

[26] Majorem alium ex glandula inter os jugale & abducentem musculum sita, apertum in summa

ex glandula, propria & nova, orbitae ortus, salivam ad os veheret. Verum vir optimus eum praecocius iusto, in numerum salivalium ductum retulit, cum neque ipse, neque alius quisquam hunc canalem viderit in homine. Existimabile est omnino, ob proprias rationes, cani hunc ductum datum esse, quod hoc animal, cum calidissimum sit, non sudet, sed ex ore fumum madentem exhalet, inde motu musculari aucto protinus mirifice fumet & anhelet:

summa gingiva, prope dentem molarem superiorem secundum, *Sialogr.* T. III. f. 1. 2. 3. *minores* alios, ex alia glandula, in os etiam apertos, parallelos priori. p. 156. T. 6. f. 2. In lupo vidit eum ductum majorem HARDER. E. N. C. Dec. III. *Ann.* I. *Obs.* XCVI. In Catopardo DVVERNOY *Comm. Acad. Petropol.* 1726. p. 345. In homine nemini visus est. Neque omittere volui, plane in ea sede, de qua dixit NUCKIUS, arteriam venulamque ex glandula magna orbitae, se profunde in os jugale demergere in homine. Alium proposuit ductum salivalem Cl. COSCHWIZ. atque non admissum defendit, dissertationibus propriis. Verum repetitis, crebrisque observationibus, fatis, opinor, constat, ipsi visas esse venas aliquas, modo a venis Hyoideis ad dorsum linguae adscendentes, modo trans Styloglossum a Pharyngaeo plexu venarum ortas, conf. WALTHER. *de ling.* p. 38. DVVERNOY *de duct. saliv.* *Coschvv.* 1725. HEISTER. *not. ad comp.* n. 56. TREW. *Epist. de vas. saliv.* ubique.

helet: Quare loco denegatorum fontium fudoris, hunc ductum accepit, per quem, dum exaestuatur, se calente vapore aquoso liberare posset. Tandem in homine proprii tubuli ex sacco lacrumali descendunt ad dentes incisivos superiores duos: per quos seta minima adigi potest. Ii muci copiam, sed perquam exiguam, fundunt (27).

### §. LXVI.

*Saliva*] Saliva non ejusdem est ingenii. Tenuissima provenit ex glandulis oris; crassior ex parotidibus & maxillaribus, crassissima ex uvula, tonsillis, & vicinis faucibus. In universum aqua paulo crassior est. Debet autem resolutioni Chemicæ subijci saliva sana, hominis juvenis, ore eluto, sponte adfluens, mane, jejuno corpore expulsa. Neque

[27] Nempe, in os etiam defluit lacrumarum aliqua pars, per ductum incisivum STENONIS *de Gland. oris* 107. a naribus, juxta ipsam commissuram ossium maxillae, in os patentem, quem HEISTERUS clausum esse voluit, *not. ad comp.* p. 59. MORGAGNUS autem *Adv. Anat* VI. §. XC. p. 116. 117. & olim N. STENONIS, binos in unum confluere observaverunt. Nos perpetuo apertum, &, effractis ossibus, denudato utroque canali membranaceo, duplicem semper vidimus, licet osseum infundibulum, ad nares duplex & latius, in palato plerumque angustius & unicum sit, quae etiam Cl. SANTORINI est sententia *Obs. anat.* c. V. §. 13.



que debet (1) pro saliva haberi liquamen foetidum, efficacia Mercurii in morbis venereis expressum: Ea enim non saliva est, sed putridum liquamen, quod canes & alia animalia necasse visum est.

*Ignē*] Admoto calore valido, avolat volatilis, in eo diversa a sero sanguinis & lymphæ, quæ ad calorem aquæ ebullientis, in ipissamentum albumini ovorum simile densantur (2).

*Expers*] Saliva sani hominis, propriæ linguæ est insipida. Eadem aliquando nauseose dulcescit (3); in convalescentibus ex febre intermittente falsa est, in morbis acutis, amara, rancida.

*Spumescens*] Saliva, ex more inter honestiores homines recepto, in phiala servata, spumam agit, quæ aliquando per integras septimanas perstat. Quæ ipsa proprietas in examine Chemico nobis obstaculo est. Quando enim ignis paulo validior admoveatur, collum cucurbitæ protinus tenaci spuma offercitur, non sine disruptionis metu.

*Puro*] Qui purissimus ad caput fertur, ex  
legi-

[1] Neque, ut fere solet, sputum, quod screatu ejicitur, ex aspera arteria, viscosus mucus, & a salivæ natura remotus.

[2] BOERH. *Elem. Chem.* II. *Proc.* CXVII.

[3] Plura exempla habet BOSCHETTI *de salivatione*, & HENNINGER *de saliva* DISS. II. §. 20. p. 25. neque mihi rara obvenerunt, in variis sanguinis viciis, pthisi, asthmate &c. An a scirrhorum glandularum Bronchialium succo, qui cum austeritate dulcis est?

legibus hygraulicis (4). Oritur enim a sanguine arteriae Carotidis, quae ramum edit ad faciem, ex quo parotis, & maxillaris glandula ramos habent.

*Copiosior*] Adfluit perpetuo saliva in os hominis sani, & certissimum signum morbi est, os siccum esse Medicus reperiatur in aegro. Copia tamen variabili adfluit. Quando famelico homini gratum ferculum ostenditur, exsilit (5) protinus cum aliquo impetu limpida saliva, citra omne etiam mentis imperium. Phrasis Germanica recepta est, *der Mund wässert mir*. Maxime vero mane, quod nocturna quiete, & in actione muscutorum, qui manducationi praesunt, motus salivae fere subpressus fuerit, ut major ejus copia in ductibus congesta expectet causas adfluendi.

*Acris*] Qui per religionem diuturna jejunia observare tenentur, iis olet anima, & saliva exspuitur foetida, acris (6), quae gingivas erodat.

*Detergens*] Nota est in vulgus efficacia salivae in mundandis ulceribus solidis, & ad cic-

[4] Conf. 235. & adde quae de arteria Carotide externa, truncum Carotidis communis continuante, dicta sunt ad LXV. not. 3.

[5] Ex ductu WHARTONI.

[6] TSCHIRNHAVSEN *Medic. Corpor.* p. 23. postquam ad tertium diem cibo abstinerat, observavit, dentes sibi vacillasse, os universum acri saliva inundatum fuisse, & cum manderet, os acriter doluisse. Conf. GALEN. *de nat. facult.* II. c. 8. LISTER. *de humor.* c. XII. p. m. III.

cicatricem perducendis (7). Canes certe, si modo accessus detur, vulnera sua lambendo intra breve tempus persanant.

*Resolvens*] Saliva resolvit massas coloratas, tumores frigidos (8) cum materie immobili, & maculas oleosas, manifesto indicio naturae saponaceae. Sed & ventriculum proprium ita valide adgreditur, ut famis sensum, omnium certe vehementissimum, excitet.

*Fermentationem*] In vulgus notum est, Indos potus suos inebriantes ita praeparare, ut vetulae edentulae, grana mayz manducant, & succum cum saliva mistum expuant in proprium vas terreum, in quo moderato tempore excoquatur in cerevisiam illis gentibus acceptissimam (9). Syrupi, illapsa per incuriam saliva, visi sunt acidi & turbidi facti esse (10).

Ava:

- [7] NUCK. ubertim SIALOGR. p. 52. & copiosam compilationem SCHVRIG. *Sialogr.* c. IV. 17.
- [8] Ad strumas, Melicerides &c. WEDEL. RIEDLIN &c. apud SCHVRIG. qui pro indice esse potest 21. 23. l. c.
- [9] MARGGRAV. *de Chili* p. 28. LERY. 140. 140.
- [10] Imo vero lac secedit adjecta saliva, NUCK. l. c. 28. Succus vero heliotropii rubedine tingitur, teste VIRIDETO, post plurima experimenta, *de prima coct.* l. c. VIII. & in adultis DVERNEY apud DVHAMEL. *Hist. Acad. Reg. Scient. Paris.* p. 249. Verum

*Ανορεξία*] Quando saliva sputatione perpetua ptolligatur [11], perit utique una ex causis non invalidissimis Famis, atque concoctionis, paratur chylus deterioris notae, sanguis ipse diluente liquore privatur. Experimentum fecit BOERHAAVIUS, & salivam omnem exspuit, neque famem percepit. Ea omnia mala imminet Tabaci amatoribus. Quod si exsiccationi resistent profusiori potu, tunc labascit inundatus ventriculus, sequuntur Cachexiae, Hydropes. Certe existimo, consuetudinem hauriendi fumum ficcae Nicotianae nocere omnino macilentis & Hypochondriacis, concoctionis vires debilitare, appetitum subripere. Quare, quando primum ejus  
usus

rum neque Cl. PAVLI in *van HORNE microc.* p. 45. neque mihi, unquam, vel minima mutatio in charta heliotropio tincta, vel in ipsa heliotropii solutione visa est fieri, ex addita matutina saliva jejuni corporis. An aliorum experimentum, quod vini potores fuissent, quod acidum spiravissent ex ventriculo? Ipsa etiam fermentatio nihil demonstrat. Nam & succus Mayz, & syrupi, sibi relictī in aëre libero, sponte fervent atque corrumpuntur.

[11] Noxas ex nimia salivae excretionē BAGLIVIVS, & evidentius, propriis historiis RUYSCHIVS confirmat ADV. II. n. v. quas, in ea ipsa RUYSCHII historia, ad salivae jacturam pertinere, demonstrat restitutio integrae valetudinis, postquam saliva desit per vulnus genae perire.



usus invaluit, laudata est pro vera famis antidoto (12). In aula vero Gallica, cum aliquando more receptum esset, ut aulici pastillos aromaticos ex cera & cardamomis & aliis odoratis perpetuo manderent, observatum est evidenter, numerum hypochondriacorum & tabescentium hominum insigniter auctum fuisse (13). Idem incommodum frequens est in Asia, ubi perpetua mastiches manducatio communi more recepta est.

*Constat*] Resolutio corporum per ignem, plerumque non demonstrat, id quod volumus demonstrari. Saepe corpora, in quorum elementa inquirimus, exponimus putredini (14), aut fermentationi, causati, iis adminiculis corpora aperiri, deinde mutata corpora igne torquemus, & obtinemus liquores quos pro principiis eorum corporum venditamus (15). Nempe alcohol

[12] Apud Indos Brasiliae incolas, eo scopo fumum familiarem fuisse LERY *hist. de l' Amer.* p. 213. & pastillos ex conchyliis cum foliis Tabaci, MONARDES *de aromat.* I. p. 309. ed. *Antv.*

[13] Noxas salivationis, ut vocant, in morbis variis, compilavit SCHURIG. p. 77. 80.

[14] Eam praeparationem adhibuit in salivae analysi BAGLIVIVS, p. 427.

[15] NEUMAN *Trans. Philos.* n. 392. p. 9. BOYLE *Chym. Scept.* p. 19. &c. BOERHAAVE *Elem. Chem.* II. p. 345. &c. LEMERY in *Acad. Reg. Scient. Paris.* variis annis, hanc verissimam sententiam contra vulgus Chemicorum evicerunt.

erit pars constituens naturam Tritici, quia Triticum post fermentationem, igne agitatatum, alcohol stillat; & dum carnibus animalium vescimur, deglutimus acerrimum, foetidissimum, fudorificum salem volatilem, quem ignis ex carne extorquet. Verum praeter hanc difficultatem, quae in omni analysi chemica vera est, saliva propria habet incommoda, obstantia, ne certum de ea iudicium ex igne ferre liceat. Parvo igne non multum mutatur, neque adscendit, sed haeret in imo vase viscida. Magno igne, si urgeas, continuo abit in bullas, spumamque. Lento tepore si utaris, spirabit saliva aliquid leniter aciduli: si ad siccitatem usque evaporantem aquam (16) abigas, prodibunt ex salivae viginti unciiis (17), novemdecim omnino unciae aquae,

[16] Quae velocius adscendit, quam aqua pluvia  
BAGLIV. DE HEIDE.

[17] NUCKIUS ex drachmis viginti, tres omnino drachmas visci puris similis, in quo nihil distincti salis adparuit, ex unciiis vero duabus, grana V. falsi pulveris, de cuius classe non constabat p. 44. &c. Similis materiae fuscae acris, sed dubiae naturae grana tria, obtinuit ex salivae uncia DE HEIDE *Obs. Med.* LXXXVIII. Sal vero simile sali nivis, & nitrosae naturae BAGLIV. l. c. Sed copiosum salem fixum DRELINCOURT. drachmas duas ex unciiis viginti (*de lienos.* ed. 1727. p. 806.) VERHEYENIUS demum ex unciiis octo, olei empyreumatici drachmam semis,

aquae, quae aquae communi simillima est, manet tophaceae massae fere uncia. Id residuum, vehementer igne tortum, exhibet paululum salis volatilis foetidi, quod oleo & sale constat, atque foecem aliquam relinquit, ex qua etiam oleum haberi potest. Nihil omnino adfuit spiritus, si ea voce intelligas liquorem inflammabilem, qui & aquae, & oleo se patiatur misceri. Illud pauxillum salis, neque acidam naturam, neque alcalinam habet. Ea saliva fuit hominis integerrimae valetudinis. Id vero, quod salivatione mercuriali effluit, experimento facto ROMAE & VENETIIS, abit in crystallos, nitri fere similes, a salivae natura alienas, ortas a salibus acidis, quibus mercurius dulcis erosus fuerat. Nitrum enim, si ullus alius sal, ex corpore humano ejusque liquidis exfulat perpetuo.

## §. LXVII:

*Motu expressa* ] Actione muscutorum, quibus diversi salivae fontes subjiciuntur (1). Saliva vero semper adfunditur cibus in

femis, salis lixivi tantumdem. L. II. Tr. I. c. XXV. p. 112. 113. BARCHUSEN ex unciis tribus, olei grana duo, salis lixivi tantumdem, *Acroamat. Experim.* 8. p. 364. 374. Diversitas enormis est in eventibus horum tentaminum. An ex vicio experimenti? an salivae?

[1] Vid. LXV. not. 12. Deinde sublinguales inter Mylohyoideum & Genioglossos,

in eo loco ubi primum solvuntur, homini in ore, animalibus ruminantibus in ventriculo primo (2), avibus in ingluvie (3).

*Similitudinem*] Saliva est liquor ex sanguine nostro secretus, denuo in sanguinem resorbitus, & iterato ad os effusus (4), liquor ergo quam maxime indigena corporis humani, & quarti generis, cum ad ignem non concreascit (4\*). Sed adfunditur cibus, cum iis miscetur accurate, mutabit ergo eos in naturam corporis humani, & panem, solo diuturno adtritu in ore, fere in chylum reformat.

• *Miscelam*] Videtur magnum praesidium firmae valetudinis in eo positum esse, ut omnia elementa liquidorum humanorum sint exquisite mista, neque ullum seorsim fluat. Sal ab oleo secedens, rodente sua efficacia vasa destrueret, oleum sincerum ea, quae occuparet, aquae inaccessa redderet; aqua effugeret in canales minores, desertis arteriis & venis majoribus. Linteum aquae intin-

buccales a Buccinatore, Uvula a Glosso- & Thyreopalatinis &c. Sed negat STAHLIUS quidquam conferre musculos, nunquam enim ad mansam ligni scobem salivam adfluxuram p. 224. Jubeat eodem jure, prelum uvis parcere, pondus bilancem non detrudere: Sed & experimentum falsum est.

[2] PEYER. de *rumin.* L. II. c. II. p. 119.

[3] WEPFER E. N. C. Dec. I. Ann. II. *Observ.* CCLI.

(4) Ad LXVIII. not. 3. 4.

(4\*) Confer CCXXXV. & CCXXVI.



intinctum oleum non transmittit per poros suos, transmittit autem facile, si saponem prius probe fuerit confricatum. Ita pingua lactea vasa nostra subire non possent; nisi subigerentur cum saliva & similibus liquoribus saponaceis. Inde adparet, nos quoties v. c. pingui vescimur, magna damna passuros, nisi aliquid obstaret, quod corrigat lentorem olei. Nempe saliva, cum oleo subacta, miscetur oleo, id reddit aquae miscibile. Panis butyratus, cum carne infumata, acceptissimae Belgarum deliciae, diffunderet, ex natura sua, in rancidum liquamen, ex quo ructus adscenderent inflammabiles. Sed is ipse panis oleo obrutus, si probe manducetur, chylum blandum, & limpidum, & nutritium dabit; eo melius, si bis coctus fuerit, & duritie sua effecerit, ut diligentius manducetur.

*Solutionem]* Vires corporum dissolventes non semper pendent ab aliqua notabili acrimonia, quae sensus feriat. Aqua ex albumine ovi adeo blanda est, ut oculo instillata innocua sit, neque dolorem faciat. Eadem nihilo segnius myrrham solvit, vi sapo-

(5) *Salini, in Text.]* Sal nullus agit nisi solutus, saccharum siccum non sapit, ipse lapis infernalis non urit, si siccus, siccae cuti admoveatur. Iidem sales, in aqua soluti, efficaciam suam exserunt, stimulant, dissolvunt olea, &c. Sed primum salium vehiculum, saliva est. Verum & sapor non percipitur, nisi sale soluto. v. CCCCLXXXIX.

ponacea, quae ex oleo & sale alcalino componitur.

*Fermentationem*] Chemici omnibus actionibus Naturae operantis admiscunt fermentationem: Chemicorum adversarii ex omnibus excludunt eandem. Nimis late utrimque. Quoties nempe materia fermentationis cum calore proprio & aëre adest, non potest fieri, quin oriatur fermentatio. Sed panis ex indole sua acescit, fermentatur; saliva pro aqua adest; aër accedit libere, os & ventriculus locum calentem, mediocriter clausum exhibent. Nascetur utique fermentatio: Et eam fieri, efficaciter demonstrant adscendentes ructus, & vagi borborygmi (6). Sed non perficitur, cum neque vas clausum adsit, aërem coercens, neque aër externus excludatur; nisi forte debilitas hominis fecerit, ut cibi in ventriculo diutius retineantur, atque ex ingenio proprio mutantur.

*Saporis*] Si diversi generis alimenta adsumseris, panem, pomum, pisces, & omnia patienter manducaveris, neque quidquam deglutiendo separaveris a reliquis, paulatim singula amittent aliquid de sapore suo, & abibunt denique in massam uniformem, cujus odor & sapor, debiles fient atque blandi, neque quidquam retinebunt  
distin-

- (6) Fieret nempe fermentatio ex natura ciborum atque salivae, nisi aliquid obesset, bilis nempe, tritus perpetuus, copia adfusi liquidi. vid. BOERH. *Elem. Chem.* II. 182.  
2. vid. INST. MED. §. LXXVI.

distinctissimae naturae, quae in singulis adfuerat. Nisi forte propria aliqua pertinacia saporis aut odoris in cibo sit. Ita allium & cepa odorem suum non dimittunt, & diutissime pestilenti suo halitu ore emergente se produnt, ut in Judaeis observamus (6+).

*Intestini*] Seditio quaedam particularum, & occulta reptatio omnium massularum omnino requiritur, in eo liquido, quod fermentari debet. Nunquam ex saccharo acetum produxeris, nunquam alcohol ex farina, nisi conturbatio ista praecefferit. Sed potenter motum intestinum ciet aër, calore agitated, neque unquam magis exercens elasticum suum robur, nisi quando viscido corpori inclusus haeret. Inde tenaces illae & constantissimae spumae in saliva. Is vero aër, salivae mistus, subactus cum alimentis, interfertur singulis pene particulis, exserto elatere particulas a se invicem dispellit, vincula massularum dissolvit &c. (7).

*Refectiorem*] Homo perdit famelicus, vix dum gustaverit offam panis vino intinctam, nihil certe deglutiverit, adcessit tamen summa refectio toti corpori. Namque venae bibulae, & in universo corpore humano, & in lingua frequentes, absorbent id, quod in alimento fluidissimum est, vehunt

[6+] Parentis olim si quis impia manu

Senile guttur fregerit

Edat cicutis allium nocentius

HORAT. Epod. III.

[7] Vid. fusius LXIX. not. var.

hunt ad venas jugulares, inde ad cor. Id non anatomicorum modo argumenta; (8), sed & eae herbae docent, quae diutius manducatae, totae deliquescunt in ore, & pene nihil foecum relinquunt, quod in *Acmella* (9) Ceylanica BOERHAAVIUS expertus est.

*Sapidi*] Nervorum nullus sentit, nisi humidus fuerit. Qui gravedine & catarrho laborant, deinde, qui ore aperto somnum egerunt, ut linguam & palatum sicca habeant, nihil omnino eorum gustant, quae per os admiserint.

### §. LXVIII.

*Tali*] Liqueat ex LXVII. LXVIII. LXIX. cur nulli perfectiorum animalium saliva denegata sit (1)? cur avibus & aliis animalibus

[8] In ventriculo demonstrabitur ad §. LXXVII.

INST. In lingua flatus per venas injectus, post macerationem per minimos ductus bibulos erumpit; COSCHWIZ *de nov. duct. saliv.* p. 10. cum experimentum in ductu suo fecerit, fecit utique in venis.

[9] HERMAN. Mus. Ceylan. p. 17. est vero *Bidens urticae folio Indicus lithontripticus* HOTTON. *Phil. Trans. abrig'd Vol. II.* p. 648. cont. BREYNI diff. inaug. de *Ginseng & Acmella*.

[1] In Quadrupedibus ubique salivales glandulae; in serpentibus simillima saliva ex folliculis RHEDI. *de viper.* p. 165. In avibus, liquor ex glandulis ingluviei.



bus non dentatis, saliva ex peculiari fabrica, ad finem oesophagi secernatur?

*Male*] Benigna parens, sed aequae sapiens ac quidem benigna est, nihil absque fine molitur. Atque ejus voluntatem vel ex eo nos decet agnoscere, quod salivam ad os non alias adfundat uberius, quam eo ipso tempore, quo cibos adsumimus, iisque admistam salivam obportuna necessitate deglutimus. Neque unquam aegri de adpetitus languore queruntur, dum os humidum habent, certo non adpetituri, si os siccum fuerit. Qui mane salivam exspuit, vix esuriet sub tempus prandii, egregie esuriturus, si omnem deglutiverit. Verum etiam moratorum gentium consensu receptum est, ut sputatio inter honesta hominum colloquia pro turpi & dedecorosa habeatur, & in Oriente inprimis summae detestationis signum fuerit (2).

*Melior*] Tenuis & aquosa saliva resorbetur per vasa lactea, eadem fertur ad sanguinem, & quae semel, ex hydraulica (3) lege, ad caput glandulasque salivales deposita est, deponetur denuo iisdem legibus ad eadem loca, magis jam depurata, & magis humana, si voce insolente uti licet (4). Sed  
fae-

[2] DEUTERONOM. XXV. v. 9.

[3] INST. MED. 300.

[4] Salivae uncias duodecim intra diem naturalem in homine secerni putat NUCKIUS p. 30. Ea copia non excreatur in sano homine, neque per alvum egeritur, &  
urina

saepissime, intra diem unicum, eam viam ire & redire potest, & centies quidem intra unicae horae spacium †.

*Morbi*] Sunt utique morbi pluresculi, in quibus uberior excretio salivae salutaris est. Verum is liquor, secretus equidem per salivae vasa, non vera tamen saliva est. In lue Venerea, salivatio mercurii efficacia expressa, ipsum sanguinem liquefactum, simulque cum eo ichore, pinguitudinem corruptam eliminat. Quod manifestum est, cum eosdem plane morbosos humores decoctum Guajaci per sudorem exprimat (5). In Cachexia, sialagoga illa & *masticatoria*, non salivam adeo, quam quidem inutilem atque abundantem aquam expellunt, quae efficacius per anum purgantibus medicamentis deijcitur.

*Cri-*

urina fere ex potu generatur. Major ergo pars salivae videtur resorberi.

† Error torte MS. nostri. Nam LOWERIANA computatio, quae satis superque laxa est, intra horam sanguinem omnem per cor moveri vult decies & ter, *de corde* p. 170. quod multum distat; neque probabile videtur, nullam salivae partem per urinam excerni.

[5] BOERH. praef. *ed Aphrodisiac.* sub fin. Sed & per alvum aliquando, CAMER. *de salivat. sine saliv.* & ubertim usu solo electuarii BIERLINGIANI experientissimus WERLHOF. *in Commenc. Lit. Norimb.* 1735. not. 13.

*Crises*] Possit salutaris illa in Variolis salivatio adferri, ad evincendam inutilitatem liquoris, qui tanto cum emolumento profligetur. Namque die XI. (6) corpus aegrum, crassa & fere continua squama tegitur, quae fit ex confluentium variolarum melleo liquore in crustam nigerrimam condensato. Eo tempore, nisi salivatio uberior, aut manuum pedumque tumor accedat, certa mors expectari debet. Tunc enim materia perspirationis insensibilis, repulsa a crusta impenetrabili, redit intra sanguinem, putredinis & mortis causa certissima; quae enim quinque (7) partes octavas aequat omnium excretionum quae ex corpore humano fiunt, ea si retineatur, nonnisi potentissime nocere potest. Sed ea materies, quando per salivae vasa ejicitur, aut in manuum pedumque cellulosas membranas cedit, corpus a putredine liberum relinquet (8). Melancholici

[6] SYDENHAM. *Epist. de Var.* p. ed. Lips. 188-191. BOERH. *Aphor. Pract.* 1398. fin. Sed & in febribus malignis aliis, ex petechialium genere, id visum fuit. vid. RIEDLIN. & LENTILIVS *Misc. Nat. Cur.* Dec. III. Ann. IV. V. p. 257. app. 132.

[7] SANCTOR. C. I. § VI. Sed in variolis cibos fere nullos adsumimus, non ergo tanta perspiratio.

[8] Imo vero ipsum pus variolarum resorbtum, intra sanguinem receptum, facit febrem putridam, sanandam purgante medicamento acido; & salivatio conservanda est, ut anginam funestam arceamus. conf. BOERH.

*Aphor*

lici vero spectatores melius omnino sibi prospicerent, si salivam deglutirent, qui exspuendo toti exliccantur.

### §. LXIX.

*Aëre*] Absque aëre (1) fermentatio nulla perficitur, tunc felicissime cessura quando aër abunde adest, intime inclusus materiae viscosae, acescenti. Id experti norunt pistores, qui non ob aliam causam pastam suam pinsunt, nisi ut aërem undique in eam profunde adigant. Verum, praeter hunc aërem, qui cum aëre communi idem est, aliud exstat genus aëris (2), qui intra corpora latens, nunquam conspicuus (3) prodit, nisi aut ignis (4) summa violentia accedat, aut rigidissimum gelu (5), aut effervescentia salium contrariorum (6), aut deni-

*Aphor. Pract.* 1400. Neque semper funestus est salivationis & tumoris defectus.

*FREIND. comm. ad Epid.* VII. *hist.* II. & *Epist.* *FREWIN.* &c.

[1] *BOERH. Elem. Chem.* II. 24.

[2] *MARIOTTE de la Nature de l'air* 263. &c. id intra aquam condensari in spacium decuplo minus, &c. 164.

[3] Elaterem tamen suum, neque omnem, neque constanter intra liquida deponit, *HALES Haemastat. App. Exp.* II. p. 272. seqq.

[4] *MARIOTTE l. c.*

[5] *MARIOTTE l. c.* *WOLF. Physic. exper.* I. C. VI. §. 168.

[6] *MAR.* 167. in quem rem pulcherrima experimenta sunt *MUSSCHENBROEK in Acad. Ciment.*



denique aër ambeuns (7) omnis detrahatur, quando ita se evolvit aër ille latens, ut spacium multoties priori amplius (8) in vacuo BOYLEANO occupet; Sed utrumque aëris genus, uberrime adest in manducatis cibis, atque cum saliva subactis (9).

*Muco*] Mucus iste, adeo necessario requiritur ad vitam, ut animalium nulli denega-

[7] MAR. ib.

[8] Quater millies MARIOTTE p. 173. Verum, si aër vulgaris elasticus potest dilatari ita, ut se ipso fiat amplior septuagesies (BOYLE *de aëre elastico* Exp. VI.) tunc aër ex calculo humano productus, qui spacium 650ies amplius mole calculi occupavit (HALES *veget. statiks* c. VI. p. 188.) servato omni elatere, (ibid. & *Haemastat. app.* p. 319) poterit expandi, ut repleat volumen  $650 \times 70 = 45500$  majus eo, quod intra calculum humanum replevit. Et si aër vulgaris potest conprimi in spacium 1838 se ipso minus (HALES *haemast. app.* p. 348.) jam incredibilis pene orietur differentia inter volumen aëris maximum & minimum. Certe MUSSCHENBROECKIUS, rationes eas expressit numeris 46,656,000,000, & 1. (*Elem. Phys.* p. 383.)

[9] Nulla hic est efficacia aëris interni, non elastici: namque in corpore humano nulla adest causarum *not.* 4. 5. 6. 7. *hujus* §. quibus solis latens aër in activum robur restituitur. Ita aër cerevisiae Britannicae fortissimae, non est elasticus HALES *Haemastat.* p. 272.

negatus sit (10); atque non alius certior sit praenunciator instantis lethi, quam eius absentia, five fauces glabrae (11). Mucus autem subpinguis est, aqua crassior, sed cum aqua miscibilis, secretus in glandulis simplicissimis (12). Ignari medici, saepe lactantur, mucum expresso vi acrium purgantium, facinore patrato, quod salutarem artem non decet.

*Linguae*] Lingua (13) habet dorsum plenum verrucis mucum stillantibus: maxime vero ubi radix ejus Epiglottidi connectitur. Deinde foramen coecum, cryptis mucosis praeditum est: VATERIANA expansio glandulosa, linguam obvelans, perpetuo lento humore madet. Is omnis, adeo copiosus mucus, non effluit perpetuo, sed stagnat, exprimendus ad suos usus agitatione Linguae, valide ad partes vicinas solidas adpellentis.

*Inviscatis*] Magna certe mucum utilitas est, aërem motu ipso admistum tenacitate sua coercere, ut cibos ad ventriculum comiteatur, magnarum mutationum futurus certissimus auctor. Quare in lentoris definitum  
gra-

[10] Longum catalogum Quadrupedum, Avium, Piscium, in quibus membranam pituitariam vidit, vid. apud SCHNEIDER *de catarrh.* L. III. S. II. c. III. tot.

[11] Quas *graciles* vocat HIPPOCRATES *Coac.* p. 263. edit. FOESIANAE, & deglutitio laesa omnibus morbis acutis finem solet facere.

[12] INST. MED. CCLI.

[13] Vid. §. LXV. in *notis* variis.

gradum paratur, aërem non retenturus, nisi tenax esset, non dimissurus, si tenacior.

*Pondere*] Dubitavimus alibi (14), num satis evictum sit, quod omnis aër ex sua natura gravitet: Sed de eo aëre, qui cum cibis miscetur, nullum omnino dubium est.

*Elasticitate*] Nondum satis declaratum est a Philosophis, quae sit mirabilis illius proprietatis intima ratio. Satis evictum est (15), aërem posse valde conprimi, dilatari multo validius, compressum pondera maxima sustinere, eadem, dum se expandit, dissolvere (16). Proxime vero ad Naturam videtur accessisse vir sapientissimus, ISAACUS NEWTON [17]. Ille nempe primus demonstravit, unum aëris elementum elasticum

[14] BOERH. *Elem. Chem.* I. p. 501.

[15] Adcuratius elaterem aëris scrutatus est BOYLEUS, postquam observaverat, aërem in angustum spacium compulsus, retracto embolo, spacium occupare amplius *Exp. Phys. Mech. de Elast. aër.* I. p. 15 Verum ultra experimenta non progressus est.

[16] BOERH. *Elem. Chem.* I. 446.

[17] Non quidem adseruit, eam naturam esse aëris, verum id posuit, si corpora darentur, quae se repellerent, & quorum vis repellens foret in ratione reciproca distantiarum, tunc phaenomena ex ea lege oriuntur eadem, quae in aëris elasticitate observantur. *Princ.* II. Prop. 23. PEMBERTON *view of Newton. Philos.* p. 150. s'GRAVEZANDE *Elem. Phys. Math.* p. 304. §. 1072. 1092. & MUSCHENBROEK *Elem. Phys.* p. 379.

„ sticum non esse, non agere ea ratione,  
 „ qua aërem agere videmus: Duo vero aë-  
 „ ris elementa, si in eam vicinitatem per-  
 „ venerint, quae definita est a CREATO-  
 „ RE, se invicem repellere, & si aliqua  
 „ corpora ea libere recedere non permittant,  
 „ ea maxima vi removere: Eam autem  
 „ vim se repellendi augeri, quo propius ad  
 „ se invicem accesserint elementa, in ipso  
 „ contactu fere infinitam fieri., Plane  
 uti Magnetes, similibus polis sibi obversi, ut  
 australis polus australi respondeat, se repel-  
 lunt vi magna, atque majori, quo propius  
 ad se invicem accesserint (18).

*Calore*] Aër externus, qui corpus huma-  
 num ambit, eo corpore frigidior (19) est;  
 Idem ergo si patiatur calorem, similem ca-  
 lori sanguinis humani, expandetur utique,  
 & receptus intra os, dissipabit bullas salivae;  
 muci, ciborumque solidas massulas, quibus  
 coërcetur.

*Variata*] Nixus aëris, si aequabilis foret,  
 non magnos praestaret effectus: Verum al-  
 ter-

[18] Quae revera augetur imminuta distantia, sed  
 in ratione nondum definita, MUSCHEN-  
 BROECK *Phil. Trans.* n. 300. p. 378.

[19] In exiguo thermometro *Fahrenheidiano* cu-  
 jus gradus sunt 112, longe ab ebullitione  
 remoti, aestate vix unquam calor aëris  
 ad 70° adscendit, calor vero manus meae  
 facile ultra nonagesimum. Et autumno,  
 cum aëris calor esset 58°, calor manus  
 meae fuit 88°, atque ad calorem aëris se  
 habuit, fere uti 5. ad 3. Imo vero in An-  
 glia calor manus humanae duplus aestus me-  
 ridiani aestivi est aestimatus *Phil. Trans.* 2, 0.



ternis vicibus aër frigidus ore recipitur, idemque calore corporis humani incalescit, expanditur: adeo enim sensibilis est aër, ut **BOERHAAVIUS** viderit liquorem Thermometri aërei sensibilissimi adscendere, quoties aliquis conclave ingrederetur, in quo ea machina suspensa erat. Et alternis adeo vicibus, bullulae aëreae, intra cibos conclusae, modo contrahuntur, modo rarefiunt; atque in iis ipsis bullulis est perpetua quasi systole & diastole, & varius nixus, modo remittens, modo validior, vectium minimorum aëreorum, in vesicularum suarum mucosos parietes, atque comprimentem molem alimentorum. Quare particulae elevatae, iterum delabuntur, flexae extenduntur, extensae flectuntur; confictu ergo & motu repetito adteruntur, fiunt similiores suis sociis, & aliquo modo fere in fluidum liquorem resolutae: quales esse decet, ut in Ventriculo in chylum porro possint elaborari. Atque certum est cibos diu manducatos pene in chylum fieri, mutantur enim in liquidum crassum turbidum, album, uniforme; & ipse albus color demonstrat, olea cum aquosis probe subacta esse, in speciem aliquam emulsionis. Inde liquet, quare manducatio ad felicem vitam adeo necessaria sit, ut vitam suam diceretur odisse, a Veterum aliquo, qui alimenta non diligenter manderet. Namque debiliior ille Ventriculi tritus, nisi praecesserit divisio in minimas particulas valida videndum, nixuque aëris, & salivae diluentis ministerio, non poterit superare nexum particularum alimenti, neque chylum bonae

notae praeparare. Ex chylo vero deterioris conditionis, nunquam defoecatus, & absolute perfectus sanguis generari poterit. Quare manducatio maxime commendari debet omnibus hominibus, qui sedentariam vitam degunt, neque robore musculorum cibos duriores superare didicerunt, ut literatis hominibus fere commune est. Rustici & operarii homines facile manducationis omissionem ferunt. Leones, Tigrides & alia animalia voracissima non manducant, sed eadem post maximas ciborum repletiones, exiguo tempore interpolito denuo esuriunt; Digerunt equidem ob summum robur, sed minus inde chyli conficiunt (20). Eadem ratione, homo, si esuriverit acriter, non manducatos cibos absque incommodo concoquit. Nempe in eo salivae acrimonia compensat admissionis paucitatem. LXVI.



## D E G L U T I T I O.

## §. LXX.

Inter omnes functiones corporis humani (1), deglutitio, uti longe molestissima est narra-

[1] Et iis omnibus foeces liquidae sunt.

[1] PRAECEPTOR optimus, post nostra tempora, in editione, quae anno 1734. prodiit, longe pulchriorem difficillimi negotii historiam dedit. Nefas tamen duximus, vel eas voces omittere, quibus meliores publicas fecit AUCTOR, ne plus tribuisse vi-

narratu, ita discenti etiamnum molestior est. Neque id absque ratione, cum inter conpositas actiones ipsa sit conpositissima. Debuit cibus ore adsumtus, deferri ad fauces.

De-

videamur nostro iudicio, quam auctoritati fidissimi codicis.

NOT. ad EDIT. 1734.

- [1] *Cryptis mucosis, in Text, p. 32.* Vid. COWPER. *App, ad BIDL. f. 8. lit. b.* quae eadem est icon *Myotom. nov. 1724. T. XXVIII. f. 4.* quae modo in acervos colliguntur, modo sparguntur solitariae.
- [2] *Sulcatum, in Text, p. 33.* In brutis evidenter transversis sulcis, vid. SCHNEIDER. *de catarrh. L. III. §. II. fig. III. ex vitulo.* In hominibus omnino obscure. Caeterum epidermidem habet reticulum & periosteum pulposum cuti simillimum. KAAUW *de persp. 105.*
- [3] RUYSCHIANA, *in Text. p. 33.* In naribus, vasa quae vocat *Arteriopituitosa*, singularia, juxta longitudinem narium decurrentia, longis retis areolis, THES. VII. T. III. f. 2. pulchre, & EPIST. IX. T. IX. f. 7. In palato, & vasa demonstravit THES. V. *Locul. magn. Arc. I.* & glandulas, quas dicit esse glomeres vasorum, *Thes. VI. Aff. I. N. 3. not. 2.*
- [4] *Tonsillae, in Text, p. 34.* De iis in universum in E. N. C. Cent. IV. *Obs. CXC. p. 456.* HEISTERUS egit, & fissuras exhibuit in situ naturali.
- [5] *Membrana, in Text. ib.* Teguntur anterieus membrana oris, ejusque ope connectuntur linguae. Interius vero per membranam pha-

Debuit aperiri Oesophagus, claudi eodem tempore aspera arteria, atque narium meatus, quarum cavitatum utraque Oesophago finitima est. Et super ipsum quidem clausum

pharyngis, qua velantur, aperiuntur finu uno, aut pluribus, HEIST. l. c. T. XI. f. 1. G. Superius membranae ope nectuntur membranae mobili Palati HEIST. l. c. K.

[6] *Cryptarum, in Text. ib.*] v. HEIST. l. c. figuris plurimis. Cellulosam fabricam ipse adgnoscit RUYSCHIUS *Thef. II. Aff. VI. N. 14.*

[7] *Columnarum, in Text. ib.*] Ita ut ad perpendiculum posita sit, inter velum palati & linguam, media fere sede; atque muscolum Glossopalatinum anterius & interius, Thyreopalatinum vero exterius & posterius, adcumbentes habeat, praeterlabentes etiam Styloglossum, & Pterygopharyngaeum.

[8] *Patentioribusve, in Text. ib.*] Ita ut in catarthalibus malis, dilatata oscula, facile pro ulceribus inponant Chirurgis RUYSCH. l. c.

[9] *Uvula, in Text. ib.*] Primus, ni fallor, GLISSONIUS *de Ventr. & Intest. II. c. XVI.* deinde PRAECEPTOR, & LITTRIUS *Memoir. de l'Acad. des Scienc. 1718. p. 380.* uvulam a Velo palatino distinxit, quas particulas Anatomici, ex locorum ignorantia ita confuderunt, ut musculos Veli palatini, omnes omnino Uvulae adscripserint.

Est vero *Velum palatinum* septum mobile, constans membrana ex naribus, & alia ex palato osseo producta, conjunctis in ora pos-



sum laryngem, superque operculum ejus Epiglottidem, ita debuerunt vehi potulenta,  
ut

steriori veli; antè adnata arcui posteriori levi offis palati utriusque, deinde lateraliter palati processibus alaribus, & alis; ex horizontali pendula, & libera posteriori toto margine; Latitudo a dextra ala ad sinistram fere fescuncis, ab anterioribus retrorsum unius unciae. Iconem habet EUST. T. XLII. f. IV. VI. deinde, sed non satis distinctis limitibus aliam LITTRE *Mem. de l'Acad. des Sc.* 1718. T. XV. f. I. cum bona descriptione. conf. BIDLÖO T. XIV. f. 3. HEISTER *Comp.* f. 38. COWPER. T. XXVIII. f. IV. inter K. & H. T. XXIX. f. I. *ib.*

*Uvula* vero appendix est ejusdem membranae crassior, in cono obtusi formam ficta, factaque a glandulis & Azygo musculo, pendens ad perpendiculum ex media ora libera posteriore veli, ad usque linguae sedem postremam, quam pene adtingit, ante Epiglottidem, neque unquam pone Epiglottidem. Figuræ hujus crebriores sunt. In situ in primis LITTRE. l. c. f. I. & II. deinde HEISTER. E. N. C. l. c. COWPER. *Myot. nov.* 1724. T. XXV. II. f. 4. BIDLÖO T. XIII. f. I. T. XIV. f. 3. EUSTACH. T. XLII. f. 3. Extra situm naturalem VALSALVA T. V. f. I. 2. T. VI. & passim COWPER. T. XXVIII. & T. XXIX.

[19] Longis, in *Text. ib.*] Quas & LITTRIUS l. c. & RUYSCHIIUS habet *Thef.* II. *Aff.* V. no. 6. Extra dubium est, loqui priorem

ut ne unica guttula intra glottidem stillet, cum etiam si unica fuerit, sufficiat, ad movendas convulsiones, metumque strangulationis. Quare ut obscurissima haec actio aliquid

rem de musculo Azygo, neque *Ruysehii* aliam sententiam esse opinor.

- [10] *Arteriosa, in Text.*] Arteriae *Tonsillarum*, & *Uvulae*, *Palatique mobilis*, proprio trunculo, modo ex Carotide externa ipsa, modo & plerumque ab arteria Labiali (quae per marginem maxillae inferioris incedit COWPER T. XXII.) proxime ejus originem. Arteria *Palati ossei*, finitima priori, a trunco Nasali, quae *Maxillaris interna* WINSL. Pl. des Art. 58. Ab ea ad vicinas sedes musculorum *Uvulae* rami. Arteria *Pharyngea*, alias communis est truncus cum *Occipitali* ex Carotide externa, haud longe a divisione Carotidum, plerumque singularis, ex Carotide externa, adscendit ad summum usque Pharyngem, inter duas Carotides, & ubi cranium jam subitura videtur, reflectitur, atque distribuitur in Pharyngem. Inferiores Pharyngeae a Thyroidea sunt.

- [11] *Venosa, in Text. ib.*] Haec mire variant, & vix descriptionem admittunt. Solent venae, juxta Styloglossum, plusculae, oriri ex trunco conjungente Jugularem internam cum externa, vel a proprio ramo venae magnae Facialis, plexum facere juxta Tonsillas, inde ad Palatum mobile, Uvulam, Tonsillas, Dorsum linguae, varie distribui, conjunctae cum Linguilibus, cum Hyoidea vena &c. *Pharyngeae*,  
loco

aliquid lucis admittat, partiti sumus longam historiam, atque ex ordine persequendum sumimus cibum, per diversas oris caveas. Eae autem sunt.

# I. Ca-

loco & numero incertae, plures, a Jugularis internae trunco, & a trunco Venae Facialis, plexum pone Pharyngem facturae. Inferiores vero Pharyngeae, plexum facientes, pone Pharyngem descendentes, sunt a Thyroideis. *Facialem* autem Venam dico, truncum unicum, vel plures, quae ex Jugulari Interna ortae, prospiciunt Linguae, Pharyngi, Naribus, Palato, Faciei universae &c. Ita nominare malim, quam *Jugularem externam anteriorem*, qua voce ambigua, adfini familiari nomini rami Venae subclaviae, utitur WINSLOW. III. *des Vein.* 72. &c.

[1] FALLOPIO, *in Text.*] Qui *Stylopharyngaeum* sub nomine *Quarti partis Linguae; Circumflexum palati*, pro *Primo faucium; Levatorem palati mobilis*, pro *secundo; Cephalopharyngaeum* una cum *Hyopharyngaeo*, & *Thyreopharyngaeo*, & *Glossopharyngaeo*, pro *tertio Faucium* descripsit. *Observ. Anat.* p. 65. ed. Venet. 1606, omnes paucissimis voculis.

[12] VALSALVA, *in Text.*] Qui MOLINETTI & CROONII descriptionibus, & FALLOPIANIS, addidit alios musculos vere novos *Glossostaphylinos*, *Pharyngostaphylinos*; alios uberius exposuit, *Glossostylo-Hyo-Thyro-* & *Crycopharyngaeos*; alios novis nominibus tantum, *Musculum novum Tubae*,

I. *Cavea buccarum*, quae antèrius quidem genis, buccis, labiis coërcetur, posterius finitur maxillae superioris utroque offe, quae parte sub naribus est, & maxillae inferioris parte media,

## II.

*Tubae*, qui *Primus Fancium FALLOPII*; & *salpingostaphylinum*, qui *Secundus* ejusdem fuerat. Icones addidit omnium, sed extra nexum partium naturalem.

- (13) MORGAGNO, in *Text.*] In *Epist. ad VALSALV.* anno 1706. data, quae exstat in *Commentariis Acad. BONON.* p. 371. seqq. Descripsit autem *Azygon Uvulae*; *Staphylopharyngaei* nexum ad os palati (quem *Hyperoopharyngaeum* musculum dixit SANTORINUS p. 133.) in *Thyroidem cartilaginem* insertionem; *Mylopharyngaeos* denique, non addito nomine. Multa praeterea emendavit & illustravit. Eadem fere brevissime in *ADV. ANAT. I.* §. 8. p. 4. repetiit, & *ADV. ANAT. II. Anim. XIV.* p. 34. 35. confirmavit. Iconem nullam dedit.

- (14) SANTORINO, in *Text.*] In *Observ. Anat. C. VII.* tot. In eo multa minutius est rimatus, *Glossopharyngaei* tres lacertos distinxit, *Thyropalatium* a *Pharyngostaphylinum* separavit, & ab eodem *Hyperoopharyngaeum*: situm *Pharyngis*, *fibras Oesophagi*, *Veli palatini* & *Uvulae* discrimina, & alia inventa priorum, uberius proposuit. *Mylopharyngaeus* vero, *Salpingopharyngaeus* & *Hyperoopharyngaeus* ejus, dudum a MORGAGNO & DOUGLAS-



II. Intercapedo quae *supra linguam* est, inter dorsum linguae, palatique fornicem.

## III.

sio, & ab hoc quidem bini priores nominatim, propositi fuerant. Icones non habet.

Sed omnino addendi videntur Viri de Anatome universa optime meriti; EUSTACHIUS, qui T. XLI. f. V. VIII. XI. XIII. *Stylopharyngaeum*, *Hyopharyngaeum*, *Thyreopharyngaeum*, & *Circumflexum palati* omnes in vero situ; In tabula vero XLII. f. IV. alio modo, in pharynge ex capite soluto, priores omnes: sed praeterea *Velum palati*, *Glossopharyngaeum*, *Stylopharyngaei* finem in cartilaginem scutiformem; f. VI. *Salpingopharyngaeum*, & *Pharyngostaphylinum*. & *Thyreopalatinum*, & ni fallor (41-39) *Hyperopharyngaeum*, (quem ALBINUS pro *Salpingopharyngaeo* habet) vere & perspicue exhibuit.

COWPERVS, in cujus majore *Myotomia* 1724. T. XXIIIX. T. XXIX. pulchrae, atque nitidissimae icones musculorum eorum, qui prius noti fuerant; sed & novi, cum decederet de vita, *Mylopharyngaei*, ejectrique *Cephalopharyngaei*, novique *Pterygopharyngaei* primus imagines exhibuit.

DOUGLASSIUS, qui pene eodem tempore, quo ADVERSARIA MORGAGNIANA prodierunt, neque iis visis, undecim omnino paria Pharyngaeorum descripsit, restituto *Cephalopharyngaeo*, *Hyopharyngaeo* in duos, & *Thyreopharyngaeo* in totidem musculos diviso, *Mylopharyngaeo*, *Salpingopharyngaeo* primum additis (nisi.  
pau-

III. *Cavitas* infra linguam, inter pronam partem, eandemque priorem Linguae, atque oris membranam, cui maxilla inferior continuatur.

## IV.

paucula verba MORGAGNI, *Mylopharyngaei* inventi gloriam ei eripuisse velis). Uvulae vero musculis adjecit *Palato-Staphylinum*, qui idem est *Azygo* MORG. & cujus descriptionem ita obscuravit vocola *forwards*, pro contraria *backwards* elapsa, ut a celebribus viris, simul in Uvula, cum *Azygo* proponatur, & a Cl. WALTHERO pro particula aliqua *Circumflexi Palati* habeatur, de *deglut.* §. IX. p. 19. *Thyreo-Staphylinum*, post FALLOPII breve indicium, primus constituit.

WINSLOWUS aliquot nomina nova, & novum loco *Mylopharyngaei* *Geniopharyngaeum*, & alia, uti solet, exquisita cura adjecit.

Sed longe ante omnes veritate, judicio, & indefesso labore se extulit Cl. ALBINUS, cujus observationes malumus suo loco exhibere, nimis ad nostram brevitate[m] multiplices. Neque negligendi labores DIONISII, MERYI in *Comment. Acad. Reg. Scient.* 1715. & 1716. LITTRII, HEISTERI, WALTHERI de *deglutit.* CANTII denique, cujus T. III. *Pharyngem* a parte posteriori exhibet.

- (15) *Arcus*, in *Text.* p. 35.] Quorum posteriores sibi invicem propiores, anteriorum distantia major est. Posteriores validiores, a *Thyreo-palatino* & *Pharyngo-palatino* conjunctis fiunt, anteriores tenues a *Glossopalatino*.

IV. *Cavea faucium*, quae post radicem linguae sequitur, &, dum deglutimus, subnascitur amplior; cujus limites sunt Lingua, postremam oram palati ossei feriens revoluta suo

[16] *Mucosis, in Text.*] Quas eleganter pingit COWPER T. XXIX. f. II. lit. E. In Salpingopharyngaei parte Pharyngem respiciente, copiosissimae viscae sunt: uti universus eminens margo Tubae EUSTACHIANAE mucosis glandulis repletur.

[17] *Tubarum, in Text.*] Tuba EVSTACHII patet intra cavum faucium, proxime citra meatum narium antrorsum & deorsum, osculo elliptico, sed obliquo, quod pars cartilaginea anterieus educatur longius. (VALSALV. l. c. Tab. IV. lit. K. L.) Ea vero orificia utcunque conspicua reddi, adparet ex GUYOTI experimento, in surditate aquam intra tubam ipsam per os impellente, quod & ACADEMICIS PARISINIS *Hist. de l' ann. 1724. p. 53.* & mihi difficillimum videtur; GARENGEOTO, uti multa, quae nunquam expertus est, facile & expeditum, *Instr. de Chir. II. p. 378. 379.* Conf. de hoc osculo DUVERNEY *des Organ. de l' ouie* T. IX. f. 2. HEISTER. in *app. compend.* T. 8. f. 38. COWPER. *Myot. 1724. T. XXVIII. f. II. G.*

[18] *Atmosphaerae, in Text. p. 37. n. 3.*] Demto illo fluente omni, quod libere per os illabitur.

[19] *Dilatatores narium, in Text. p. 38. n. 8.*] Qui pars est Levatoris labii superioris, conf. EUST. T. XLI. f. I. COWPER. T. XXV. t. V. n. 35. ALBIN. III. c. 8.

fuo apicē; Velum palatinum, quae expansio membranacea, ultra coeli ossis palati extremum marginem, retrorsum versus vertebrae, deorsumque educitur, mediam vulam

[10] *Thyreopalatinus*, in *Text.* p. 40.] Hunc si describerimus, simul & Pharyngostaphylinus, & Hyperoopharyngaeus dicti erunt: Namque Pharyngostaphylinus nomen est VALSALVAE, cum ignoraret originem, quae ab osse palati est, (de *aur.* c. II §. XIX. XX). *Hyperoopharyngaeum* addidit SANTORINUS, cum detegeret originem ab osse palati, ejusdem certe musculi (c. VII. §. XIII). Oritur superius, & ab osseo palati margine posteriori, (ALBIN. III. c. 58.) & a membrana firma, quae ex naribus prodit in velum mobile, & parte sui concurrens, [VALSALV. T. V. f. 2. H. H. T. VI. 2. 2.] parte alia diversus, descendit [COWPER. T. XXVIII. f. 2. & T. XXIX. f. 1. N. N.] recurvatus ex palato mobili, pone tonsillas. post & ad latus linguae ossisque hyoidis [EUST. l. c. & LITTRE *Mem. de l'Acad.* 1718. T. XV. f. i.] interius quam Stylopharyngaeus [EUST. T. XXII. f. IV. VI.] & praeteriectus linguam, per latera pharyngis ad ipsius cartilaginis Thyroideae (EUST. ib. & DOUGLAS. c. XVI. p. 45. MORG. *Adv.* I. 4. & in *Epist.* SANTORIN. c. VII. §. XII. ALB. l. c.) cornu & oram lateralem pervenit, cujus membranae, tectus, (uti & superius tegebatur) omnibus musculis Pharyngis, laxè inseritur. Princeps hic musculus deglutitionis, modo elevat



vulam continens; Isthmia, sive uterque paries faucium ex naribus descendentium; Pharyngis os in gulam ducens; Ostium Laryngis; denique, membranae anteriorem faciem vertebrarum colli obvelantes.

Per

elevat Laryngem, epiglottidem inclinat, pharyngem contra bolum elevat, adducit, dilatat; modo deprimit velum mobile, & cum lingua conjungit, vel ut evanescat aditus ab ore ad glottidem, eodemque tempore, aditus etiam bolo ad nares praeccludatur, vel ut urgeat sub se descensurum bolum. Quae omnia & simul, & partitis vicibus, potest perficere totus valens & carneus. Consentientem vero habemus contra WINSLOWUM, in duos dividendem (IV. 496. 497.) & SANTORINUM, tres musculos distinguentem [l. c. §. XII. XIII.] principem Anatomicorum, ALBINUM.

[21] *Pharyngopalatinus*, in *Text.* p. 40.] Pharyngostaphylinus WINSLOWI, VALSALVAE, WALTHERI, HEISTERI p. 184. est pars prioris, in ipso velo palatino cum connata in arcus speciem. Vid. not. 20.

[22] *Glossopalatinus*, in *Text.* p. 40.] Multo debilior Thyreopalatino, fasciculus gracilis fibrarum, a radice linguae lateraliter ascendit ad palatum mobile, jungitur priori, & arcum facit: (COWP. T. XXIX. f. 1. 53. 53.) Eadem facit quae prior, deprimit velum palatinum, & linguam elevat, sic conjungit linguam cum velo, & aditum a faucibus ad os obturat.

Per ea cava ita debent cibi provehi, ut ex I. & III. in secundum, ex secundo in quartum migrent; tuncque claudatur ostium Laryngis, dum gulæ introitus aperitur; atque super inflexam epiglottidem, cibi ferantur in apertam gulam, inde ad ventriculum ituri.

Pone

[BOERH. LXX. n. 5.] Conprimit Tonsillas, & emulget. ALBINUS vocat *Constrictorem Isthmi faucium* III. c. 59. *Glossostaphylinum* VALSALVA & reliqui. Est arcus anterior faucium LITTRII, *Mem. de l' Acad. des Scienc.* 1718. p. 381.

[23] *Hyperoopharyngaens*, in *Text.* p. 41.] Est pars Thyreopalatini, crepidini ossæ palati adhaerens. An distinctus fasciculus EUSTACHII T. XLII. f. 6? secedens a Thyreopalatino. Huic cum nos, post ALBINUM, jungimus. vid. not. 20.

[24] *Sphenopterygopalatini*, in *Text.* p. 41.] Oritur ab extremo osse Petroso, & continua eminentia acuta ossis multiformis, pone foramen nervi III. Paris quinti, longius etiam retrorsum ab osse eodem, ut mihi non sit visus a Tuba oriri, conf. ALB. I. c. c. 61. & SANTOR. l. infra cit. Descendit antrosum, transit per sinum, qui est inter extremum os palati & corniculum Pterygoideum, fit in tendinem, nimis arctum pictum ab EUST. T. XLI. f. IV. VI. & reflexus expanditur late per velum palatinum, radiatus, ut anteriores fibræ antrosum, posteriores retrorsum descendant, mediae recta introrsum. Harum  
fibra-

Pone tunc, Te deglutire unam aquae unciam, vel bene mansi panis bucceam, eas ut deglutias, hoc ordine ages.

I. Contracti vi magna musculi genarum, & labiorum, subita convulsione omne quod in

fibrarum anteriores, ad lunatam oram palati ossei firmiter [SANTOR. II. sub fin. p. 47. MORG. Adv. II. p. 35. DOUGLAS p. 47. conf. VALSALV. T. IV. lat. dextr.] adhaerere videntur, posteriores [COWP. T. XXIX. K.] cum comparibus intricari. Alias, & WINSLOWO IV. 500. 501. quidem, atque ALBINO & WALTHERO *de deglut.* 19. visus est in duas partes distinctus, ut alia ad hamuli radicem finiretur, alia ibi orta, in palatum abiret. Deprimit velum mobile, & versus linguam adducit, latum, expansumque, opem laturus Glosso- & Thyreostaphylinis, quos coërcet, arctaturos velum, nisi resisteret. Nares clausas a Salpingopalatino, aperit, vi Trochleae. ALBINUS *Circumflexum Palati* dixit. An pars Circumflexi, orta a corniculo, est *Ceratostaphylinus* Cl. HEISTERI? *Comp. Anat.* not. 12. T. VIII. f. 38. Videtur.

[25] *Sphenopalatinus*, in *Text.*] Carneus, & valens [HEISTER. f. 38. G. G. COWPER. T. XXVIII. f. 4.] expansione tendinea obductus, intra priorem oritur, ex osse petroso, qua sede tubam emittit [VALSALV. T. IV. lit. n.] descendit introrsum, & in media sede veli palatini, in carnem dilatatus, cum compare concurrit, in arcus speciem [EUST. T. XLII. f. IV.

in os adsumtum est, convehent in id cavum, quod supra linguam est.

II. Eo temporis momento, quod proxime sequitur, lingua elevata a Styloglossis, atque ad latera in planitiem diducta, se on-  
ne-

VI. COWP. T. XXVIII.), & parte alia cum Thyreostaphylino confunditur. SANTORINUS partem ejus in oram Palati inferi dicit, verum videtur impedire interjectus Palatofalpingaeus n. 24. Hic verus est sphincter narium, posteriorem meatum occludens, obducto velo palati. Quare *Levator palati mollis* dictus a Cl. ALBINO, quem vide. Nomen Sphenopalatini, siquidem ab osse multiformi non provenit, omnino ferri nequit.

[26] *Simul agentium, in Text. p. 42.]* Non videtur Levator Palati (25.) cum Circumflexo Palati (24.) simul agere posse, cum ille descendat omnino, posterior reflexa parte, quae sola palatum mobile movet, etiam adscendat. Imo vero Circumflexus, quantum vires, exiguae certe, sinunt, Levatori renititur.

[27] *Simul omnes, in Text. p. 43.]* Excepto Levatore, qui contra reliquos omnes operatur solus. Reliqui omnes velum palati deprimunt, linguae adglutinant, commercium inter os & fauces intercipiunt, regressum adsumti cibi denegant. Dum eodem tempore Stylohyoides, & Styloglossus Linguam elevant, atque retroducunt; & velo Palatino occurfare faciunt. Et nisi fallor, Levatoris in deglutitione  
non



nerabit eo omni, quod debet deglutiri, atque simul per fibras transversales Linguae (LXII.) eo tempore contrahitur in carinae speciem.

III.

non maximae partes sunt, quandoquidem omnia adsumta sub Velo palati detinentur perpetuo, etiam depresso, nares tamen semper distinguente a faucibus.

[18] *Azygos*, in *Text.* p. 43.] Inventor post DIONIS *Cours d' Anat.* p. 592. MORGAGNUS est, in *Epist.* ad VALSAV. apud BONON. p. 371. & *Adv.* I. § 8. p. 4. II. p. 35. DOUGLASSIUS eundem C. XII. p. 44. descripsit, & LITTRIUS *Mem. de l' Acad.* 1718. p. 382. HEISTERUS iconem dedit T. VIII. f. 38. & CANT. T. III. f. 2. Oritur a media ora palati ossei, in ea sede, ubi paria palati ossa conveniunt; & ex osse, & extendinea expansione producta ex osse, & ex hac quidem sola mea observatione, quam & ALBINUS confirmat. Unus est, uti cum MORGAGNO vidi, & WALTHERUS p. 17. & ALBINUS, (alias bini, SANTORIN. VII. §. XVI. WINSLOW. 502.) & recto ductu retrorsum, ad Uvulam pervenit, cujus veram molem cum glandulis mucosis efficit. Elevat uvulam, prolapsam restituit, velum palatinum brevius facit, antrorsum trahit utrumque, & si Levator palatum naribus obduxerit, detrahit palatum, atque restituit. Id vero omnino repugnat PRAECEPTORIS sententiae, quam non video qua ratione

O 3

possim

III. Lingua admoto apice ad dentes incisivos maxillae superioris, revolvitur (29\*) apice suo ad posteriora, efficacia Styloglossi, Ce-

possim tueri. Retrorsum enim, deorsumque ducere Uvulam, qui possit, ortu anterior, superior, id non capio. Neque facile persuadeor, uvulam retro epiglottidem duci posse, quae perpetuo anterior est; longe minus glottidem protegere, ad quam ut extendatur, vires musculares omnino desunt, neque possent, si adessent, cum ipsa uvulae longitudo non sufficiat. Id conspectus in vivo, aut mortuo homine declarat, & consentiunt icones BIDLOI & LITTRII.

[29] *Perdita, in Text p. 44.*] Non invenio. ASTRUCIUS (*de lue Vener. p. 410. L. IV. c. XI.*) disertè adfirmat, neque loquelam neque deglutitionem laedi, ex destructa uvula, si modo Lues Gallica persanata, & ulcus coercitum sit. Et abscissas ob varias rationes uvulas (BARTHOL. *Cent. II. Epist. LXXXVIII.*) non videtur ullum insignius incommodum in deglutitione sequi, cum frequentissima sit in gentibus Borealibus. Sed & eroso palato, loquela abolita, non lego deglutitionem laesam fuisse, FOREST. *Obs. L. XXXII. c. XXII.* & conf. HILDAN. *Observ. Chirurg. Cent. II. Observ. XXII. p. 99.* &c. E. N. C. Dec. I. *Ann. IV. V. Obs. XVI. LXVI.*

[29\*] Id rarius fit. Plerumque lingua tantum adplicatur tota longitudine ad coelum palati, & adprimit se, initio pressionis factò in apice, sine vero in parte posteriori.

Ita

Ceratoglossi ; & globus deglutiendus , juxta  
 rugas palati determinantes ejus iter, semper  
 propellente Lingua retrorsum se revolvente,  
 ad

Ita deglutienda elidit ex cavo superiori  
 oris, & ad fauces determinat. Conf. ME-  
 RY 1716, p. m. 19.

[30] *Epiglottis*] Pone Linguae radicem, est ca-  
 vum amplum & difforme, quod superius  
 osse occipitis & multiformi terminatur,  
 anterius in nares & os aperitur, posterius  
 ante corpora vertebrarum descendit, infe-  
 rius & juxta vertebrae in oesophagum po-  
 sterius, & anterius in Laryngem continua-  
 tur. Medium hujus cavi, quod *Fauces*  
 vocamus, dividit, sed non integre, Velum  
 palati. In eo cavo (LITTRE l. c. f. 1. &  
 2.) Larynx aperitur ostio non exiguo,  
 (CASSER. de *Log. org.* T. I. f. 7. inter F  
 & G. SANTOR. T. II. f. 3. ad D. COW-  
 PER. *Myot.* T. XXX. f. 2.) quod anterius  
 longius, retro brevius est, (LITTRE l. c.  
 p. 379. qui pro vera Glottide habet : )  
 pone Epiglottidem, ante Anularem, &  
 Arytaenoideas Cartilagineas, quae & ipsae  
 rima (EUST. T. XLII. f. 2. COWPER.  
 l. c. ad I.) quadam separantur. Sub hoc  
 ostio vera Glottis est, rima transversa, an-  
 gustior, quam relinquunt duo ligamenta  
 a radicibus cartilaginum Arytaenoidearum,  
 ad scutiformem delata, quae & anterius &  
 posterius angustior est, media latescit.  
 WINSL. IV. de la Tête. 435. Ante hanc  
 glottidem erigitur, pone Linguae radicem,  
 sub uvula, & posterius, *Epiglottis*, carti-  
 lago fere ovalis figurae, elastica, erecta,

ad veli palatini sedem, ita, ut ne guttula quidem aberret, in dilatatas eo tempore fauces.

## §. LXXI.

EUST. T. XCII. f. 2. apice angustiori antrosum recurvato, continua cum Lingua membrana vestita, & cum hujus radice media connexa, fibris in fasciculum collectis, (EUST. T. XLII. f. 5.) quae rarissime rubrae, [HEISTER. *Comp. Anat.* f. 34. K. SANTOR. c. VI. §. XVI. LITTR. l. c.] fere semper albae & membranaceae [MORG. ADV. I. T. I. d. & VI. *Anim.* XCII. p. 119. 120. WINSL. IV. 439.] sunt. Inter Epiglottidem & Linguam depressio est modica. Lingua vero retroversa, dorso suo collecto, & a retractis fibris crassiori facto, necessitate viciniae, impellit Epiglottidem, & invertit, ut Glottidem tegat, dum simul, elisum inter se & postremam palati regionem cibum exprimit, & in patulas fauces projicit; velumque palati simul elevat, & dimovet. Haec Cartilago vitam humanam custodit, atque inversa ostium Laryngis abunde tegit, quia ostio major est; dum posterior, inter Arytaenoideas cartilagines descendens rimula propriis musculis arctatur. Ea pons est, super quem, quae ore adsumta sunt, tuto deferuntur in Gulae ostium. Quare ea indurata, potus in laryngem labitur. BARBETTE apud BONNET. *sepulchr.* II. 31. Uvula vero potulenta ita dirigit ut incidant in cavum, quod cum epiglottide postremum dorsum linguae con-

pre-



## §. LXXI.

Ea (1) actione, quae descripta est §. LXX.

prehendit. Inde illidit in mediam eminentem Epiglottidem, atque ad latera defluendo inter linguam & epiglottidem praeter ostium laryngis, lateraliter in Oesophagum deducitur MERY *Comment. Paris. 1716.* ab init.

[31] *Claudens, in Text. p. 44.* ] Non quod inter deglutendum obturet nares, elevatum a Levatoribus. Id si fieret, recederet a Lingua, aperiret iter adsumtis cibis intra os redituris, relaxaret musculos quam maxime tunc agentes, Thyreopalatinos, Glossoopalatinos. Sed septi instar se habens, elevatum, dum cibos lingua in fauces projici, iter concedit in solas fauces, velatis naribus. Donec in posteriorem faucium sedem deducti per ostium gulae apertum descendant, naribus non incommodi. Paulo post, dum descendunt cibi, incumbendo eos premit in Oesophagum, dum simul reditum in nares prohibet. Quare fissum intra nares admittit cibos. Omnino etiam videtur, in respiratione, quae per solum os fit, claudere nares, forte & in aliquibus litteris enunciandis, modoliberiorem viam ad nares relinquere, modo eam arctare variis modis. Novit certe la HIRE hominem, qui solo voluntatis imperio odores excludebat, elevata uvula *Hist. de l'Acad. des Sc. 1712. Obs. 3.* & vidit LITTRIVS liquida in unam narem infusa redire per utramque *Memoir. 1718. p. 385.* manifesto prohibita a Velo palatino, ne in fauces laberetur. Et tunc agit *Levator* (not. 25.)

[1] Quae ad explicationem §. LXX. dicta sunt,

LXX. cibus ad fauces usque pervenit. Verum fauces nondum apertae sunt: Et si eo tempore, homo rideat, loquatur vel sternutat, cibus aut per os naresque turpiter regurgitabit, aut cum convullivae tussis certo metu,

ea omnino hic oportet repetere: Notas nempe melius ad Textum atque authenticas voces AUCTORIS ordinari posse, quae non minus uberes sint Praelectione: Ea enim multa habuit, expuncta, quod in nupera editione addita sint Textui, multa etiam, quae expunxissemus, nisi menti AUCTORIS publice declaratae omnino viderentur simillima.

[2] *Tum, in Text. p. 45.* ] Ante omnia debet maxilla inferior ad superiora adduci, vi Temporalium, & Masseterum [ LXI. ] ut firmitas sit in mento, quae determinet efficaciam musculorum, Biventris, Mylohyoidei, Geniohyoidei, Genioglossi, imo vero, etiam Hyothyroidei, qui omnes reciproce partes, quibus nectuntur, vel detrahunt ad os hyoides & cartilaginem Thyroideam; vel antrorsum movent, si firmitas menti major sit, quam ut cedat Sternohyoideo, Sternothyroideo, Coracohyideo, & ponderi partium. Quare nulla potest deglutitio fieri, nisi clauso ore, maxillis conjunctis.

[3] *Myloglossi, in Text. p. 45.* ] Diximus [ LXII. not. 21. ] cum ALBINO de musc. p. 233. esse hunc WINSLOWI, VERHEYENI & antiquorum musculum, Mylopharingaei partem. Verum, si vel maxime distinctus esset, Linguam certe non antrorsum traheret,

tu, delabatur in Laryngem. Id ne fiat, magnis praesidiis cavit Natura.

Eo ipso tempore, quo facta sunt priora, (LXX) nascitur vasta cavea, late ad recipiendos cibos se aperiens. Hujus paries anterior fit a Lingua, feriente apice suo extremam

heret, ortus ad radices dentium molarium [SPIGEL. L. IV. c. VI.] sed ad latera, & fere retrorsum.

[4] *Geniohyoidei*, in *Text.* p. 45.] Angustior anteriùs a mento, supra Biventrem, recta retrorsum it; ibique latior, mediae basi nudus, laterali vero fedi baseos, tectus ibi Ceratoglosso, ad cornua usque infigitur. Optime CASSER. l. c.

[5] *Mylohyoidei*, in *Text.* p. 45.] Oriuntur & in dextro, & in sinistro latere maxillae inferioris, fibrae carnae, a mento ad ultimum dentem molarem usque, quae in anteriori sede pene recta concurrunt, ad posteriora magis inclinantur, ut postremae omnium, valide cum Biventre intextae, inserantur in proprias eminentias ossis hyoidis, quae sunt in baseos & anteriori, & superiori sede. Tendinem medium CASSERII *de Lar.* T. I. f. I. EE. & EVSTACHII l. c. nunquam vidi, neque SANTORINUS, aut COWPERUS, cujus optima est icon T. XXVII. f. I. Et possit utique uterque musculus pro unico haberi Azygo. Hi potius videntur linguam sustentare, & concutere, quam vero os hyoides ducere antrorsum, si quidem fibrae ex transverso leniter declinant, & retrorsum incedere dici vix possunt. An determinatur pars postrema consensu

mam oram palati ossi; & Velo palatino, quod nunc cum lingua coniunctum est, vi muscutorum variorum (LXX. *a. β. γ. δ.*) & Isthmo faucium, five arcu utroque (LXX. p. 35.) Posterior paries fit a vertebrae colli, musculis & membranis suis obductis, &  
co-

sensu Biventris? Qui certe in hoc stadio deglutitionis, reliquis potentior, os hyoides valida vi trahit ad anteriora vide LX. not. 2. Idem subpositus glandulis sublingualibus, earumque cum sublingualibus continuationi, utrumque succubit & exprimit.

[6] *Styloceratohyoides*, in Text. p. 45.] Solet *Stylohyoides* vocari, & novum nomen damnat MORGAGNUS *Adv. II. Anim. XIII. p. 31.* licet servari queat, quod ad veritatem anatomicam. Oritur a margine inferiori & anteriori processus styliformis, tendineus, descendit antrorsum, fit carneus, plerumque finditur ad transmittendum Biventrem, aliquando solidus EVST. T. XXXV. & inseritur, post coalitum, & basi ossis hyoidis, & vicinae origini cornu (COWPER T. XXIII. no. 46.) Elevat omnino os hyoides retrorsum, oblique si unus agat, recta linea, si uterque. Quare pertinet ad musculos unientes Linguam Velo palatino (LXX. not. 27.) & Geniohyoidei atque Genioglossi antagonista est, atque linguam, ab illis tractam antrorsum, retrahit. Idem os hyoides, valide antrorsum tractum a prioribus, recta elevat, in hoc stadio, de quo agit PRAECEPTOR.

Aliquando *alius* adcedit *Stylohyoides* quem, inter veteres EVSTACHIUS (T. XLI.



copiosis glandulis lubricatur. Nascitur haec lata cavea, quando Larynx cum ossè hyoide & lingua, valida vi fursum tractus, relaxat omnes adhaesiones pharyngis, atque occurrens cibis assumendis, patulum iis infundibulum offert.

Ne-

XLI. f. V. VIII. XI.) inter recentiores DOUGLASSIUS (C. XII. p. 31.) primi viderunt. Hujus origo ab extremo apice processus styloformis inferius, finis & in triticeum ossiculum, & in vicinum cornu. Vid. COWPER. T. XXII. f. 3. lit. V. Saepius deest, rarius reperitur: si adsit, prioris forcius.

[7] *Thyrohyoidei*, in *Text.* p. 46.] Inferius nequitur lineae asperae eminenti, terminanti oram inferiorem cartilaginis scutiformis (MORG. *Adv.* I. N. I. f. I. lit. r.) e regione & Sternothyroidei, & Cricothyroidei. Recta ascendit, & inseritur basi, & dimidio cornu ossis hyoidis, e regione Cera- toglossi, postquam super membranam superius os hyoides Laryngi nequentem incescit. Si firmata fuerit maxilla inferior, in hoc stadio deglutitionis, elevat cartilaginem Thyroidem, arctat glottidem, inclinat epiglottidem, vocem acutam reddit. SANTORIN. c. VI. §. 7. p. 107. Si laxa sit maxilla inferior, & os hyoides non retentum a viribus contrariis, potest aperire maxillam, os hyoides deducere. Frequentius dicitur Hyothyroideus. Ejus aut aberrans portio: COWPER. T. XXX. f. 1. 1, aut alioquin similis est, qui a basi ossis hyoidis descendit, sparsus in membranaceum velum

Neque hoc solum fit, verum praeterea Cephalo-pharyngaei musculi, male a recentioribus expuncti, Pharyngem sursum levant, membranaceam ejus naturam tendunt. Sic dum sacci, quem pharynx efficit, posterior paries extenditur, ne cedat antrorsum, anterior

velum glandulae Thyroideae, EUSTACH. T. XLI. f. V. VIII. BASS. in *Observ. Anat. Chir.* quod plane eadem in sede, post MORGAGNUM *Adv.* I. T. I. f. I. o. saepissime vidi. Videtur glandulam, mole gravem, sustentare posse, & secretionem forte aliquanto expeditiorem reddere.

[8] *Glottidis, in Text. p. 46.* ] Omnino hoc tempore, & una cum musculis Laryngem elevantibus antrorsum, agunt omnes illi musculi, qui Epiglottidem detrahunt, aut rimam cartilaginibus Arytaenoideis interjectam, arctiorem reddunt: nunquam enim major feralis tussis, & strangulationis, metus.

*Arytaenoides rectus*, validus, transversus, carnosus, a majori parte orae internae cartilaginis Arytaenoideae unius, in eandem sedem cartilaginis conparis abit, adcurate adducens utramque. Hunc solum CASSERIUS T. XIII. *secund. hom.* f. II. III. IV. lit. C. fig. XIII. XIV. XV. XVI, lit. E. f. VII. H. Conf. COWPER. T. XXX. f. I. 65. ALBIN. p. 256.

*Arytaenoides obliqui* duo, raro ita distincti (ut a COWPERO T. XXX. f. V. priori conjungantur. conf, MORG. *Adv.* I. T. II. f. I. lit. K. & ALBIN. p. 255.) a priori, uti quidem pingi solent, (EUSTACH. XLII. f. I. II. SANTORIN. T. III. f. I.)

&

terior paries, uti modo dictum est, deducitur a posteriore. Sed ad latera Pharynx dilatatur, elevantibus eam Stylopharyngaeis, tum iis fibris, quae ab osse multiformi ad Pharyngem veniunt. Imo eae vires, quae nares claudunt, infundibulo Pharyngis aliquid addunt.

Verum

& si distincti, posteriores, (vid MORGAGNI *Adv.* I. p. WINSL. IV. 455. DOUGL. C. XIV. p. 38.) a basi unius cartilaginis Arytaenoideae, ad verticem altius adscendunt, decussati, & sibi, & priori transverso, varie inplexi. Uniunt & ipsi cartilagine.

Horum fasciculus ad Epiglottidis latus excurrit SANTORIN. c. VI. §. XIII. T. 3. f. 1. d. ALBIN. p. 255. &, quantum per vires potest, eam retrorsum inclinatur, ut ostium Laryngis contegat. An huc par WINSLOWIANUM IV. 457? & depressores duo Epiglottidis LITTRII l. c. p. 179. Sed & supremas fibrae Thyro-Arytaenoidei, aliquando ad Epiglottidem, (DOUGL. IV. p. 39. WINSL. 456. ALBIN. p. 260. SANTORIN. l. c. §. XIV. & T. III f. 1. lit. F. & inprimis f. 2. lit. N.] exterius, quam prior fasciculus, adscendunt, quarum vires etiam debiliores esse, certum est. Aliae graciles fibrae SANTORINI C. VI. §. XV. T. III. f. 2. lit. P. vel non adsunt, vel si adsunt, eas vires non habent. quae valentem, atque elatere suo renitentem Cartilaginem inclinare possint; ideo etiam debiliores, quod lateraliter insertae, immobili radici Epiglottidis insigantur

Verum claudendae sunt viae, quae cum incommodo corporis humani, adsumtum cibum potumve in avia deducerent. Sunt eae *Nares & Larynx*. Et nares quidem clauduntur, elevato velo palatino per musculos sphenopalatinos, & sphenopterygopalatinos qui totum mobile palatum sursum actum, ad modum valvulae, meatui narium posteriori obducunt.

Sed

tur. Neque huc censerī debent, fibrae illae elasticae ligamentorum quae efficiunt glottidem veram, a DODARTIO *Mem. de l'Acad.* 1700. p. 340. p. 348. pro musculosis habitae. Namque eae arctant glottidem internam, nos de iis ostiis Laryngis quaerimus, quae in Pharyngem patent. Praecipua vero vis impellens Epiglottidem, & claudens ostium Laryngis, ipsa est lingua, quae dorso suo tumente, dum retrahitur, invertit Epiglottidem.

[9] *Glandulis ejus, in Text. p. 46.*] Quae incumbens dorso Epiglottidis, non modo per exiles poros STENONIS se evacuat, sed per grandes hiatus ipsa ad posteriorem faciem Epiglottidis se penetrat. MORG. *Anv. I. §. III. p. 2.*

[10] *Arytaenoides, in Text. p. 46.*] Visae etiam minores glandulae ad latera cartilaginum Guttalium, in membrana posteriori Ventrīculorum, descendentes ad usque cartilaginem anularem. Caeterum in editione INSTITUTIONUM BOERHAAVIANARUM erratum est, ut litterae *c*, in textu nullus locus assignetur, deinde litterae *d*,  
in



Sed & *Glottis* claudenda est. Quod non motu Epiglottidis perficitur, ut multi putant, quae & erecta, & ad linguam propriis

in textu, respondeat nota *c*, litterae *c*, nota *d*, litterae *f*, nota *e*.

[11] *Pterygoidei*, in *Text*, p. 47.] Non videtur probabile, eos musculos, hoc in stadio moveri, quum id ipsum stadium maxillam firmam requirat, & adductam superiori.

[22] *Stylopharyngaeis*, in *Text*. p. 47.] Socii Thyreopalatinorum: Oritur uterque ab appendice cartilaginea processus styloformis, fit teres, descendit antrorsum, adplicat se Laryngi supra os hyoides, tegitur fibris omnibus ab osse hyoide & cartilaginibus Laryngis provenientibus, atque superius, & exterius accedens Thyreopalatino, similiter, & in membranam Pharyngis, & in ipsam cartilaginem scutiformem inseritur, & late super membranam Laryngis internam spargitur, quod FALLOPIO notum in *Obs. Anat.* ab EUSTACHIO depictum T. XLl. f. V. Vlll. Xl. T. XLll. f. IV. VI. renovatum est a MORGAGNO *Adv. Anat.* I. p. 4. II. p. 35. *Epist. ad Vals.* p. 374. SANTORINO l. c. c. Vll. §. 7. & WINSLOWO occasionem dedit novi musculi *Stylothyroidei* IV. 477. Sed & ossi hyoidei inferi MORGAGNI in *Epist.* l. c. quod non visum SANTORINO, neque nobis, neque alteri anatomico; uti neque ullo vel aliorum experimento, vel nostro confirmatur Cel. WALTHERI singularis observatio, qui *Stylopharyngaeum* solum efficere arcum posteriorem faucium,

priis ligamentis firmata non facile invertitur, neque glottidem claudit, nisi quod ea arceat, quae a radice linguae in Glottidem

& Epiglottidi inferi voluit, *de Deglut.*

§. VI. Elevat Pharyngem, vel ad latera, si alter hujus paris, vel directe, si uterque agat; Elevat etiam cartilagineum scutiformem, & est ex principibus musculis hujus stadii,

Verum cum eo omnino faciunt reliqui Pharyngis musculi, qui superius, quam Lingua, sedem suam fixam habent. Ii, admodum certe dubii, & variis nominibus propositi, sunt, qui sequuntur.

*Salpingopharyngeus* ALBINI III. c. LVII. SANTOR. *Obs. Anat.* c. VII. §. 4. distinctus est, neque cum iis numerandus, qui unum communem membranaceum saccum faciunt. Oritur ab extrema ossea, & incipiente cartilaginea parte Tubae EUSTACHIANAE, carneus, firmissima membrana tendinea (WALTH. *de deglut.* X.) obductus, descendit introrsum, retrorsum, admotus interno lateri Stylopharyngaei, & Pharyngi insertus, eum elevat antrorsum.

Reliqui, & nunc dicendi Pharyngis musculi, unum efficiunt saccum, amplum, membranaceum, sed instratum carneis fibris, qui superius amplior, ad Laryngis initium coarctatur in speciem tubi e terete compressi. Posterior facies musculosa, fere aequabiliter descendit ex processu cuneiformi ossis Occipitis, porro ante vertebrarum corpora, paulatim coarctata.

dem irrepere possent. Verum claudunt Glottidem musculi *ary Arytaenoides*, qui certe rimam eam adeo valide stringunt, ut

Etata. Anterior autem facies & brevior, & multiformis, ab osse petroso, ab hamulo Pterygoideo, & ala interna, & maxillae inferioris margine postremo superiori, a Veli palatini lateribus, a radice Linguae parte postrema, ab osse hyoide: donec jam angustior, & a Larynge seclusus, posteriorque, a ligamento cartilagineo scutiformem nectente cum osse hyoide, & ab ora laterali cartilaginis scutiformis, & a cartilagine anulari fibras habeat, sub ea in tubum diminutus. Fibræ omnes adscendunt, sed superiores magis, inferiores transversis propiores. Fibris omnibus prout a diversa sede oriuntur, recentiores singularia nomina imposuerunt. Posteriores faciem plerique scriptores exhibent, EUST. T. XLII. f. IV. VI. VALSALV. T. V. VII. CANT. T. III. C. WPER. T. XXVIII. f. 2. 3. Anterior, difficillima, inferiori sua parte utique habetur apud EUSTACHIUM T. XLI. f. VIII. XI.

*Cephalopharyngaens*, est fibrarum, a sede media pharyngis retrorsum adscendentium, ultimus vertex, adfixus ossi occipitis ante foramen magnum in medio processu cuneiformi, sive unicam insertionem facias, quia in mucronem conveniunt, uti SANTORIN. C. VII. §. 2. p. 121. sive duos sibi similes musculos, uti reliqui, DOUGL. C. XV. p. 41. CANT.

ut ne aer quidem viam sibi facere possit,  
deinde uvula, vicina Glottidi, trahitur  
pone

T. III. 24. 29. WINSL. IV. 475. Elevat  
omnino Pharyngem, & cum eo os hyo-  
ides, atque Laryngem, uti Stylopharyn-  
gaeus. COWPERUS pene transversum  
facit, non optime.

*Petropharyngaeus*, ab ima & extrema  
sede ossis petrosi, juxta canalem carotidis  
WINSL. IV. 476. non perpetuus.

*Pterygopharyngaeus*, a toto Corniculo  
Pterygoideo interius, a lamina interna  
sursum continuata, ab ipso etiam tendine  
musculi Circumflexi palati, (COWPER.  
ad T. XXVIII. f. 2. 3. L. L. ALB. 232.)  
crassus, retrorsum tendit, ad pharyngem,  
totus brevis. Vidi accessisse aberrantem  
fasciculum a Salpingo-Staphylino. Elevat  
Pharyngem, & antrorsum deducit, dila-  
tatque. Hujus musculi nomen diversissi-  
mis particulis inpositum est. Nos solis  
fibris ab ala & hamulo ortis relinquimus:  
Confer. *Pterygoideos* (lapsu typographi)  
WINSL. IV. 476. *Pterygopharyngaeos*  
DOUGL. p. 42. SANTOR. VII. §. 3. (quod  
originem adtinet), WALTH. p. 23. COW-  
PER T. XXVIII. f. 2. 3. L. L. *Buccinator*  
in ea sede Pharyngi inseritur parte sua po-  
strema, antrorsum dilataturus, conf. AL-  
BIN. c. LVI. p. 232. & c. XVI.

*Mylopharyngaeus*, a lineola aspera ma-  
xillae inferioris, supra Dentes Molares po-  
stremos eminente, latus, CANT. *Impet.*  
*Anat. T. III. 28. 35.* & satis validus ad  
Pha-



pone Epiglottidem efficacia musculi ἀζυγίου  
MOR-

Pharyngem retrorsum tendit, in transitu  
Tonfillas conprimit COWPER. T. XXIX.  
f. 2. M. Pharyngis imam partem adtolliť,  
& totum Pharyngem potenter antrořsum  
trahendo diducit. Nomen a DOUGLAS-  
SIO p. 42. inpositum, renovavit SANTO-  
RINUS C. VII. §. V. Et ad hunc usque  
solet ea linea descendere, quae in medio  
Pharynge ab osse occipitis demissa, media  
conparibus musculis interjacet. Inferius  
non ita conspicua est.

*Glossopharyngaens*, tenuis, & latus, a  
radice linguae ad Pharyngem, transversus  
[COWPER. T. XXVIII. f. 3. N. N.] &  
ultimus Levatorum [VALSALV. T. VI.  
B. B.] si quidem elevet, vel depressorum  
primus [CANT. Imp. T. III. 27. 37. &  
EUST. T. XLII. f. 4.] Pharyngem, poste-  
sterius retentum, antrořsum diducit. Re-  
cte notat SANTORINUS [§. VI. cap.  
VII.] VALSALVAM, quod ei musculo  
Mylopharyngaeum, imo superiorum ali-  
quas fibras conjunxerit [Cap. II. §. XX. p.  
38.]

*Geniopharyngaens*, WINSLOWI (IV. 480.) vi-  
cinus priori, & inferior, retrorsum lenis-  
sime adscendit ad Pharyngem, a Genio-  
glossi parte, quae ossi hyoidi inseritur, te-  
cta Hyoglossis, tenuis & latus. conf.  
ALB. C. LII. LVI. SANTOR. p. 126.

Quare, dum os hyoides & larynx, & infe-  
rior pharynx laryngi obsequens, levantur  
viribus [LXX. not. 2.] simul Pharynx  
iursum tractus a Cephalopharyngaeis,

MORGAGNI (13) & claudit Glottidem, ne ea quae circa Glottidem haerent, in ea inspiratione quae proxime sequeretur, delaberentur in Glottidem. Sunt qui hanc actionem uvulae non admittunt. Sed revera adesse eam, ex consideratione morborum uvulae adparet. Nam uvula fissa aut destructa neque vox laeditur, neque deglutitio, tussis sola in deglutitione molesta hominem excruciat (14), cujus non alia potest ratio esse, nisi quod non omnia ea, quae super Epiglottidem vehuntur, trans Glottidem ferantur in ostium Gulae, sed aliqua eorum portio haereat circa rimam Glottidis, illapsura quam primum homo aërem adtraxerit, & tenerrimam fabricam asperae arteriae irritatura ad Tussim, quae nisi efficax sequatur, de vita ipsa actum est.

Thyreopalatinis [LXX. not. 20.] Salpingopharyngaeis, Petropharyngaeis, Pterygopharyngaeis, & antrorsum a Mylopharyngaeis, Glossopharyngaeis, adducitur circa bolum, eumque recipit. Quod secundum est stadium deglutitionis. Si vero Pharyngis facies posterior non retineatur a Stylopharyngaeo, & Cephalopharyngaeo, possunt utique hi muscoli Pharyngis faciem posteriorem adducere ad anteriorem, sicque fieri, uti ALBINUS vocat, *Constrictores Pharyngis superiores* C. LVI. L. III.

[13] De hoc musculo vide dubia nostra ad §. LXX. not. 13.

[14] Conf. §. LXX. not. 29.

est. Ita factum est in nobili Dano (15), qui dum bolum carnis deglutit, respiciens, & respondere conatus, subito periit: in ejus cadavere, sectione facta, bolus intra Glottidem inventus est.

### §. LXXII.

*Deinde*] Bolus delatus est in fauces (§. LXX. tot.) clausae Nares (LXX. not. 25.) clausa Glottis (LXXI. not. 8.) dilatatus Pharynx, ut quam latissime pateat deglutiendo bolo: Superest, ut per patens Gulae ostium propellatur, quod deglutendum est. Debet ergo coarctari Pharynx. Sed id faciunt muscoli Sternohyoidei (1),  
Ster-

[15] BARTHOLIN. *hist. Anat. Cent. I. no. XI.*  
p. 21.

[1] Oritur, a sterni sede superiori, quae costam primum recipit, & a costa prima [DOUGL. p. 32. ALBIN.] & a claviculae vicina parte [ALBIN. c. XXXIX. MORG. ADV. ANAT. II. *Anim.* XIII. p. 32.] non ergo a solo sterno, uti veteribus & SANT. c. VII. §. XVlll. neque a sola clavicula, quod EUST. T. XXXlll. COWP. n. XLIV. p. 35. placuit. Adscendit subcutaneus, & angustior factus, mediae inferiori orae baseos ossis hyoidis inseritur. Aliquando inscriptiones tendineas habet. MORG. *Adv. I. T. II. f. 1. lit. n. n.* mihi non visas. Detrahit os hyoides, hinc Laryngem, Glottidem aperit; cartilaginem Thyroidem, ante cujus facies anteriores transit, re-

Sternothyroidei (2), Coracohyoidei (3), qui Laryngem detrahunt retrorsum & ad pharyngem ita adprimunt, ut gulam reddat angustiore: cum in primis fibrae a La-

primit ad posteriora, & Pharyngem etiam ea ratione coarctat. Obiter observo, figuras CASSERIANAS ad hunc musculum citatas a BOERHAAVIO esse omnino Sternothyroidei.

[2] Oritur, pone priorem, sed latior, a sterni parte suprema prope costam primam, & ab hac costa, etiam a clavicula subinde [quod & MORGAGNO visum *Adv.* II. c. XIII. p. 31. & WINSL. IV. 446.] adscendit paulum antrorsum, inseritur eminenti exteriori orae cartilaginis scutiformis, e regione Hyothyroidei, [MORG. *Adv.* I. T. I. f. i. q.] ad quem [ALBIN. c. XL. COWP. T. XXX. f. i.] & Thyreopharyngacum, [ALB. ib.] fibras aliquas emittit, mihi etiam visas. CASSERIUS *de Lar.* T. I. f. I. II. III. inscriptiones habet, qualis & ALBINO visa est. Detrahit os hyoides, Pharyngem, cartilaginem Thyroideam, simillimus priori. Uterque etiam Glandulam Thyroideam emulget.

[3] Latiuscula expansione oritur a costa superiori scapulae, juxta foramen pro nervis & vasis supraspinatum & infraspinatum adcuntibus, non a processu coracoideo, qui recentiorum error est, non inputandus VESALIO L. II. c. XVII. neque FALLOPIO *Obs. An.* p. 773. ed. LUGD. BAT. correctus a COWPERO *Myot. ref.* 1694.



rynge ortae & Pharyngem complexae musc-  
 lorum Hyopharyngaeorum (4), Thyreopha-  
 ryn-

p. 74. & MORGAGNIO *Adv.* I. §. 27.  
 p. 36. fit in tendinem, tum ob venam  
 Jugularem, tum a comprimente contra Sca-  
 lenum Sterno-Mastoideo, adplicatus Ster-  
 nohyoidi, & ex obliquo rectus factus  
 MORG. T. I. prope lit. q. juxta cartila-  
 ginem hyoidem repit ad os hyoides, cu-  
 jus & bali & cornu inseritur juxta Sty-  
 lohyoideum, cui quibusdam fibris con-  
 jungitur. ALBIN. L. III. c. XXXVIII.  
 Ob nexum fibrarum cellulofarum, quo  
 coercetur ad latus cartilaginis scutiformis,  
 fere recta videtur detrahare os hyoides, si-  
 millimus adjutor Sternohyoidei. Et qui-  
 dem hi muscoli, cum spinae dorsi propio-  
 res, id est posteriores sint, qua sede ossibus  
 firmantur, ita Laryngem non deorsum so-  
 lum, sed retrorsum trahunt, eaque ratione  
 Pharyngis cavitatem inminuunt COWP.  
 1694. p. 74. *Omohyoideum* maluit voca-  
 re WINSLOWUS, ne errorem pariat ad-  
 mistum nomen processus coracoidei. *Co-*  
*stohyoideum* Galli vulgo dicunt. Prius  
 nomen ad humerum pertinet, posterius  
 barbarum est.

- [4] Oritur aliquando a basi ossis hyoidis [*Basio-*  
*pharyngaeum* WINSL. IV. 419] semper  
 a cornu [COWP. T. XXVIII. f. 30.] po-  
 ne musculum ceratoglossum [*Hyocerato-*  
*pharyngaens* DOUGL. p. 42. & CANT. T.  
 III. p. 13. *Keratopharyngaens major*  
 WINSL. l. c.] tum continuo (SANTOR.) a  
 corniculis (*Chondropharyngaens* DOUGL. p.  
 42. & CANT. p. 13. *Keratopharyngaens*

ryngaeorum (5) Cricopharyngaeorum (6),  
abo-

*minor* WINSL. l. c.) Fibrae supremae longiores adscendunt (EUSTACH. T. XLI. f. VIII. IX. & T. XLII. f. IV.) mediae transversae sunt (id. ib. & omnes COWP. l. c.) imae descendunt leniter. (id. ib.) Magnus est, & Pharyngem, firmato & deorsum tracto osse hyoide, trahit, sicque coarctat. Hunc unum facit VALSALVA c. II. p. 38. distinctis tamen portionibus, & SANTORINUS c. VII. §. 8. ALBINUS *Constrictorem Pharyngis medium* vocat, atque fibras ejus adscendentes non separat a *Cephalopharyngaeo*: consentiente haud obscure MORGAGNO *Adv.* II. *Anim.* XVIII. p. 44. & iconibus ipsis, v. g. CANTIANA.

[5] Oritur ab ima eminentia cartilaginis Scutiformis, quae opponitur Sternothyroideo, & ab omni ora cartilaginis ejusdem, (EUST. T. XLI. f. 8. & COWP. T. XXVIII. f. 3. P.) deinde ex parte superiori bifurcata: & aliquando a ligamento cornua superiora cartilaginis Scutiformis connectente cum osse hyoide (*Syndesmopharyngaeus* DOUGL. p. 42. & WINSL. IV. 481. CANT. *Imp.* T. III. 21. 47. & p. 13.). Fibras colligit, eo rectius adscendentes, quo superiores sunt (WINSL. 482. EUST. T. XLII. f. IV.) & cum fibris paris sui decussatas, nisi quod supremae tendinem Pharyngis contingant. (conf. SANT. c. VII. §. IX.) Accipit tennes lacertos a Sternothyroideo, & aliquando a Cricothyroideo. Pharyngem antrosum ducit ad cartilaginem Scutiformem, detrahit, & arctat.

[6] Oritur a cartilaginis anularis inferiori ora,  
quae

aboleant cavum pharyngis: & velum palatinum, per easdem potentias, communemque sibi cum detracto Larynge Thyreopalatinum, descendat, bolum ante se urgeat deorsum: donec susceptus fibris oesophagum constringentibus, pergat ad ventriculum. Relaxantur ergo omnes vires elevantes Pharyngem, Laryngem, os hyoides, & omnes muscoli, qui prius contrahebantur; sola rima Arytaenoidearum cartilaginum per suos musculos (LXXI. not. 8.) retinetur, ne liquidum per pharyngem transiens, se infinuet.

*Rigescant*] Ne mica panis quidem degluti-  
turi potest, quando satur pane biscocto &  
carne

quae respicit glandulam Thyroideam, valido & crasso lacerto, adscendit introrsum, & retrorsum, & alio fasciculo fibrarum superiori jungit se Thyreopharyngeo, atque fere confunditur [COWP. T. XXVIII. f. 3. Q.] cum conpare decussatus [SANT. c. VII. §. X.]; inferiori vero pene transversim [COWP. 57.] procedens, [quem a superiori remotum *Oesophagaenum* dicit WINSLOW. 484. & SANTORIN. c. VII. §. 18. quod nomen ignoratis fibris superioribus, toti musculo tribuerat VALSALVA p. 40. T. VI. P.] ambit Pharyngem. Hunc & antiqui, & nuper ALBINUS, non dissentiente WINSL. IV. 484. Thyreopharyngaeo conjungunt. Et ille quidem ambos uno nomine vocat *Constrictores Pharyngis inferiores*. Superiori lacerto Pharyngem detrahit ad anteriora, angustiores reddit; inferiori constringit aequabiliter, & quae Oesophago recepta sunt, distinguit ab iis, quae in pharynge haerent, atque detrudit.

carne afflata homo, os saliva, fauces muco exhaust, nisi potu gulam humectet. Nempe tenerrimi sensus membrana, quae fauces & Pharyngem obducit, a sicco, inaequabili, & subaspero cibo laeditur, laeta se constringit, & excludit, quod sibi molestum est (7).

*Perdita*] conf. LXX. not. 29.

*Velo*] in ulceribus venereis ipsum velum palati aliquando rimas agit, quae dilatatae vi impulsorum ciborum, in ipso deglutiendi conamine in nares cibos admittunt foedo spectaculo. Quod malum insanabile est, neque reparari potest adplicata lamina metallica, uti quidem supplere solent erosionem palati ossei (8). Miseri ergo homines, sua manu, reclinato capite, cibos intra fauces imas demittere tenentur, nisi per nares regurgitare malint. BOERHAAVIUS puerum vidit, qui fissa uvula in lucem editus est, neque deglutire poterat. Aperuit os infantis, inspexit, vidit fissuram, iussit nares claudi, dum deglutiret, ita optime cibi descenderunt. Idem loqui didicit, sed naribus externis manibus constrictis.

*Constat*] Conf. LXX not. (9).

*Vil-*

[7] LXIX. not. muco.

[8] CORN. van SOLINGEN *Handgr.* c. XLIII.

[9] Occurrit exemplum a defectu uvulae, & sine dubio veli, apud SALMUTH. *Cent.* III. *Obs.* VI.

[10] Liceat difficillimam actionem paucis verbulis revocare ante oculos legentium, defesos consideratione tot variorum organorum. *Primum stadium* deglutitionis est, cibo-



## §. LXXIII.

*Villosae*] Particula Oesophagi inversa, ut interior fabrica adpareat, & in aqua fluitans, refert exquisitè sericum villosum (sammet). Sed

ciborum iter ad fauces. Id lingua efficit, per Styloglosses, Ceratoglossos, revoluta, vel, ut saepius fit, solum adpressa palato, tota sua longitudine. *Alterum*, receptio in apertum Pharyngem, dum simul os nares & Larynx clauditur. Id fit lingua reducta iisdem viribus, inclinante Epiglottidem, quae simul Epiglottidis vi magna elevante Laryngem, ad firmatam maxillam inferiorem, Biventrium, Geniohyoideorum, Genioglossorum, Stylopharyngaeorum, Thyreopalatinorum, antrorsum inclinata, occurrit Linguae, & repressa, tegit ostium Laryngis. Eademque linguae actione cibus propellitur in cavitatem faucium. Eodem tempore Thyreopalatini, & Glossopalatini, sed hi debilius, detrahunt Velum palati, deorsum urgent cibum, arcent a naribus, & ab ore, ad quod, inter velum palati & linguam, via nulla superest. Et elevatus simul pharynx, tractus & antrorsum & sursum a Cephalo-Salpingo-Petro-Pterygo-Mylo-Glossa-Hyopharyngaeis, occurrit cibus eosque recipit. *Tertium* stadium est, ciborum in Pharyngem receptorum descensus. Eum relaxatis prioribus, praestant detractores Laryngis, Sternohyoideus, Coracohyoideus, Sternothyroideus, Laryngem retrorsum contra Pharyngem urgentes. Deinde successive contrahi

tracti muscoli Pharyngis, Glossopharyngaei, Hyopharyngaei, Thyreopharyngaei, Cricopharyngaei, ex ordine, initio contractionis facto a summis, urgent cibos in Oesophagum, quos semper coërcet velum palati, imminens. Quo in stadio, rimam Arytaenoidarum cartilaginum inprimis claudunt Ary- Arytaenoidei tres. Receptus holus in Oesophagum, vi muscularis tunicae porro propellitur ad Ventriculum.

- [1] *Stomachus, in Text.*] qui *Gula* Latinis & magis recepto nomine, Oesophagus dicitur. Oritur ex contracto Larynge, ad anularem cartilaginem [Cowp. *Myot.* 1724. ad T. XXVIII. f. III. 57. 58.] descendit ad latus sinistrum asperae arteriae [ad dextrum MORG. *Adv. Anat.* I. Tab. I. sed is situs mihi nunquam visus est] ita ut dexterius, mollem ejus defectum [CXCIV] sibi incumbentem habeat, deinde cartilagineam oram sinistram, ultimo, sinisterius, liber fit; ante muscolum longum colli & vertebrarum corpora, sinisterius tamen; cum rectitudine paulatim adsurgit antrorsum, & fere media corpora vertebrarum occupat, donec ad quartam, quintamve vertebram Thoracis, occurrens Aortae, deflectat dextrorsum ad nonam usque, [EUSTACH. T. X. f. I. III. VESAL. L. V. c. III.]; sed mox redeat ad sinistra, atque rectior Diaphragma adtingat, [conf. LXXV. not. 1.] eoque perforato, valde dilatatus [RUYSCH. *Thes.* II. Tab. V. f. I. A. Cowp. *Myot.* 1724. Tab. XXIX. f. IV.] inferatur ventriculo ad angulos pene rectos [EUST. l. c. & VESAL. L. V. f. 14. 15.] proxime dexterius, quam antrum sinistrum, curvissimum Ventriculi.

Sed isti villi non sunt nisi arteriae (2) exhalantes, ceram RUYSCHIANAM vermiculorum instar transmittentes, quales in Ventriculo, atque Intestinis simillimae reperiuntur. Ex iis excernitur liquor salivofus, ad ignem non coagulabilis (2\*). Miscentur his ipsis arteriis papillae nervosae (3) plurimae, ex quibus tenerrimus ille sensus oritur, qui in Oesophago viget (4). Eae in testudine mira longitudine propendent, basin ad os habentes, sine versus ventriculum pendulo. Sensus acerrimus Oesophagi admodum necessarius est. Vidit BOERHAAVIUS puerum, qui rapam ferventem cum ori ingessisset, a matre deprehensus, subito deglutiverat. Ea, cum ad ventriculum pervenisset, subito miserum enecavit.

*Pinguiolem*] Qui medio modo se habet, inter faucium pituitam (5), & linimentum Pulmonum (5\*). Deterfa membrana interna Oesophagi, etiam post mortem, expressione potest semel & iterum emulgeri.

*Glan-*

[2\*] Diversus a muco cryptarum Oesophagi KAAUW. 180. 178.

[2] RUYSCH. *Thef. Anat.* VII. no. XL.

[3] RUYSCH. *Adv. Anat.* Dec. II. n. IX. p. 26. & ex testudine *Thef.* VIII. T. II. f. 4. Has papillas solas, neque aliam villosam tunicam admisit WINSL. IV. *de la poitr.* 161. Sed RUYSCHIO in arte sua fides habenda. Veram villosam VERH. T. XXIII. f. 5.

[4] WILL. *Pharmac. rat.* S. I. c. II. §. II. n. 2.

[5] *Epist.* BOERH. ad RUYSCH. p. 10.

[5\*] KAAUW. l. c. 178.

*Glandulosa*] (6). In qua cryptae creberrimae, mucosae, sive lenticulares folliculi (7) dictae DUVERNEYO, bombycum ovis minores, & ampullae similes, lato orificio patentes intra fistulam Oesophagi, qui liquorem, acceptum ab arteriis, & retentum, per orificia sua in ipso deglutitionis opere exspuunt. Nihil enim deglutire possumus, si lubricum liquidum desit. Ab obstructione earum glandularum, & Scirrho, fit deglutitionis morbus, qui magis magisque invalescit, & crebro BOERHAAVIO curandus obtigit. Deglutiunt facile, sed bolus renuit descendere, & cum dolore & molestia excu-

[6] *Oesophagea, in Text.*] Hanc RUYSCHIUS modo a bronchiali (*de Valv. Lymph. Obs. XX.*) modo & hanc & bronchiale ab eadem Intercoastali (*Epist. VI. Tab. VII. f. 3.*) oriri vidit. Nos frequentissime ex trunco arteriae Aortae, ad octavam vel nonam costam [DRAKE. T. XX. five *App. COWP. ad BIDL. tab. III. n. 30.*] vel duas, quarum altera a bronchiali est. Aliquando plures adsunt HEISTER. *Comp. Anat.* not. 67. Exigua caeterum, aequalis fere spermaticae. Verum ab hac Oesophagaea, exigua pars Oesophagi ramos habet. Superiores Oesophagaeae a Thyroideis superioribus; deinde aliae ab arteria Thyroidea inferiori; infimae omnium ab Arteria Phrenica oriuntur.

[7] Vid. BOERH. *de fabr. Gland.* p. 22. MORGAGN. *Adv. Anat.* III. p. 6. DUVERNEY ap. DU HAMEL *Phil. vet. & nov. Phys.* p. 3. p. 316. PAULI in van HORNE *Micror.* p. 37.



cutitur. Aliquando morbum ejus generis cum RUYSCHIO [7\*] sanavit mercuriali salivatione. Videtur is morbus fieri a calidissimis potulentis quorum usus major est, quam avorum, nostrorum tempore.

*Non spiralibus*] In brutis animalibus, quorum collum pendulum est, ut deglutienda adscendant, gula duplici fibrarum spiralium robusto ordine firmatur, & ea animalia nunquam vomunt, neque potest eorum fabrica humana deglutitio explicari. In homine, cum descendant ad perpendicularum, quaecunque ingeruntur, vi minori deglutitio perficitur, & circulares [8] fibrae suffi-

[7\*] In *Dec. Advers.* I. Erat autem Scirrhus glandulae Dorsalis.

[8] STENONIS *de musc. & Gland.* p. 15. Ex eo reliqui descriptionem imitati sunt. In vitulo marino SANTORIN. c. VII. §. conf. PRYER. *Merycol. ic.* XII. Sed in homine rectae sive longitudinales quidem, omnium consensu, exteriores sunt. VESAL. *de corp. hum.* L. V. c. III. p. 415. ed. LUGD. BAT. RUYSCH. *Thef.* II. T. V. f. 1. COWPER. *Myot. nov.* 1724. T. XXIX. f. 3. WINSL. l. c. 159. SANTORIN. c. VII. §. XX. Addit SANTORINUS, oriri a cartilagine anulari, & inferius omnem oesophagum ambire, superius tantum faciem anteriorem. Interiores, *Transversae* exstant apud VESAL. l. c. MORG. *Adv.* III. p. 4. COWPER. T. XXIX. f. 3. Addit WINSLOW. alias transversas esse, alias, & contrariis quidem ductibus, decussari.

Q

SAN-

sufficiunt. Eas vero fibras, ne quis neget musculares esse, quod palleant. Omnis enim musculus album colorem a se ipso, rubrum a sanguine habet [9]. Neque se passive solum habet oesophagus, aut solum canalem praebet descendentibus fibris, sed valida utique pressione eos detrudit in Ventriculum [9\*]. Agunt vero eae fibrae successive

SANTORINUS vero, prope ortum spirales esse, & in posteriori solum sede adparere, inferius & omnem oesophagum ambire & circulares esse. l. c. § XIX. XX. Est autem Oesophagus & intestinis, & ventriculo, in eodem animale, robustior. Totum hoc carnosum involucrum, a subiecta membrana nervea & villosa, facile separari potest.

[9] INST. MED. CCCC.

[9\*] Inde mors a resolutis gulae musculis TULP. L. I. Obs. 43. STALPART VANDER WIEL *Centur. post Obs.* XXVII.

[10] *Secunda in Text.* Est omnino haec, quae *cellulosa* fit substantia, inflabili, & quando flatum recepit, late per Fauces & Pharyngem ambulante, simillima interiori cellulosae intestinorum (WALTHER. *de deglut.* §. XLIV. conf. ic WILLIS *Pharm. rat.* I. T. VI. E. E.) ipsi VERCELLONO etiam visa [*de Gland. Oesoph.* p. 41.] Collapsa solida est & nervea [conf. WINSL. l. c. 160.] alba, uniformis, in longitudinales sulcos plicata, (WINSL. IV. 160. COWPER. T. XXIX. f. 2.) Integre secedit a muscolari, quasi tubum ex tubo eximeres. In ea sparsae glandulae simplices (VERCELL. l. c.

fivo ordine, & motus incipit a supremis, descendit paulatim ad infimas. Neque quidquam hic facit boli pondus. Gesticulatores enim capiti innixi bibunt, & contra gravitatem propriam potum cogunt adscendere.

*Cellulosa*] Membrana extima est, in qua arteriae & venae decurrunt, ramosque edunt. Nullibi enim liberae arteriae venaeque ambulant, sed revinctae propriis reticulis cellulosis, in quarum folliculis lubricum oleum adfunditur.

*Duae*]

l. c. f. i. §. XXVIII. p. 88.) propriis poris excernentes mucum. Sed & vasa per eam cellulosam fabricam decurrunt, neque diversa est tunica *vasculosa* VERHEYENI [L. I. Tr. III. c. XIV. p. 202. ed. BRUX.] quam a *nervea*, & a *glandulosa*, praestitisset non distinxisse. WILLISIUS aliam nerveam, aliam vasculosam fecit (in icones T. VI.) utramque tamen conjunxit S. I. C. II. n. II.

[II] *Cellulosa, in Text.*] Tenuis, rarae, sparsaeque fibrae, supernatantes musculosae fabricae, in quarum areis, & pinguitudini, & vasorum trunculis suus locus est, omnino ea ratione, qua in Intestinis & Ventriculo se habent §. LXXXI. XCIV. Rami vero minores, adituri villosam, ordinantur in cellulosa secunda (not. 10.) Neque alia datur *Tunica externa*, aequabilis, alba, vera membrana, qualem describunt Scriptores pene omnes (WILLIS l. c. T. IV. A. A. VERHEYEN p. 201. l. c. T. XXIII. f. 4. HEISTER. p. 127. l. c.).

*Duae*] Quas vulgo *Dorsales* (12) vocant VERCELLONUS (13) earum ductus excretorios descripsit, verum post eum haëtenu nemini visi sunt.

## §. LXXIV.

*Longitudinalibus*] Hae dilatant gulam, & adducunt contra ea, quae deglutiri debent, simulque reddunt breviorē.

*Orbicularibus*] Hae gulam constringunt, & deglutienda propellunt, ordinatim contra-

[12] Vidimus defuisse, quod & HEISTERO l. c. p. 213. visum.

[13] Fusissime l. c. p. 59. 60. & liquorem salsum fundere ad perficiendam coctionem ciborum. p. 102. Et ductus quidem aliarum glandularum ad Oesophagum patentes in brutis animalibus viderunt MOINICHEN. ad BARTHOLIN. *Epist.* LVII. Cent. II. MORGAGN. *Adv.* III. p. 5. Dorsalium ductus qui viderit, nemo occurrit. Videntur omnino Oesophago servire. Gastricae vero glandulae a VERCELLONO fusissime descriptae, S. I. §. XII. XIII. pictae a PECHLINO, *de purg.* T. II. f. I. quarum liquorem ad coctionem ciborum facere existimavit, mihi quidem videntur omnino Lymphaticae; quas perpetuo in pinguedine, prope introitum Oesophagi vidi, non semel perreptatas vasis ferosis. PEYER. *de rumin.* L. II. c. II. p. 109.



tractae, ut in suprema parte Oesophagi contractionis fiat initium (1).

§. LXXV.

*Caro*] Oesophagus septi transversi partem non tendineam, sed carneam perforat, ne, si liber esset descensus, regurgitarent cibi, quando ventriculus in inspiratione a septo comprimitur. Eadem enim efficacia, quae Ventriculum deorsum premit, dum aërem adtrahimus, ventriculi ostium, eodem temporis momento comprimit (1).

Ad-

[1] Cum in primis firmior sedes sit, & principium motus, in cartilagine anulari, quae educit primas fibras Oesophagi. SANTOR. C. VII. §. 18. 20.

[2] *Apertum, in Text.*] Quod contra sui aevi Anatomicos, arctius describentes ostium Ventriculi sinistrum, recte evicit VESAL. L. V. c. III. p. 416. Edit. BATAV.

[1] PRAECEPTORIS sententiam, receptam utique a plurimis, pro nova retulavit Cel. WALTHERUS de *Deglut.* §. XV. & de *Oscit.* XLV. p. 30. & apud discipulum in *diff. de Vomitu*, tot. & §. XXXI. Non auctoritatem SENNACI *Mem. de l' Acad.* 1729. p. 170. & ALBINI p. 308. fin. excitabo, licet ea pene Naturae vox sit in ALBINO. Verum si consideremus, superius quidem ex repetitis observationibus, terminari iter Oesophagi tendineo fasciculo (SENNAC. utcumque f. I. ad N.) ad utrumque vero latus, arcuatos, flexos,


Q 3 decus-

Adparet nunc liquido utilitas Oesophagi, & omnium partium corporis humanis quae cum gula connexae sunt. Fauces & Pharynx recipiunt cibos, Oesophagus deducit, musculosae fibrae propellunt, glandulae lubricum succum adfundunt. Morbi Oesophagi vero oriuntur fere vel 1. a tumoribus glandularum adjacentium. Talem vidit in Parotide BOERHAAVIUS, qui omnem omnino deglutitionem interciperet. Alium descripsit RUYSCHIUS a glandulis Dorsalibus, in scirrhosam naturam induratis, qui sola (2) Mercurii potentissima efficacia

decussatos, & bis quidem inplexos (SENAC l. c. P. Q. Q. X.) musculos inferiores adjacere gulae, facile adparebit, agentibus iis musculis, tendinem ad carnes retrorsum deorsumque trahi, arcus vero musculosos, eam diametrum Oesophagi, quae inter dextrum & sinistrum latus est, arctare in rectitudinem se restituendo, omnem ergo diametrum Oesophagi coarctari. Neque tamen negabo Cl. WALTHERO, eadem actione, id cibi, quod est sub septo, in brevissimo spacio, quod supra Ventriculum est, comprimi atque in Ventriculum urgeri posse. Fit vero, & vomitus, & deglutitio, laxato septo, in ea temporis particula, quae inter inspirationem & expirationem est, & vomitum quidem exspiratio aut comitatur, aut sequitur velocissime.

[2] *Advers. Anat.* Dec. I. §. X. p. 24 conf. similia exempla compressi a tumoribus Oesophagi, apud BONNET. *sepulchret.* III. p. 263. & longe pulchriora II. p. 31. 33. 34. 35.

cacia sanari potuit. Vel 11. ab Oesophago coalescente, quando prius, in longis languoribus, omne oleum cellulosa fabricae exhaustum est (2\*). Tunc supprimitur deglutitio, funesto omine, uti per tristia experimenta (3) constat AVCTORI. Si quaeras denique, quare saepe liquida difficilius deglutiantur solidis? respondendum videtur, quod eo tempore muscoli pharyngis utcunque resoluti angustiam in collapsis faucibus faciant, quam bolus cunei instar pariter concidentibus dimovendo aperit. 2. Quare saepe in morbis sola fluida deglutiri possint? quoties nempe inflammatio, vel alia quaecunque in gula angustia est. Confer de his BOHNIVM (3\*).



## ACTIO VENTRICULI IN INGESTA.

### §. LXXVI.

*Actio Ventriculi* (1)] In eo fere peccaverunt, quicumque ciborum concoctionem declar-

[2\*] Ex febre ardente coalitus Oesophagi  
RHOD. *Centur.* 11. obs. 48.

[3] BONNET *sep.* Tom. 11. p. 32. 33. Obs.  
XIV. XVIII.

[3\*] *Progymn.* 1X. sub fin.

[1] Ventriculus ex amplissima sub Oesophago cav-

clarare adgressi sunt, quod unicam de causis, quae plurimae in unam functionem consentiunt, solam tradiderint, exclusis reliquis. Eum errorem ne erremus, considerabimus Ventriculum I. quatenus est vas clausum, calidum, & humidum, cibos recipiens & continens LXXVI. II. quatenus irriguus est humoribus diversae naturae, ad ciborum digestionem facientibus LXXVII. LXXVIII. III. Quatenus musculosa vi contractus, cibos mutat LXXXI. IV. Quatenus experitur vires & pressionem adjacentis arteriae Aortae, Septi transversi, musculorum Abdominis. LXXXVI. Ex omnibus istis, adeo diversis causis, functio Ventriculi perficitur, & debet explicari.

*Clausio*] Sectio vivorum animalium, & ructus post aliquot horas ab ingestione ciborum demonstrant cibos morari in ventriculo. Ergo omnino accidit in ventriculo cibus, quod accideret repositis in vitro puro loco calido cum saliva. Tenuia equidem transeunt, & potulenta, sed solida retinentur.

*Cal-*

vea orbiculari ambitu paulatim extenuatur (RUYSCH. *Thef.* II. T. V. f. I.) in angustiore tubum (EUST. T. X. f. I. II. III.) atque quando modice plenus est, ita ponitur, ut Oesophagi ostium penitus posterius (WINSL. IV. *du bas ventre* 49.) superius juxta ampliorem finem Ventriculi inferatur, Pylorus ex tenuiore Ventriculi termino dexter, & anterior, & inferior se retrorsum consecretat [EUST. T. X. f. 2.

3.)



*Calido*] Calorem facile & Thermometrum demonstrat, & manus ipsa sentit, immiffa spirantis Animalis ventri. Namque fupra fe, propinquum cor, & fibi circumfufum (2) hepar habet, viscera calidiffima, & finiftrum Lienem; Arteria Aorta; vafa Splenica, Mefenterica, Coeliaca, juxta ventriculum incedunt. Perpetuo vapore abdominis incalefcit. Sed calor ille, qui temporem aliquo gradu excedit, in mutandis alimentis eft efficaciffimus. Sub Tropico enim aqua ita putrefcit, ut vapores inflam-

ma-

3.) Facies ampla, aequabiliter tumens & anterior, & fuperior fit; pofferior altera. & inferior, (WINSLOW. l. c. 51. 59.) a lobo hepatis (VESALIUS. L. V. c. III. f. XV. M.) in duo tubera dividatur; Arcus brevior, conjungens lineas oftiorum Ventriculi propiores fere retrorfum respiciat, obverfus hepati, [WINSLOW. CANT. T. V. f. I.] qui vero huic longior obponitur, anterior fit & paulo inferior [EUSTACHIUS. T. X. f. 2.] Siniftro magno tubere Lienem recipit. Pancreas habet pofferior, [EUSTACHIUS. T. X. f. 3.] Hepar & pofferior, & fuperius, & anterior, Peritonaeum pene anterior, & penitus, fi valide flatu diftendatur, quo tempore etiam facies objecta hepati, penitus inferior, & quae anterior fuit, eadem fuperior fit, & curvatura major, cum magnis vafis, Peritonaeum contingit. (WINSLOW. *Mem. de l'Acad. des Scienc.* 1715. p. 317. CANT. l. c.

[2] EUSTACHIUS. T. IX. T. X. f. 2. CHESELDEN. *Anat. of. hum. bod.* T. XIV. BIDLOO. Tab. XXXIII.

mabiles (3) emittat. Verum omne animal calidius est eo aëre, in quo vivit (4), neque potest vivere, si sanguis in eum frigoris gradum deduceretur, qui est ambeuntis atmosphaerae. Nunquam enim aër noster calefcit gradibus 90. qui in vivi animalis sanguine pene perpetui sunt. Quare eo ipso calore, qui sub Tropicis meracissima vina (5), cerevicias optimas, plerumque perdit, eo inquam calore agitantur ea omnia, quae in Ventriculum recepta sunt. Longe minore certe calore, vegetabilia omnia foventur & vegetant. Eum enim N. GREW demonstravit esse circiter 50. 60. graduum. In tabulas nempe congeffit gradus caloris quotidiani per multos annos, medium fuit, quod diximus (5\*).

*Diversitate*] In eo maxime erratum est, a plerisque scriptoribus, quod unicam speciem mutationis consideraverint, quasi vero unicum alimenti genus adlumeremus. Unde factum est, ut alii omnia fermentari (6), alii

[3] STUBBS *Journ. in Philos. Transact.* 27. p. 493.

[4] LXIX. not. 19. & hominem, cujus calor naturalis est 92°, non posse vivere in aëre cujus calor est 90°, pulchre BOERH. *Elem. Chem.* l. 192. 156. Ad gradum 146°. omnia animalia cito pereunt.

[5] STUBBS. l. c.

[5\*] *Anonymus, Phil. trans.* n. 280. Sed numeri debent in BOERHAAVIANOS gradus reduci.

[6] Auctor fermentantis Theoriae HELMONTIUS ex observationibus in avibus factis  
[calor

alii omnia putrescere docerent (7). Dixerat verum uterque, sed non omne verum; neque id quod perpetuo verum est. Namque animalium carnes partesque, & vegetabilium aliqua, putrescunt. Lac & pleraeque plantae, & fructus horaei omnes, acescunt. Verum neque iis credendum est, qui omnem omnino fermentationem Chemicam tollunt. Debuissent certe considerasse, Ventriculum omnino eo gradu calidum esse, & humidum, ut commissâ vasi simillimo, farinae fecalinae uncia, cum aquae quadruplo, necessario acescat; neque liquere, quare Ventriculus ab iis mutationibus liberet ciborum naturam. Atque (8) ad fermentationem omnino referendi tumor Ventriculi, ructus acidi, flatus & tormina, ab usu fructuum

[*calor efficac. non diger.* edit. ELZEVIR. p. 161.] Quem secuti sunt SYLVIVS *Disp. Med.* I. §. 12. cum omni secta, & magno conamine VIRIDETUS *de prima coct.*

[7] LISTERUS, vetusta PLISTONICI, & DIONYSII systemata secutus, [CELS. *de re med. Praef.* p. 6. le CLERC *hist. de la Mèdec.* p. 383.] putrefactionem solam pro causa concoctionis proposuit, de humor. Cap. III. ad XX. Adeo certe suae hypothese addictus, ut acescentiam plantarum ad putrescentiam revocet p. 77. & fermentationem a putredine solo gradu differre adfirmet p. 123. ed. *Amst.* Quanto melius has duas mutationes distinxit, suisque limitibus definivit BOERHAAVIUS *Elem. Chem.* II. p. 161. & p. 292.

[8] Eadem fere §. LXVII. p. 149. *comment.*

horaeorum; cum generatio aëris elastici in fermentatione eorundem fructuum extra Ventriculum observata, evidens omnino causa sit phaenomenorum, intra ventriculum nascentium. Neque tamen perficitur ea fermentatio, cum moram requirat ad minimum quatuor vel quinque dierum, in ventriculo vero nostro cibi vix pluribus, quam sex horis retineantur. Et degenerationes ciborum modo dictas saepe impedit ipsa eorum miscela. Lac aestivo tempore intra duodecimam horam acescit, sanguis putrescit, si libero aëri exponantur. Commista neque putrescunt, neque acescunt, & contrariae degenerationes mutuo se coercent.

*Putrescere* (10) ] Animalium omnis generis carnes, & humores quicunque, solo excepto

[9] *Fermentescere, in Text.* ] Fermentatio & Putrefactio in eo conveniunt, quod sint intestini motus corporum, per quos & aër elasticus, & sales generantur, & destruitur corporum compages. Sed *Fermentatione* generatur alcohol, & sal acidus, ex quo denuo sal alcalinus fixus obtineri potest. [NEWMAN. *Phil. Trans.* p. 392. p. 15. ex succo citri]. Fermentationem concipiunt plantae succulentae, quae non sunt ex classe [not. 12.] plantae leguminosae, fructus horaei, succi expressi stirpium, balsama, &c. vid. *Elem. Chem.* II. p. 169. seqq.

[10] Putredinem vocamus, motum intestinum per quem mutantur corpora, ut leni igne ex iis generetur sal alcalinus volatilis foetens,



pto (11) lacte herbaceo, sibi commissa putrescunt, & putrescunt certe in Ventriculo humano, si vires in ventriculo desint, quae corruptioni resistent. Sed & omnis gens plantarum Tetrapetalarum Siliquosarum (12) putrescit in foetorem cadaverosum, & alcali volatile gignit. Quae apparitiones omnino videntur favere hypothefi PLISTONICE (13).

*Acescentem*] Omnia vegetabilia, paucis exceptis aromaticis herbis & antiscorbuticis, in aëre mediocriter tepido, abeunt in naturam acidam (14.) Dulcis Avena cum aqua blandissima, loco calido fit acerrima. Mustum solo calore fit acidum & rodens.

*Al-*

tens, destructo sale acido & fixo NEUMAN. l. c. p. 14. BOERH. II. LXXXVIII.

[11] Et succis vegetabilium, non mutatis ab animalis natura, melle, formicarum acido.

[12] WEDEL. de sal. vol. plant. C. V. p. 47.

[13] Nam omnino mutationes spontaneae ex putrefactione, propiores sunt mutationibus a concoctione ciborum factis, quam mutationes a fermentatione natae. BOERH. Elem. Chem. II. p. 292.

[14] Sal & ipse, volatilis, [HOMB. Mem. de l'Acad. des Scienc. 1702. p. 48.] acris, saporis singularis, quem dicimus acidum, cum alcalinis salibus, & cum terreis corporibus effervescent, syrupum violarum & coerulea tere omnia rubro colore tingens, ortus ex vegetabilibus, mineralibus, & animalibus, sed ex his parcissime. HOMBERG. Mem. de l'Acad. des Scienc. 1712. p. 13. Dotes acidi vide apud BOERH. Elem. Chem. I. p. 817.

*Alcalescentem*] Quae vergat in naturam salis lixivi (15). Qui est sal acer, ex ignis vinnatus, cum acidis effervescens, syrupum violarum viridi colore tingens, odoris urinosi. Verum sal *alcalinus* duorum generum est. *Fixus* (16) qui paratur ex omni vegetabili, vivo igne exusto in cineres, qui in aqua dant lixivum salem. Ipsa acetofella, adeo acida, exusta cineres dat, ex quorum lixivio, perfectus omni dote sal alcalinus potest obtineri. Alius *Volatilis* (17), qui ex animalium partibus, aut ex plantis prius putrefactis (18), stillat admoto igne. Vapor nempe adscendens, cogitur in crystallos volatiles, ignei saporis, foetidas, urinosas.

*Rancescentem*] Olea, ob copiam suam, aut inertiam ventriculi, sequentia spontaneas suas mutationes, rancescunt, indolem induunt ovi putridi. Si adsumseris butyrum frixum, insolita copia, neque superbiberis potus acidi quod sufficiat, abibit in liquamen acre, putridum; plane simile illi, quod ex butyro, in aëre tepido, haud diligenter adservato, viridescente crusta obducitur, & acerrime

[15] Non omnino *alcalinam*, sal enim alcalinus, ex sola putrefactione, nonnisi multo tempore paratur BOERH. *Elem. Chem.* II. *Proc.* C. neque unquam eas condiciones patitur in corpore humano BOERH. l. c. *Proc.* XCIII. XCIV.

[16] BOERH. l. c. p. 54. n. 9. tot.

[17] BOERH. l. c. II. 368.

[18] Aut *alcalescentibus* (not. 12.) aut quibuscunque, subita, magna vi ignis HOMBERG. *Memoir. de l'Acad. des Scienc.* 1708. p. 406.

rancescit, & degustatum per horam ingratum saporem relinquit. Ex eo liquamine, in ventriculo stagnante, accendunt fuctus, urentes, amarissimi, & regurgitat materia inflammabilis, quam perperam solent Bilem (19) vocare. Similis omnino putredo oritur ex lardo vetere, ovis non recentissimis [20], aut affatim adsumtis, piscibus pinguibus &c. Sed Bilem male vocari, ideo adparet, quod Bilis quidem ignem injecta exstinguat, quem rancida materia alit. Neque facile nascitur in robustis corporibus, & biliosis; facillime in debilibus, hypochondriacis, & quibus Bilis iners est.

*Glutinosam*] Filia trahentem, aquae difficulter miscibilem, qualis plerumque paratur ex animalium pedibus, cute in aqua macerata, tendinibus &c. nomine *glutinis* vel *collae*. Pene similis, minus tamen lenta, ex farinosis, cum exigua aquae copia excoctis, ut acescere non possint.

### §. LXXVII.

*Crusta*] Eadem & continua cum Oesophagi (1) membrana villosa. In fuillo (2) ven-

[19] *Vomere biliosa* frequentissima dictio apud VETERES. Non autem bilem esse, sed corruptos cibos, demonstravit HELMONTIUS, *Pylor. rect.* §. XIII. XXV. p. 111. 183.

[20] BOERH. *Elem. Chem.* II. Pr. CXIII. phaenomena recenset.

[1] RUYSCH. *Advers.* Dec. II. p. 26. WILLIS. P. I. c. II. §. IX. X. Rubicundior, mucosa, tenera, fluctuans, porosa.

[2] PECHLIN. *de purgantibus* c. ult. p. 511. & in

ventriculo facillime separatur, si inversus maceretur in tepida [3].

*Villosa*] Constat vaginulis (4) membranaceis exiguis, quae transmittunt, & ordinant arterias & venulas minutissimas, illas exhalantes, has resorbentes; per quarum utrumque genus, injecta ceracea materia saepe sibi viam facit, in ipsam Ventriculi cavam, deposito tamen colore, quem a cinabari habet, quod experimentum, ante hos 35 annos RUYSCHIO contigit facere (5), repleti accuratissime vasa Ventriculi sua materia ceracea (5†). Per eas ipsas arteriolas vomitus cruentus fit, quando in virginibus menstrua plethora obstructis viis subinde sursum regurgitat (5††).

*Rugosa*] In homine sano & vivo (6); in mortuo, collabentibus omnibus partibus firmis

in T. II. f. 3. communicata a SWAMMERDAMIO.

[3] Fervida, WILLIS. l. c. §. X. Antiquiores WILLISIO, tere pro mucii crusta habuerunt, excepto FALLOPIO.

[4] Vide §. LXXVII. not. 15. Vaginas vero facit *Epithelium* RUYSCHII, quod Epidermididi continuum per Oesophagum ad anum usque descendit, vasa & papillas obducens, & conspicuum maceratione in fervida KAAUW 109.

[5] l. c. THES. VI. §. 33.

(5†) Confer paria experimenta KAAUW. de perspir. 187. & cum aqua 185.

[5††] Vide multas historias congestas apud STALPART. van der WIEL Obs. XVII. Cent. post.

[6] In helluonibus explanari WILLIS l. c. p. 7. &



mis minus conspicua, sed longis, rarisque jugis & vallibus (7) inaequabilis (8). Eae rugae fiunt, qua membrana villosa ventriculi non elastica est. Quo magis vero repletur ventriculus, eo pauciores rugae adparent.

*Madida*] Si aperias vivi canis ventriculum, invenies internam superficiem lubricam esse; & si abstergas, sub manibus mador ex innumeralibus porulis renascetur (9). Id liquidum est ex genere salivae, & ad ignem totum absque residuo avolat (9†).

*Glandulis*] Sive, ut mavult loqui RUY-SCHIVS (10), cryptis, quae sunt lenticulares

& ex eo anorexia BONNET. *sepulchr.* L. III. S. VI. *Obs.* VIII. p. 60. Sed & in Intestinis id visum RUYSCHIO *Mus. Theca B. Reposit.* IV. n. IV.

[7] WILLIS *Pharm. rat.* I. T. IV. f. 1. RUYSCH. *Thef.* II. T. V. f. 2.

[8] Rugarum aliae longitudinem sequuntur, & ad Pylorum omnes, aliae transversae sunt ad priorum decussim WINSL. *du bas ventre* 66.

[9] WEPFER. *de cicut. aquat.* c. VIII. p. 80.

[9†] Non invenio, neque conveniunt quae de intestinorum liquido habentur LXXXXI. not. 10.

[10] Glandulas minimas ventriculi non WILSIUS solum (*Pharm. rat.* §. IX.) Sed & SWAMMERDAMIUS (*Observ. colleg. priv. Amstel.* 1687. p. 26. 27. f. IX.) WEPFER. [*de cicut. aquat.* p. 80. 123.] PEYER. [*Parerg.* p. 68.] FANTON. [*Diff. anat.* III. p. 79. 80.] MORGAGNUS (*Advers.*

R

*Anat.*

lares folliculi, suo tempore, ex latiori ostio  
dimit-

*Anat.* III. p. 6.) SANTORINUS (*Obs. Anat.* p. 165. in pyloro.) confirmarunt. Addidit WINSL. (l. c. 63.) plures prope pylorum esse. Et respondet omnino, non mea solum observatio, atque analogia Intestinatorum, sed & anatome comparata, quae in plerisque animalibus, ventriculos glandulosos demonstrat [MALPIGH. de *gland. conglob. structur.* p. 14. 15. 16.] in castore vero & ciconia, ideam theoreticam glandulae simplicis adprime declarat (WEPFER. E. N. C. Dec. I. Ann. II. Obs. CCLII.) Quare non videtur recte fecisse RUYSCHIVS, quod exosus glandularum nomen, Ventriculo eas denegaverit, atque alias rugas dixerit (*Thes. Anat.* X. n. CXLII.) alias penicillos vasorum [*Epist. ad BOERH.* p. 57. & *Thes.* II. Aff. III. n. XIV. *Thes.* IV. no. XCII. VI. n. 33.] Sunt nempe verae cryptae, sive folliculi, quales neque ipse negat reperiri. Conf. BOERHAAV. *Epist. ad RUYSCH.* p. II.

[11] *Variis, in Text.*] Ut quae majores & frequentiores sint ad pylorum, in reliquo ventriculo rariores [WINSL. l. c. SANTORIN. l. c.] De glandulis Gastricis hic sermo non est. v. LXXIII. not. 8.

[12] *Vasculosa, in Text.*] Est eadem omnino cum membrana nervea WILLIS. l. c. §. IX. -- XIII. [v. LXXIII. not. 7.] firmior & quasi fundamentum villosae, quam introrsum emittit: exterius vasorum ramulos & glandulas fulcit WINSL. l. c. 74. atque ordinat, & pinguedinis globulos, quos  
non

dimittentes mucum, quo cavea ventriculi madescit.

*Epigastrica* (13) ] In plerisque visceribus una est arteria & uno loco suum viscus adit. In ventriculo vero quatuor diversae arteriae

non infrequenter vidi; leviter musculosae fabricae per cellulosas fibras cohaerens; ipsa vero in cellulosam abit adaëto flatu, ut evanescat omnis ejus firmitas, & nervea facies. Ut omnino eadem membrana sit, quam scriptores *Vasculosam*, *Glandulosam*, *Nervosam*, WILLIS l. c. & *Cellulosam secundam* vocant. Experimentum facile fit, ventriculo inverso, & inflato; sic enim aër se insinuat per abscissi Omenti sedem, ubi nulla est membrana extima, & valorum itinera sequens, nerveam omnem in spongiosum, laxumque habitum reformat. Conf. in intestinis LXXXXII. & WINSLOW. l. c. 63. 64.

[13] *Epigastrica*] Vox non est recepta, LOWERUS ita vocasse videtur arteriam Gastricam, de qua non video, quare eam faciat *tertium truncum Coeliacae*.

[14] *Aliis, in Text.*] Omnino haec verior est historia arteriarum Ventriculi. Arteria *Coeliaca* proxime supra *Mesentericam*, (EUST. T. XXVII. f. II. IV. quae solae mihi videntur commendationem mereri) ex *Aorta* prodit, arcum facit antrorsum, deinde retrorsum flexa, secedit in duos ramos. *Splenica* juxta pancreas, transversa, posterior ad *Lienem* abit.

Ex ea, non longe ab origine arteria

arteriae totidem diversis locis ventriculum  
adeunt. Ratio peculiaris fabricae videtur,  
ne

*Coronaria vel Gastrica superior* VESAL.  
L. III. p. 217. X. quae ad insertionem  
Oesophagi adiens Ventriculum, partim  
finisterior finitur (EUST. l. c. f. IV. 24.-  
15. VESAL. l. c. z.) ambiens Oesopha-  
gum, partim spacium ostiis Ventriculi in-  
terjectum emetitur, [EUST. f. utraque]  
Aliquando ex ipso trunco Coeliacae prod-  
it, quae tunc quasi tripes adparet,  
[WINSLOW. III. des Arter. 178.] Alias  
ex Coeliacae trunco priusquam dividatur.  
id. 173. & ita in aliquot continuis cada-  
veribus nuper vidi.

Deinde, ubi jam Lienem adit, reflexa  
juxta finem sedem Lienis, e regione ra-  
morum Lienalium, dat ad partem Ven-  
triculi incurvam, sinistram ampliorem,  
plurimos ramos, sive *Vasa brevia Arterio-  
sa* [EUST. f. II. & IV. VESAL. l. c. z.  
L. V. f. XIV. XV. g.]; quae cum Gastri-  
ca sinistra, & Gastro-Epiploica sinistra  
frequenter conjunguntur. Sed ipse trun-  
cus arteriae Lienalis, ex ima sede, ubi  
cum omento ingreditur Lienem, reflexus,  
EUST. l. c. sequitur omenti ex Ventriculo  
originem, & ramos ad Ventriculum qui-  
dem dat ad tertiam fere partem longitudi-  
nis (breviorem EUST. f. IV. recte longio-  
rem VES. l. c. E.), alios multos exhibens  
Omento. Est *Gastro-Epiploica sinistra*.

Truncus autem dexter arteriae Coelia-  
cae, ipse quidem ad hepar tendit, sed ra-  
mo non modico pone Duodenum se  
subdu-



ne ventriculo distento unica arteria facile conprimatur, & circulus turbetur.

*Ve-*

subducens; sit *Gastro-Epiploica dextra*, EUST. l. c. 15-20. & 40-12. VESAL. l. c., quae duas tertias partes originis omenti ex ventriculo legit, donec, prope sinistram sui nominis, finem faciat EUST. l. c. f. IV. & VESAL. ubique; aliquando continuitate canalis [EUST. l. c. f. II. LEONCENA *Ph. Trans.* 280.] ipsi inserta; ad Omentum & Colon frequentes ramos dans. Sed ex hac *Gastro-Epiploica*, dum pone intestinum duodenum se recondit, ramus adit Duodeni ortum, longe hoc observans, non sine ramis, qui ad Ventriculum redeant WINSL. l. c. 186. Et ex trunco hepatico, *Coronaria dextra* VESAL. L. III. fin. p. 247. Lit. p. L. V. f. 4. n. f. XV. a. non magna, per curvaturam minorem tendens ad Coronariam sinistram, inque eam frequenter terminata, WINSL. l. c. 72. Ramuli a Mammaria interna & Diaphragmaticis, aut a splenicae trunco repente per pancreas. SPIGEL. L. V. T. I. exigui sunt WINSL. l. c. 76.

[15] *Singulari, in Text.* ] Ordinantur arteriae in ramos majores, inter membranam extremam & carneam: deinde trunculi perforant carneam membranam, & per nervosam distribuuntur in ramulos minutissimos, qui recedentes ultimo a nervea, producuntur in cylindrulos. In fasciculos globosos penicillosve uniri vult RUY-SCHIUS *Thef.* II. ed. lat. p. 19. 20. Sed

*Venis* (16) ] Earum aliquae etiam a vena  
*caeca*

eos non vidi, non in ipsis RUYSCHII, aut ALBINI praeparationibus. Hae cylindri aquam, aut ceraceam materiam, non difficulter effundunt in cavitatem Ventriculi; RUYSCH. *Thef.* VI. no. 33. &c. Et si refriguerit materia, adparent vaginularum cylindricarum specie, ex quibus minimus vermiculus liber eminet, ipsa nempe cerae massula KAAUW. 186. 187. Quae omnia in intestinis pulchrius adparent.

- [16] Venae in universum sequuntur arteriarum iter. Origo ita se habet. *Gastrica* sive *Coronaria superior* a splenico ramo venae Portarum, EUST. l. c. f. II. IV. VES. L. III. c. V. p. 262. N. Saepe postquam Arteriam comitata est, continua fit Pyloricae, & inseritur trunco Venae portarum, quod post EUSTACHIUM, l. c. f. IV. mihi visum est. *Gastro-Epiploica Sinistra* (EUST. l. c. VESAL. l. c. Z.) ex splenico ramo similiter, atque arteria, *Gastro-Epiploica dextra*, quae plerumque cum Duodena EUST. f. IV. 15-20. communem truncum habet, WINSLOW. L. III. *des Vein.* 239. modo ex venae Portarum trunco (VESAL. l. c. H.) modo ex vena Mesenterica [EUST. f. II. IV. WINSLOW. l. c. 243. 244. 245.] principe ramo venae Portarum. Sed & *Coronaria dextra* ex trunco Venae Portarum [D. & VES. l. c. L. V. f. 4. n.] aliquando inseritur Gastricae superiori. EUST. l. c. f. IV. & WINSLOW. 238. Porro ex splenica

cava (16†) proveniunt, & eodem modo, uti arteriae solent, liquorem ceraceum in cavitationem ventriculi perpluunt; manifesto indicio, fieri in ventriculo resorptionem optimi, & spirituosissimi alimenti.

*Nervis*] Omnino innumerabiles oriuntur ex pare vago (17), misto cum intercostali nervo

ca rami *breves*, comites arteriarum, & denique alii, quos ex trunco Venae splenicæ ortos absque compare arteria, pingit VESAL. L. III. l. c. D. & L. VI. f. XV. b.

[16†] De ea vena nihil mihi occurrit. Vasa a vena cava ad Intestina proposuit RUYCHIIUS conf. INSTIT. MED. XCII. not. 6. de ventriculo ignorabam similem esse ejus Opinionem.

[17] Paris vagi, dato pneumonico plexu, trunci adcedunt Oesophago, & adhaerent, uniuntur inter se variis locis, faciuntque truncos non dextrum adeo & sinistrum, quam anteriorem, & posteriorem. Quorum anterior, & sinister WINSL. NERV. 136. plexum circa Oesophagum faciens, (SPIGEL. L. VIII. T. IV.) magna parte sui Plexui semilunari inseritur (WINSL. l. c. VIEUSS. p. 204. lit. 25.) Posterior, dexter, plexum inter ostia cum compare facit, & ultimus trans duodenum in hepar transit (VESAL. L. V. f. XV. X. VIEUSS. l. c. 60. VESALIUS vero dextrum anteriorem, sinistrum posteriorem facit. Vastissimi sunt, & singulari modo eximie per ventriculum tenentur.

nervo (18), & hujus semilunari plexu (19). Horum alii in fibras musculosas terminantur (20). Alii abeunt in papillas varias, rotundas, aut pyramidales, quae passim in crusta villosa occurrunt. Alii, post miros plexus in nervea tunica factos, evanescunt, in eam nerveam lanuginem, quae cum vasculis villosam crustam efficit. An hujus nervosae crustae is finis praecipuus, ut per patulos ultimos ramos spiritus in ventriculi caveam effundant? Id demonstrare nunc non

[18] Lienari plexu, qui cum stomachico sinistro communicat. VESAL. L. V. c. III. & ramuli ad Pylorum ex plexu hepatico. VIEUSS. 59. Videtur tamen potius Vagus inferi plexui Lienari, quam vero Lienaris dare Ventriculo: Conf. iconem VIEUSS. descriptionem WINSL. l. c. 141.

[19] v. not. 17. & WINSL. 140. Etiam hi rami videntur potius migrare ad Ganglion semilunare, quam ab eo provenire. Et VIEUSSENIUS *plexum stomachicum* a situ dixit non a nervis quos in ventriculum emittat.

[20] Procul dubio magna pars nervorum. Neque enim trunci villosam adeunt: sed rami plerique inter extimam & carneam distribuuntur.

[21] Aliae orbiculares, aliae oblongae, in ove magis, quam in homine conspicuae RUYSCH. *Advers. Anat.* p. 26. III. p. 33. 34. Verum memini Ill. ALBINUM has papillas habere pro villis venosis, albis, dum arteriosi, foli repleti, rubent.



non possumus (22): adparebit vero aliquando (23), omnes nervos finire, modo in sentientes Papillas, modo in membranas, modo in musculosas fibras; in coecos saccos nunquam terminari. Eas papillas RYVSCHIVS in postremis demum praeparationibus ostendit. Possunt vero etiam per experimenta confirmari. Vinum emeticum paratur ex vino rubro quod in vitro Antimonii per noctem stetit. Illius vim non detegit lingua, neque nasus, & secure ingeritur. Sed in ventriculo protinus papillas irritat, & vomitum ciet. Venena etiam Ventriculus accurate discernit, unde WEPFERVS accurate adnotavit, phaenomena mirabilia fieri a cicuta, dum in ventriculo retinetur, & statim desinere, postquam ventriculus liberatus est (23†). Et ab ea sensilitate factum est, ut aliqui in ventriculo animam habitare putaverint.

• *Pellucidum*] Quod conspicitur, quando ex jejuni hominis ventriculo regurgitat, non absque ingrato aliquo sensu. Vocant *das Hertz - Wasser*, totus limpidus est, & lacrumae simillimus. Quando deest, fervor in ventriculo oritur, sanandus blandis oleosis.

*Spu-*

[22] Conjectura fuit olim PEYERI de *Gland. Intest.* p. 20. & 68. de *rumin.* p. 100. multis argumentis confirmatur a BRUNNERO de *Pancr.* C. V. VI. p. 92. seqq. de *Gland. Duodeni* C. IV.

[23] INST. MED. CCLXXXII. CCLXXXIII.

[23†] De *cicut. aquat.* c. VIII.

*Spumofum*] Quae vomitu rejiciuntur, tenacissimas spumas agunt.

*Subtilissimum*] Subtilem esse liquorem ventriculi, ex eo conjectura fieri potest, quod vasa ipsa tenerrima sint, & materiem ceraceam absque colore transmittant (24), in Ventriculum. Copiosum adfundi, ex vi proxima validissimae Aortae aestimari potest.

*Salsum*] Homo sanus, qui tepida vomitum sibi movit, &, peracto vomitu, denovo ingurgitat, in liquore excreto nihil aliud nisi leniter submuriaticum (25) saporem deprehendet.

*Voracissimus*] Cosmus III. (26) magnus Hetruriae dux, ex vivario, ubi animalia rariora copiose alebat, Academicis suis secanda dedit voracissima animalia Falcones & Aquilas, vultures & cygnos. Eorum Ventriculi post longam aliquot dierum inedia aperti, ne aliquid retinerent adsumtorum ciborum, praesentibus MALPIGHIO, BORELLO [27], REDO, FINCH, STENONIS,

[24] In intestinis experimentum frequens est. cont. INST. MED. §. XCII.

[25] BRUNNER. *de Pancr.* p. 91. E. N. C. Dec. III. *Ann.* I. p. 124.

[26] Annon potius FERDINANDUS II. Cosmi Pater, Patronus Academiae Cimentinae? vid. dedic. *Saggi d' Esperienze.*

[27] In piscibus voracissimis liquidum ventriculi sapere oleum olivarum, in Falcone habere aliquid de dulcedine lactis BORELL. apud

NIS, expectantibus acerrimum aliquem & erodentem liquorem, exhibuerunt blandum, salis marini sapore, liquidum, cum tamen aquilae non bibant, & tantum cibi una vice ingerant, absque ulla comminutione, ut per aliquot dies omnino non appetant, quia alimentum ex gula perpetuo adfluit. Et id nulla rodendi vi praeditum esse, demonstrant, quae in ventriculis eorum animalium reperiuntur, quorum superficies nunquam erosa reperitur, uti reperirentur, si dissolutio ciborum ab aliquo liquore dissolvente fieret, qui adfinis foret aquis stygiis (27†).

*Alcalinum*] Sal alcalinus purus, & evolutus,

apud MALPIGHIIUM in *posthum.* p. 31. 32. insipidum in Struthiocamelo VALISNERI *Notomia d' un Struzzo.* Sed & Viperae venenum, quod acerrimum omnes inexperti aestimarent merito, dulce est, & innoxium, REDI *de viper.* p. 163. &c. Et in Ventriculo Camelorum, aqua diu incorrupta servatur, atque eam aquam Nigritae, si quando situ premuntur, per desertum iter facientes, absque noxa rescisso ventre animalis, potitant, LABAT. *It. Afr. occid.* I. 299.

[27†] REDI *Experim. natural.* p. III. arabicos nempe typos nondum fuisse deletos, in nummis quos ex Barbaria secum struthio adtulerat. Caeterum RHEDUS propior est sententiae fermentorum, atque observat globulos vitreos qui comminuti fuerint in avium ventriculis, prius exiguo foramine pertusos fuisse p. 103.

lutus, nemini visus est in corpore humano, & si adesset, citam finem faceret vitae: Nullus in sanguine est, in Bile nullus, longe certe minus expectandus, ab aquoso Ventriculi liquido. Sed cibi possunt in Ventriculo putrescere, uti in aere libero solent, & quidem citius, quia calor ventriculi majore est calore aeris.

*Acidum*] Chemici, post HELMONTIVM (29), omnes putaverunt, in Ventriculo

(28) *Elem. Chem.* BOERH. II. p. 348. VIRIDETUS aquam, decoctam cum Ventriculis variorum animalium, vidit, deturbare solutionem Mercurii sublimati, & lacteam reddere *de prim. coct. l. c. X.* Sed ex assumptis difficulter a Ventriculo penitus detergendis, ea apparentia explicatur, neque rubor perpetuus est testis dominantis acidi NEUMAN. *Miscell. Berol. Cont. III.* Imo in cuniculo, animale herbivoro, succus ventriculi quasi piperatus BRUNNER. *de Gland. Duod. c. V.*

(29) Vide systema HELMONTII in *Tract. de digest. sextupl. §. XI. XIV. p. 168.* SYLVIVS callide satis eandem thesin docuit, ita ut plura discipulis tradiderit, quam quidem scripta reliquerit. Quaerebat autem, spirituum acidum, cujus ope digestio fieret (*Dissert. II. 6. 24.*) in saliva (*p. 24. §. 36.*) & longe magis in succo Pancreatico (*Diss. X. p. 50. §. 37. 40.*) VIRIDETUS novis experimentis acidum propugnavit (*de prim. coct. l. c. XI. XII.*) & experimentis in omni genere animalium,



liquorem adeste acidum, qui cibos in fermentationem fuscitet, vitali charactere impraegnet, dissolvat, concoquat. Sed re-repugnant gravissimae rationes. I. Nemo mortalium succum Ventriculi, in ullo animale, vidit acidum. II. Omnes humores corporis humani, blandi sunt, vehunt salem enixum, similem Ammoniacali, & si quidem ad alterutram classem debent referri, ad alcalinum (30) potius vergentem. Ipse HELMONTIUS (31), acidum in venis non ad esse agnoscit, atque si adfit, facere Pleuritidem. Quare, si arteria Coeliaca continet salem blandum, muriaticum, si eundem vehunt rami ejus per ventriculum dispersi; nullo exemplo declarari potest, quomodo ex sale alcalescente, subita metamorphosi (32), acidum fermentum fercerna-

lium, piscibus etiam carnivoris, confirmari dicit,, Ventriculos eorum succum heliotropii rubedine tingere. Repetantur experimenta, aut concedatur utique, haec animalia ex iis animalibus, quibus vescuntur, acidas particulas non omnes posse superare.

(30) Qui copiose ex nostris humoribus igne vel putredine obtinetur. BOERH. II. *Proc.* CXIX. Acidus vero, aut paucissimus, aut nullus.

(31) *Pleura furens* §. XIV. XV. XVI. XVII. XIX. P. 319. 320.

(32) Cujus nullum exemplum habetur. Acidi enim sales in alcalinos plerique mutantur, alcalini nunquam in acidos.

cernatur. Argumentum HELMONTII (33), quod acidum ex ore passeris exhalans manifesto perceperit, id certe nihil demonstrat, nisi panem, quo passer nutritus fuit, acescere in aviculae ventriculo, quod eo citius fit, quia calor intensus in ventriculo corruptionem acidam adjuvat. Inde fit, ut debilibus falsa muriaticā, v. g. haleces, saluberrima esse possint.

*Acrem*] Monachi, post religiosa jejunia viginti quatuor horarum (34), percipiunt putidum animae odorem, & dolorem corrodentem. Omnes autem humores animales sibi relictī fiunt acerrimi, & idem contingit homini post longiorem inedia, unde in urbibus obsessis, ex difficultate annonae, febres malignae oriri solent (34\*). In Struthiocamelo (35) visi sunt nummi cuprei,

(33) *Calor efficienter non digerit* §. 23. p. 164.  
*Imago fermenti* §. 23. 24. 25. 26. 27. p. 93. cont. *sextupl. digestio* §. 12. p. 168.

[34] TSCHIRNHAUS. *medic. corpor.* p. 23. LISTER. *de humoribus* C. XII. p. 118. 119.

[34\*] Triste exemplum LEIDA praebet, quam pestis haud paulo crudelius, quam Hispani, propugnabit.

[35] PARISINI in *dissectionibus animalium*, p. 173. Edit. PARIS. & ex iis PERRAULT. *Mecanique des animaux* p. 429. edit. LUGD. BAT. Sed erosos omnino nummos in ventriculo struthionis VALISNERI *Notomia d' un Struzzo Oper. omn.* Vol. I. p. 242. & poris pertusa vitra p.

cuprei, in viride aeris mutati. Ubi tamen non est, cur accules acidum: eadem enim in cupro mutatio, solo humido aëre obtineri potest, & salibus lenissimis.

*Folliculis*] Sunt verissimae glandulae simplices. Nempe arteriolae ex arteria Coeliaca ortae, ultimis suis ramulis fiunt in id, quod RUYSCHIIUS vocavit penicillos. Sunt autem omnino membranae, depressae, lenticulares, quae liquidum accipiunt instillatum ab arteriis, quae folliculum coronant, & ita retinent, ut mora lentior fiat, motu peristaltico aucto exprimendus per ampliuscula ostia folliculorum (36).

*Rugas*] Est nempe reliquis membranis Ventriculi amplior (37), & cum tota mollis

243. eadem VIRIDET. l. c. Cap. XIII.; atque nummorum pondus minutum, & in tesseris, ligneos clavos ebori adfixos, non laesos, ebur circumdatum erosum MARTINUS noster *hist. de l' Acad. des Scienc.* 1732. n. 3. & *Comm. Litt. Nor.* 1731. p. 323.

[36] BOERH. *de Fabr. Gland.* ad RUYSCH. p. 11. vid. not. 10.

[37] Longitudo superior tunicae villosae unciarum 13. inferior, unciarum 39. Longitudo tunicae carnea superior 12. uncia, inferior 24. WEPFER. *de Cicut. aquat.* p. 121. 122. Sed & nervea subit rugas, earumque medium quasi nucleum efficit WINSLOW. l. c. 66. ut quae sit inseparabile fundamentum villosae membranae.

lis sit, atque elatere destituta, in rugas collabitur. Experimentum in promptu est. Ventriculus humanus invertitur, gula vinculo constringitur, & per pylorum urgetur aër intra ventriculum inversum; admissus expandet tunicam carneam, & rugae in villosa, quae nunc extima facta est, plannae omnino fient: Evacuato aëre, eadem membrana denuo collabetur in rugas, & juga efficiet. Rugae vero semper spacia aliqua retinent vacua, quae nulla ventriculi contractio penitus abolere potest.

*Remoras*] In ruminantibus magis [38] conspicuae sunt cellulae quadrangulares [39], aut quinquangulares, & dentata juga secundi Ventriculi retinent, quod ore adsumtum est. In corpore humano debet semi-concoctus cibus pene simili ratione inter juga moram pati, adservari. Hae rugae faciunt, ut ventriculus nunquam integre eva-

[38] Verum neque in homine defunt cellulae quadrangulares, brevissimae quidem & tenerae, sed exiguas molculas alimentorum nihilo segnius moraturae RUYSC. THES. II. lat. p. 20 T. V. f. 3. 4. THES. X. n. CXLII. CXLIII. Eas SANTORINUS non vidit, *Observ. Anat.* IX. §. VI. neque mihi liquet.

[39] PEYER *Merycol.* Ic. VI. PERRAULT *Mecan. des anim.* T. XIV. f. I. p. 434. & in camelo longe capacissimi sacci. *Dissect. des anim.* p. 80. du Dromedaire. Verum & laminae triplicis seriei in Omaso huc faciunt PERRAULT. l. c. & T. XIV. f. 3.



evacuari possit, sed retineat inter rugas aliquid cibi, qui acris fiat mora, & ad edendum stimulet. Acria enim, uti notum est, appetitum augent.

*Fermentationis*] Cibi stagnantes & retenti inter plicas, moram faciunt, & mutantur ex suo ingenio, acriores fiunt, acescunt (4), fracescunt variis modis.

*Contritum*] Ventriculus, si aequabili ambitu caveam contineret, premeret, quae adsumpta sunt, non autem contereret. Sed iuga sunt mollia, flaccida, in cavea ventriculi pendula (41), ea agitata a carnea fabrica debent inter se adteri, confricari, solvere id omne, quod medium jugis intercipitur. Si vero cibus non adsit, qui se jugis interponat, laedentur adfricta iuga, & papillae nerveae moleste adficientur; eum sensum *Famem* vocant. (42).

*Ingluvies*] Omne genus anserinum, galinaceum, aliaeque aves granivorae (43), qua-

f. 3. & folia inclinata in Abomaso, id. ib.

f. 4. Mora nempe eo major requiritur, quo cibus durior est, & difficilius subigitur.

[40] Lac coagulatum in ventriculo vitulorum, fit potens fermentum, quo separatur caseus a lacte.

[41] HECQUET *de la trituration*. p. 409. 410.

[42] Antimonialia medicamenta vulnera cutis exsiccant, eadem vomitum movent, subverso Ventriculo, WEPFER *de cicuta aquat.* p. 83. Ergo ventriculus acutius sentit, quam nuda & vulnerata cutis.

[43] Cum carnivorae unicum & mollem ventri-

rum magnus numerus est, dentibus carent, & solis vivunt feminibus plantarum, duplici cortice vestitis, quarum farina vitam sustentant. Quare admirabili artificio ventriculus earum factus est. In collo, supra sternum, Oesophagus dilatatur in bulbum (44), turgidum salivalibus glandulis, quae ad adsumpta grana emollientem liquorem adfundunt; in eo utriculo semina morantur, emolliuntur, macerantur, friabilia fiunt. Tum demum, infra diaphragma protruduntur in abdomen, ubi loco Ventriculi (45), mollis & membranacei, duo paria musculorum (46) subire coguntur: Quae elliptica, rimam

culum nactae sint. vid. *Diff. des Anim.* p. 143. in aquila &c. similes lacertis, piscibus, serpentibus BRUNNER. *de Pancr.* C. IV. & Phocae apud PARISINOS p. 95.

[44] Ingluvies a WEPFERO in ciconia exquisite descripta exstat EPH. NAT. CUR. DEC. I. ANN. II. *Obs.* CCLI. in scholiis. conf. in columba GREWIUM *comp. anat. of the guts* T. XXVIII. Verus est ventriculus humano similis, in quo triplex musculosum involucrum, & glandulae agminatae, fistulosae, in superius ostium effundentes liquorem leniter viscosum.

[45] Praeterea, supra ventriculum, glandulae in annulos dispositae ex membrana muscosa ventriculi descendunt perforatis apicibus. PEYER. *Ventric. Gallin.* p. 62. Conf. in otide f. Tarda PARISINOS p. 153.

[46] PEYER. l. c. p. 59. 60. 61. PERRAULT. l. c. T. XIII. p. 428. GREW. *Comp. Anat. of the guts* T. XXIX.

mam intercipiunt angustam, obducta interiorius membrana callosa (47), & effractura etiam resistantia corpora actione sua, quae dentium molarium (48) efficaciam aemulatur. Habent ergo hae aves separata organa, quae in corpore humano in unam machinam conjunguntur. Nos enim & macerantem salivam, & conterentem efficaciam musculorum, in eodem Ventriculo unitas habemus. Aves alio in ventriculo cibum suum emolliunt, & humectant, alio conterunt; cum, absque musculis validissimis, grana sua conterere non possint, ea vero valida vis non admittat interjectam membranam villosam, quae succum emollientem generet. Itaque in columbis solemus fabas & vicias, in ingluvie quidem friabiles & erosas invenire; in ventriculo vero, conminutas in materiam pultaceam.

## §. LXXVIII.

*Salivam*] Humor salivalis, peregrinus Ventriculo, & quasi advena, est ex praecipuis (1), quibus ciborum concoctio perficitur. Ponderus salivae, una die secretae, aestimatum est fere duodecim unciis (2); eam

[47] Sulcis transversis exsculpta aspera scuta, pene cartilaginea PEYER l. c.

[48] Veros dentes in ventriculo habet genus cancrinum WILLIS. de *anim. brut.* T. III. f. I.

[1] Solus STAHLIO *Theor. Med.* p. 470

[2] NVCK *sialograph.* p. 30. interdum fere ad ho-



omnem salivam homines bene morati deglutire solent. BOERHAAVIUS in se ipso observavit, salivam variis quidem anni temporibus, valde variabili copia secerni; alias drachmam intra horam non superare, alias semunciam, vel integras duas uncias aequare, etiam si neque loquela, neque putatione proritetur. Inde fit, ut panis niger, qui absque manducatione subito devoratur, etiam post aliquot horas nihil mutatus revomatur; idem vero, si dentibus prope subigatur, & cum saliva intime misceatur, in album liquorem abeat, chylo simillimum. Sed longe majorem salivae vim secerni, adparet, si, cum ea quae exspui potest, eam numeres, quae cum cibis mista, in ventriculum descendit. Si vero cum glandulis salivam fundentibus conferas magnitudinem ventriculi, amplissimam superficiem tunicae villosae, & arteriarum numerum atque diametros, facile deduces, insignem esse rationem liquoris stomachici (3) ad salivam. Unde fit, ut puellae aliquando crustas panis, & alia exsucca alimenta absque noxa possint digerere, fere absque potu (4), suppeditante liquore ventri-

ram quamlibet drachmas sex, noctu duas exspui observavit. Copia paulo major justo, ob admistum mucum varium, asperae arteriae &c.

[3] Quod a morte adeo facile depluit, ut ad octavam diem mucum ventriculi abstersum repullulare viderit WEPFER. *de Cicut. aquat.* p. 123.

[4] Uti magna pars feminarum parce bibit: & cal-



tricoli, id omne, quod ad macerationem, & dissolutionem requiritur.

*Ærem*] (6) Qui magna copia in ventriculum descendit, inclusus vesiculis salivosis & mucosis. Omnis enim deglutitio cum inspiratione conjuncta est. Et ær quidem praeceedit, propulsus a potu, & non in asperam solum arteriam, sed in oesophagum etiam descendit, cum nihil inpediat. Efficacia vero æris, dicta LXIX. *not. aëre*, in loco calido & clauso longe major est, quam in oris cavea.

*Calorem*] Efficaciam caloris in vase clauso, ad dissolvenda penitus corpora etiam duriora

calcem simul, cretam, amyllum, aut carbones, valide appetunt.

[5] *Oesophago, in Text.*] Hunc verum liquorem digestivum esse, contendit VERCELLONUS de *Gland. Conglobat. Oesoph.* S. II. §. 13. p. 129. seqq. Neque repugnant exempla avium granivorarum, aut Castoris WEPFER. E. N. C. Ann. II. Verum in homine & parvus & viscosus esse videtur. Vid. LXXIII. *not. 13.*

[6] Ab hoc unice omnem ciborum coctionem deducit DRAKE *Anthropol.* p. 84. & diversa paulum ratione LISTER. de *humor.* c. IX. p. 96. Huc omnino referendus est ductus ex vesicula natatoria piscium ductus in Ventriculum (NEEDHAM de *format. foet.* p. 152. T. 7. tot.) cum pisces & voracissimi sint, & ventriculum ab omni fabrica musculari alienissimum habeant. (*Dissect. des Anim.* p. 56. G. H.) & calorem valde modicum.

riora iis omnibus, quibus vescimur, demonstrat machina PAPINIANA [7]. Ita ovum calore 92. vel 93. graduum dissolvitur in putrilaginem, ut per ipsam testam volatiles humores exhalent. Sed idem est calor ventriculi nostri.

*Macerare*] Tenacia corpora trita cum aqua lente & diu, emolliuntur; dum aqua poros corporis macerati subit. Verum eam macerationem apprime praestat ventriculus, ubi liquor diluens abundat [LXXVII. LXXVIII.] & perpetuus, lenis tamen fit adtritum [LXXXI. LXXXVI.] Ita panem durissimum classarii in ventriculo emolliunt, & in bonum chylum mutant.

*Inchoare*] Id evictum contra severiores quosdam Mechanicos [LXXVI not. *diversitate*] Huc referri debet, odor vinosus, & acetosus, qui adeo frequens ex homine vel ex Bove ruminante per fauces adscendit [8]. Huc etiam referri debet tumor ventriculi, qui una alterave hora post adsumptos cibos sequitur: quem aër praecipue facit, expansus calore. Aër enim in poros corporum admissus

[7] Lebes, inclusus duobus lebetibus, ita ut aëris aditus omnis exquisitè impediatur. In eo, intra exiguum tempus ossa, & ipsum ebur in gelatinam emollitur PAPIN *l'art. d'amollir les os* toto Tr. maxime cap. III. quo in primis exemplo ad exponendam coctionem ciborum usus est DRAKE *Anthropogr.* p. 86. &c.

[8] Conf. exemplum insigne apud IOH. FABRUM *Lynceum in not.* ad NARD. ANTON. RECHUM p. 633 2

missus, & a calore agitatus communis in corporibus est auctor rarefactionis. Neque possent aceſcentia alimenta nostra reformari in naturam volatilem, atque alcaliſcentem, niſi intima quaedam in particulis mutatio fieret (9). Quare Adepti fermentationem dixerunt unum de *pistillis* Naturae eſſe. Ea enim ſola in plantis volatile alcohol producit. Verum ea fermentatio, intra prima initia fiſtitur (10), quia & nimia recentis humoris copia adfunditur perpetuo, & inprimis bilis accedit, omni fermentationi inimiciſſima.

*Adaptare*] Cum adpareat ex iis, quae haecenus dicta ſunt, (LXXVIII.) quanta viſ ſalivae aliorumque humorum adfundatur iis, quae ingerimus, adparet haec debere contemperari ad naturam illorum, eorumque naturam induere; certum enim eſt, multo majorem eſſe portionem eorum, quae noſtratia adfunduntur cibo, quam quae cibi ipſius eſt. quod vel ipſa chyli craſſities demonſtrat, cum ſit recenti cremori ſimillimus. Quare in ipſo ventriculo character vitalis incipit inprimi alimento.

### §. LXXIX.

*Neque*] Homines quos aut negocia urgent, aut fames, plerumque cibos parum inan-

[9] LISTER. l. c. paſſim, & p. 61.

[10] Quare ipſe HELMONTIUS adgnovit, diſtinctiſſimam eſſe ab ea fermentatione, per quam chylus generatur *Spir. Vit.* p. 137.

manfos, carnesque pene integras deglutiunt, ita cohaerentes tenacibus fibris, ut a saliva, & gastrico liquido, & calore solo, non expectari possit ea mutatio, quae tamen revera in cibis fieri observatur dissolutis & in chylum colliquescentibus. Optime enim, si valentes fuerint, concoquunt, inque chylum mutant. Debet ergo subesse alia causa, cui tam singularis eventus tribui possit [1].

### §. LXXX.

*Muscularem*] Ita vocamus, partem corporis humani, quae constet fibris contractilibus, ea vi praeditis, ut earum actione extrema partis totius, adcedant ad se mutuo,

- [1] Eae causae tamen, quae in Ventriculo humano in cibos agunt, in aliis animalibus, solae coctionem efficacissimae perficiunt. In ventriculo mustelae fluviatilis, qui membranaceus est, piscem reperit BRUNNERUS, cujus squamae & spinae in liquamen dissolutae contabuerant, ea parte piscis illaesa, quae ventriculum nondum subierat *de Gland. Duod.* p. 103. quod idem in noctua observavit idem BRUNNERUS *de Pancr.* c. IV. p. 86. Neque minus validae sunt mutationes alimentorum, quas in Galeo pisce PARISINI *diff. des anim.* p. 56. in aquila PEYER. *Merycol.* p. 271. in corvo aquatico HELVETIUS *memoir. de l'Acad. des scienc.* 1719. p. 461. observaverunt. conf. LXXVII. not. 35. Ut omnino evictum sit, posse absque trituratione alicujus momenti, durissima & tenacissima alimenta in liquamen resolvi.



atque ex partibus vicinis, in quas terminatae infiguntur, mobilior accedat ad minus mobilem, Perinde est, num eae fibrae laxae sint, num tendineae; num in longitudinem porrectae juxta ossa quibus firman-  
 tur, num circumductae circa cavitatem aliquam; num albido colore exsangues, num rubrae & cruore pictae; Nihil enim aut circularis ambitus, aut color pallidus, demunt de viribus; constat ex efficacia Ventriculi, Intestino-  
 rum, Arteriarum.

## §. LXXXI.

[*Tumque*] Quando Ventriculum recen-  
 tem hominis sani, violenta morte peremti,  
 ligato pyloro, & Oesophago, adaeto flatu le-  
 niter distendimus (1), ad eam magnitudi-  
 nem, ad quam a cibis solet distendi; tum-  
 que suspenfa manu, lente auferimus mem-  
 branam extimam.

Spi-

[1] WILLISIUS jubet inmergere aquae fervidae  
 l. c. §. XIV. p. 8.

[2] *Cellulosa, in Text.*) Ea sede, ubi magna va-  
 sa se ventriculo adplicant, cellulosa fabrica  
 cum iis accedens, interponit se membranae  
 extimae & musculosae: Et in ea haud ra-  
 ro pinguedinem vidi. Verum non ambit  
 universum Ventriculum, brevis omnino,  
 uti in Intestinis, & majori ex parte mem-  
 brana carnea exterior, adhaeret involucro  
 a Peritonaco, absque ulla intercedente alia  
 fabrica. conf. WINSL. 61.

[3] *Fibris*] Harum descriptio WILLISIANA,  
 S 5 nisi

nisi omnino fallor, non debet pro exemplare proponi; deinde ordo stratorum in sermone BOERHAAVIANO invertitur.

Est ergo fibrarum carnearum, sive *musculosae* tunicae, stratum *primum* fibrarum ab ipso Oesophago, per omnem ambitum ventriculi, ad pylorum usque sequentium Ventriculi longitudinem. Hae tenues, & debiles. WILLIS. l. c. T. II. WEPFER. *de cic. aquat.* p. 121. WINSLOW. l. c. 56. 57.

Eas in pyloro adhaerere ad externam tunicam duobus ligamentis tendinosis, ad finibus illis quae in Colo sunt, HELVETIUS observat *Mem. de l' Acad. des Scienc.* 1719. p. 446. & T. XXII. f. I. F. F. & WINSL. 61.

Deinde ex orbicularibus fibris Oesophagi ultimo ingressum gulae ambeuntibus instar sphincteris (HELVETIUS l. c. f. 2. B. B. WEPFER. l. c. FALLOP.) fibrae propagantur, crassae, & validissimae; quarum aliae intervallum orificiorum recto decursu sequuntur, & proferuntur in pylorum (WINSL. 57. WILL. T. V. B. B. WEPFER. l. c. FALLOP. *Obs. Anat.* ed. 1606. p. 94) aliae oblique deorsum se conjiciunt per utrumque planum Ventriculi (HELVET. l. c. D. E. WINSL. 60. WEPFER. l. c.), laxis, sed crassioribus lacertis, male depictae continuae a WILL. T. V. F. F. conf. FALLOP. l. c.

Intimae vero fibrae, *strati secundi*, & proximae tunicae nerveae, ambeunt Ventriculum, ad ejus longitudinem perpendiculares, circellis, quorum minimi sunt in extremo magnoque sacco sinistro ventriculi,

*Spirali*] (4) Oriundae a superiori ostio, descendunt ad inferius, & spirali incessu ambeunt ventriculum, cavum arctant cibosque conprimunt, neque simul agunt omnes, sed ordine successivo, initio facto ad Oesophagum. Hoc WEPFER in vivis canibus vidit (5), qui non ruminant, sed ventriculum habent humani similem.

*Ad-*

tricoli, (HELV. f. 1. 2. C. C. WINSL. 59.) alii circuli concentrici prioribus, augentur eundo, donec obliquis circellis & intervalla ostiorum & omnem ventriculum ambeant. HELV. G. G. G. WINSL. 58. WILL. T. III. WEPFER. p. 122. FALLOP. Has, cum laxae sint, & areolas relinquunt, aliae vagae, & varie intertextae conjungunt & continent WEPFER. l. c. p. 87.

Inter eas fibras, primae *rectae*, continent fere reliquas, & debiliter Ventriculum breviorum faciunt. Quae *orificiis interiacent*, duplici fasciculo Oesophagum claudunt, pylorum ad Oesophagum adducunt, ipsumque coarctant. Quae vero ex iis *oblique descendunt* ad planum Ventriculi utrumque, retrorsum ducunt cibos, atque morantur. Ultimo *transversae*, initio motus facto ab ultimo sacco finisteriori, successive propellunt alimenta in pylorum.

[4] Quae etiam sententia est SANTORINI *Obs. Anat. c. IX. §. VI.* sed videntur potius esse circuli oblique se decussantes. HELVET. p. 447.

[5] *De cicut. aquat. p. 87.* Sed optime huc facit

*Adducentes*] Fibrae hae prioribus fere vigetibus robustiores sunt, sed stratum efficiunt vix 4. digitorum latitudine. In ventriculo cadaveris adparent separatae, laxae, ea facie ac si diffilissent, sed non eadem earum in vivis est fabrica. Vesica (6) urinaria, adeo tenuis, in vivo homine aliquando se ad nucis juglandis magnitudinem contrahit. In homine ventriculus vix pugno major est. Decurrunt a sinistro orificio, ad dextrum, & utrumque ambiunt, crassis & muscularibus fibris. Hae simul agunt omnes, & longitudinem ventriculi inminuunt, ostia ejus ad se invicem adducunt, atque coarctant. Hae fibrae omnes incipiunt agere, quando ventriculus modice plenus est, neque prius agunt. Contrahuntur eo potentius, quo ventriculus validius distenditur (7); hinc summe repletus, non evacuatur, sed cum mirifico cruciatu distentus persistat, ad mortem usque, vel ad

cit experimentum RUDBEKII *Obs. post Tr. de vas. serof.* XX. p. 332. ed. HEMSTERHVS. & PITTII *Phil. Transf.* 243.

[6] Sed & ipse ventriculus in violenter peremittis, admodum angustus, intestino vix crassior invenitur. SANTORIN. §. VI. c. IX. cui simile est exemplum PAWII *obs. anat.* 4. sed in homine colico. Idem in colo saepissime mihi visum est. Dum frigescit, intumescere ventriculum vidit WEPFER. l. c. p. 142.

[7] INST. MED. LXXXV. adjuvantibus fibris, quae a fasciculo recto oblique deflectunt. not. 3. §. LXXXI.



ad paralyfin fibrarum, de quibus agimus. Hae imprimis fibrae id praestant boni in digerendis cibis, ut cibi in ventriculo aliquamdiu adserventur, & moram agere cogantur. Ubi robore deficiunt, tunc cibi nullam mutationem passi, neque ventriculi vires experti, velociter transeunt, & fit Lienteria.

## §. LXXXII.

*Cellulosa*] Investit totum omnino corpus, omnesque musculos, & omnem sedem, ubi vel acre aliquod habitat, vel partes supra se invicem adteruntur. Constat innumeris folliculis (1), qui recipiunt pinguitudinem ex arteriarum ultimis ramis, atque adservant, & per universum corpus ita communicant inter se invicem, ut hydropicus tumor pedis, vinculis se paucis latim

- [1] Fibrae & laminulae albae, cum modico renixu dilatabiles, & cum tenacitate tenerae, intrlicantur, in loculos sive cellulas, infinitis modis figuris suis ludentes, non clausas, sed in vicinas, suiique similes cellulas varie patentes, in quas vel pinguedo effunditur, vel aqua. Sequuntur in omni corpore humano vasa, & nervos, atque ex vasis facillime impulsam aquam aut mercurium vivum recipiunt, eadem ratione, qua pinguitudo secreta a vasis in eas effunditur. Conf. WINSL. III. 67. & a BERGEN. in progr. propr. Francof. ad Viadr. 1733.

latim excipientibus, ad caput promoveri queat, & homo, cui corpus universum ex anasarca intumuerat, cum hyberno tempore, ad focum obdormiscens, pedem ambussisset, sanatus sit, effluente aqua quasi integris fitulis effusa [2]. Sed & flatus ab una particula corporis humani ad omnes ambulat, qua ratione torosiores [3] boves fingere solent Laniones, insufflando, experimento in fraudem emtorum cedente. Hujus membranae pars *adiposa* [4] dicta est, in-  
tegu-

[2] SCHULZE apud SCHENK. *observ. med.* p. 438. Ex scarificatione pedis liberatus hydropicus EPH. NAT. CUR. Dec. II. ann. IX. n°. CLVIII. & frequentissima est operatio apud AEGYPTIOS. vid. PROSP. ALPIN. *de Medic. Aegypt.* L. III. c. XIII. p. 102. quam ante tristissimum fatum in se ipso expertus esse dicitur BOERHAAVIUS. Ex abscessu scroti EPH. NAT. CUR. Dec. II. Ann. VIII. Obs. LXX.

[3] Propriam dissertationem de hoc artificio edidit MAUCHARTUS, EPH. NAT. CUR. Cent. I. II. Obs. XII. p. 52. confer DRACIUM & LISTERUM *de humoribus* p. 171. In camelis idem patrari TAVERN. *voy. de Perse.* L. II. c. XI. Huc emphysemata, ubi flatus ex uno vulnere, se per Corpus universum diffundit LITTRE *Mem. de l' Acad. des sc.* 1713. p. 13. &c.

[4] Quae pro tegumento corporis humani omnium consensu habita est. Vid. CASP. BAVHIN. *Theatr. Anat.* L. I. c. IV. p. 19.

tegumentis corpus omne obvolventibus subiecta; Sed alia tenuior ambit musculos minores, & musculorum membranas, & tunicae *cellulosae* nomine donata est ab inventore RYVSCHIO [5]. Utilitates corpori humano praestat quam plurimas. Fibras musculares lubrico oleo obungit [6]; cavet ne muscoli cum suis membranis coalescant, adtritum mollit &c. Quare ea membrana per gangraenas amissa, immobilitas sequitur (7). Quando vero pinguitudinis nimia copia in cellulas effusa stagnat, alio modo nocet, & motus musculares segniores efficit (8), quod obeforum nimis certum experimentum est.

## §. LXXXIII.

[5] Certe ante WINSLOWVM, anno 1691. tenuium Intestinatorum cellulofam fabricam depinxit *Catal. rar.* p. 146. f. 1. In scroto fere anno 1694. *Epist. Anat.* I. p. 8. T. I. f. 3. & in universo corpore anno 1698. *Thes. Anat.* III. no. 79. Verum ante cum MALPIGHIVS cum de omento scriberet, plurima de hac tunica cellulosa, ejus vasis, oleo, fabrica, utilia reliquit. Conf. DOUGL. *de perit.* §. 8. seqq. BOERH. *praef. ad Aphrodis.* p. 19. &c. & INST. MED. CCCCXVI.

[6] INST. MED. CCCCXVI.

[7] In aurifabro, cum ex gangraena cruris secessissent flaccidae & corruptae membranae ad cellulofam pertinentes immobilitas cruris post sanationem BOERHAAV. *Prael. ad Aphor. pract.* CCCXXX.

[8] DIONYSIVS Heracleae Tyrannus ad eam obe-

## §. LXXXIII.

*Non potentes*] Est in musculis limes aliquis contractionis, intra quem se colligere non possunt. In Ventriculo, is est limes, ut

obesitatem pervenit, ut acubus infixis amici eum excitaverint. PHOTIUS in *Bibliotheca* p. 269. AELIANUS in *var. lection.* IX. c. 13.

[9] *Externa, in Text.*] Oesophagus late adhaeret EUST. T. X. f. 1. peritoneao, dum per septum transversum transit, & ea se de peritoneum se super Ventriculum expandit DOUGL. de *Periton.* 27. imo vero fibrosis nexibus ita cohaeret septo, ut WEPFERVS de *cicut.* p. 83. fibras ipsas rectas ventriculi ibi adnecti viderit; WINSLOWVS vero, in privatis lectionibus, carnosos fasciculos a septo ad Oesophagum propagatos, quos neque SENNAC. *Mem. de l' Acad. des scienc.* 1729. vidit, neque ego. Praeterea omentum majus & minus exteriori membranae ventriculi manifestissime continuantur. confer CCCXXX.

[10] *Vasculosa, in Text.*] Ea vasa, quae WILLI-SIVS delineavit, videntur referenda ad cellulofam primam. Peritoneum enim, & quae ex Peritoneao oriuntur, tenuissima vascula habent.

[11] *Fibrosa, in Text.*] Fibrae hae sunt strati primi Ventriculi LXXXI. not. 3. Caeterum uti Peritoneum, ita & haec ejus propago firma est. Ea laesa, musculosa tunica aërem non coërcet, sed aut intumescit, aut crepat.



ut quatuor vel quinque uncias (1) liquidi in cavo suo retineat Venter, quas contractione sua non potest expellere, & in cadavere, utcunque collapsus, uncias quinque admittit absque distentione, quae quidem oculos adficiat. Deinde fibrae circulares, insertae nullibi, nunquam ita se contrahere possunt, ut cavum, quod intercipiunt, nullum fiat; demonstravit theorema BERNOULLIUS (2). Quare adparet, ventri-

[1] Experimentum non invenio. WALAEVS etiam ad duas uncias se constringere *Epist.* post BARTHOL. *Anat.* p. 263. WEPFER. ad duas uncias contractum observavit p. 199. ita ut absque distentione uncias octo reciperet. Ego in homine, qui per summum frigus, & fame quidem, dicebatur periisse, penitus vacuum vidi. conf. LXXXI. not. 6.

[2] Pater, fibrae contractionem maximam intra  $\frac{2}{3}$  totius definivit [*de motu musc.* XV. p. 21.] quod exscripsit KEIL. *Tent. de motu musc.* sub fin. p. 210. ed. BAT. Filius, in musculo recto oculi non excedere  $\frac{2}{11}$  longitudinis. *Act. Petrop. Vol. I. p.* 304. 305. ex quo habetur imminutio areae circuli cujusvis ventriculum secantis, ab 121. ad 81. sive ad  $\frac{2}{3}$ . Sed certum est per experimenta, anum, pharyngem integre; arterias, Vesicam

● T

uri-

triculum tum demum cibos posse conprimere, quando plus quinque unciis continet, non posse, quamprimum cibi minus est, quam quod spacium repleat, capax quinque unciarum aquae. Vti chorda non incipit se contrahere, nisi quando ex naturali sua longitudine distracta est, desinit autem, neque contrahitur, quamprimum in naturalem longitudinem rediit. Nunquam ergo evacuatur Ventriculus, nunquam parietem adplicat parieti obposito. Sed quaecunque diminutio in amplitudine ejus ultra eum terminum fit, ea debetur diaphragmati, & musculis abdominis. Si ventriculum iussu aere repleatis, & ad ignem etiam admoveatis, quo potentius expandatur, deinde vulneretis, exhibit aer contracto ventriculo, nunquam tamen omnis, neque vacuum relinquet. Idemque fiet si aqua potius, quam aere, ventriculum repleveritis, profiliet enim ad primam ventriculi contractionem, sed non unquam emanabit omnis. Et adparet, efficaciam Ventriculi non ad solam triturationem referri posse: uti

urinariam, Intestina maximam partem suae caveae abolere. An quod modica contractio, repetita in fibris polygoni infinitilaterali, maximam imminutionem efficiat, quae sententia est PITCARN. *in praef.* & in lit. ad PITCARNIVM p. 256. Sed & Ventriculus integre constrictus fuit viribus spasmodorum observante WEPFERO. p. 162. &c. & WINSL. IV. 55.

[2] *Arctata, in Text.*] In ostio superiori ventriculi,

uti quidem magnis viris nimis facile persuasum tuit. Cani, vel porco, eadem est fabrica Ventriculi, quae in homine est: exhibita sunt animalibus istis quae vomitum moverent: observatum curiose, qua ratione auctus motus peristalticus ventriculum modo constringat in farcimen, modo educat, modo contrahat in brevitatem, & ora adducat; nunquam tamen Ventriculus integre

culi rugae crassiores coronae speciem efficiunt, qua coarctatur ingressus Oesophagi [VESAL. L. XV. f. 16. lit. h. WINSLOW. l. c. p. 67.] & praeter ea efficacia fasciculi, qui orificiis interjicitur, clauditur. Pylorus vero anulum habet prominentem, similem osculo uteri, quem fibrarum carnearum robustus fasciculus, cum nervea & villosa membrana efficit WINSL. l. c. 69. 70. 71. notatus olim VESALIO l. c. lit. K. & bene descriptus a WEPFERO *de cic. aquat.* p. 122. etiam extrinsecus adparens [EUST. T. X. f. III.] qui ficcatus membranae tenuis speciem induit, qualis est figura HEISTERI *Comp. Anat.* f. 6. Exquisite claudi Pylorum, experimentis conpertum est, PEYERI ap. WEPFER. l. c. p. 287. & in EPHEM. NAT. CUR. Dec. II. Ann. I. *Obs.* LXXXV. p. 200. ubi abscisso leporis pyloro, nihil ex ventriculo visum est effluxisse.

[4] *Valide, in Text.*] Quod in vivorum animalium sectionibus adparet, GALEN. de *Facult. Natur.* III. cap. IV. WEPFER. in-

tegre exinanitus est. Deberet ergo cibi quantum unciiis quinque minus est, nunquam coctionem experiri; sed id experimento repugnans, pugnat,

numeris locis, etiam in *μεγαλη κοιλια* ruminantium l. c. p. 89. ventriculo ex corpore reseceto, p. 177. 179. 253. 297. Imo vero vomitum, discisso septo transverso. solius ventriculi viribus factum vidit l. c. p. 221. Est tamen in intestinis utique conspectu facilior.

[5] *Atterunt, in Text.* ] Inter juga eminentia membranae villosae super se invicem confricata: Quorum equidem proprium motum, dictum HECQUETO *de la tritur.* p. 409. vix admittimus.

[6] *Versus, in Text.* . Incipit contrahi Ventriculus ad ostium sinisterius, dum reliqua dexterior sedes laxa est, deinde ex ordine contrahuntur partes paulo dexteriores, ultimus omnium Pylorus, qui ubi cibum expulit, jam idem ordo redit ex integro. Pulcherrime WEPFER. l. c. p. 177. conf. LXXXI. not. 4.

[7] *Sinum, in Text.* ] *Antrum pylori*, dictum WILLISIO, l. c. §. XIX. T. II. a G. ad D. WEPFERO. l. c. 121. 122. & aliis, quam particulam, ita distinctam, ut nomen mereatur, non vidi: aliquando tamen adesse WINSL. l. c. 49. Figurae WILLISIANAE nihil habent simile *antro*, nihil quod a mea observatione recedat, quod Ventriculus a liene ex ortu pene conico dilatetur ad ingressum oesophagi, & paulo ultra, tum vero ex maxima amplitudine lente gracilescens, versus dexterrimam sedem

ar-



pugnat, quo modicas gustationes felicissime coqui docemur. Et si homo debilissimus unciam unam cibi omni hora adsumat, optime digeret, cum tamen nulla tunc sit musculosae fabricae functio. Omnino vero videtur, ventriculum agere debiliter, quando parum ciborum continet, validissime, si semiplenus fuerit, nihil denique, quando nimia plenitudine distenditur. Inde a moderata cibatione suo tempore fames redit, a repletionem inmodica appetitus per aliquot saepe dies frangitur, putrescentibus cibis, qui diuturnam in ventriculo moram patiuntur.

*Vio-*

arcus majoris, valide retroflectatur & adscendat, dum arcus minor & ipse dextrorsum & retrorsum flectitur, hacque ratione ventriculus sensim in naturam angustiorum arctatur, absque ullo sinu intermedio.

[8] *Omnino, in Text.* ] Magis in vacuo, minus in pleno: Conter icones CANT. *Imp. Anat.* T. V. f. 1. & EUSTACH. T. 10. f. 2. quae sunt ventriculi repleti, cum reliquis figuris anatomicorum.

[9] *Complicante, in Text.* ] In vacuo validissime, ut a pyloro adscendente Duodenum subito descendat retrorsum EUSTACH. T. X. f. 3. ad angulum acutissimum. In pleno ventriculo is angulus augetur.

[10] *Recepti, in Text.* ] Imo vero anulus ex ventriculo versus Duodenum educitur infundibuli specie WINSL. 71. quod non respondet ideae PRAECEPTORIS. Figura EUSTACHII, quae hic citatur, exterius de-

## §. LXXXIV.

*Violentiori*] Struthiocamelus, & aliae graviorae aves, vitra devorata intra ventriculos ita confringunt, ut & strepitus (1) possit auribus percipi, & anguli (2) diffracti

signat sedem anuli, naturam internam non exponit.

[11] *Clausum, in Text*] In motu peristaltico naturali nullus metus est regurgitationis in Oesophagum, *not. 6.* hujus. In eo motu, qui alternat cum naturali, contrario modo, clauditur Oesophagus, & a fibris decussatis LXXXI *not. 3.* & ab adscensu ad perpendiculum, & ab osculi rugis LXXXIII. *not. 3.*

[12] *Cineream in Text.*] HELVETIUS l.c. p.454. cum in Duodeno alba sit.

[1] In falconibus & aquilis diu jejunantibus HARVEY. *de gener. anim. Exercit. VII.* p. 27. ed. *Amst.* Quod eo singularius videtur, cum eae aves ventriculum habeant tenuem, humano similem PARISIN. *Disssect. des Anlm.* p. 143. HARDER. *apiar. Obs.* XVI.

[2] In Gallinis HELMONT. *calor effc. non diger.* §. XXII. p. 163. In minutissimum vero pollinem & lacteum liquorem comminutas crysallos habent CIMENTINI CCLXVIII. CCLXIX. ed. *Flor.* paucis horis, si cavi fuerint globuli, sed cum tempore etiam solidi REDI *Observ. natur.* p. 102. ossicula olivarum, nucum avellanarum, pistaciarum effracta a Gallis Indicis BORELL. *de mot. anim.* II. c. XVI. *Prop.* CXCI. p. 289. nummos expolitos, in superficie convexa

Et vitri obtusi fuerint, absque magno detrimento avium. Namque Struthiocamelus caret ingluvie (3), sed ventriculum habet armatum musculis robustissimis, & ferramenta lapidesque ingerit (4), ut durissima corpora adtrita cum alimentis, velocius ista conminuant. Fabulosa vero fama est, quod ferro pascatur (5).

*Similem*] Magni Viri crediderunt (6), easdem

vexa PARISINI in *Diff. Struthionis*, & WARREN. *Philos. Transact.* 394. p. 119. Ad quae multa, si addas VALISNERII in primis vitra erosa, nummosque sulcatos in Ventriculo Struthiocameli l. p. 243. utramque vim conjungi adparebit.

[3] Ingluviem habet omnino, eamque aliquando conjunctam Ventriculo, ut in observatione VALISNERII, alias sub eodem, ita ut resurgat ex ingluvie Oesophagus in Ventriculum (Acad. PARISINI, RANBY *Phil. Trans.* 386. & WARREN. *Phil. Trans.* 394.)

[4] Et Gallinae de industria lapillos eligunt asperos, quorum adtritius major sit: glabris non utuntur HARVEY. l. c. atque melius digerere quae plures lapillos deglutiant SAGGI d'ESPER. p. 268.

[5] Vetustam opinionem renovavit BORELLUS de mot. anim. Part. II. Prop. CXIV. p. 292. contra quem vide VALISNERIUM. Certe mortem Struthiocamelini nimiae nummorum & lapidum voratorum copiae tribuunt PARISINI & RANBYUS, l. c.

[6] ERASISTRATUS apud CELSUM, & deinde

dem omnino vires esse adtritum in homine, quas in avibus observaverant (7). Debuerant considerasse, in homine fabricam diver-

de PITCARNIUS (*de modo quo cibi in Ventric.*) HECQUETUS (*de la trituration*) neque alienus est ab ea opinione MORGAGNUS.

- [7] BORELLUS vim Ventriculi Galli Indici aestimaverat ad 1350. *Ib. Prop. CXCI. L. II.* tanti nempe, quanti est vis mandibularum, ubi per errorem maxillae caninae vires, pro viribus humanae Mandibulae, & 1350. l. pro 534. posita sunt. PITCARNIUS, ex pondere musculi flectentis pollicem, ejusque vi absoluta, conficit pro ventriculo humano vim 1295. librar. Ubi certe pondus ventriculi nimium est, octo unciarum, quod drachmis octodecim aestimavit BARTHOLINUS, *Anat. ref. p. 73.* deinde Ventriculi pars longe minima musculus est, maximum enim pondus villosa tunica, & nervea, & adeps efficiunt; tandem falsum est, muscutorum vires esse in *ratione ponderum*. Debuerat meminisse, hominem neque officula nucum avellandarum, neque pisa non manducata, neque varum denique membranulas (KERKRING. *Spicil. Obs. VI. p. 19.*) subigere posse, quae viribus paucularum unciarum pressae crepant: Atque, si ullus est in homine alicujus momenti adtritum, (audio vero hominem fuisse, qui lapillos asperos deglutitos, egestos, devoratos denuo, tandem poliverit,†) referri omnino debet non ad vires adeo Ventriculi, quam eas, quae dicuntur §. LXXXVI,



versissimam esse, non ergo posse eosdem effectus sperari. Homini tenues musculosae fibrae sunt, tunica villosa tenerrima; Avibus carnosus, validissimus musculus, scuta quae ad se invicem teruntur, cartilaginea, callosa.

### §. LXXXV.

*Evacuantur*] Quia fasciculus fibrarum restarum, ora ventriculi conjungens LXXXI. not. 3. flaccidus manet, namque eae fibrae de-

[8] *Brutorum, in Text.*] Non equidem aequant vires Piscium, aut Avium. Foenum, quo Boves vescuntur, robustiores utique homine, in abomaso fibrosam fabricam retinet, in eo mutatum, quod exsuccum sit PEYER. *de rumin.* p. 184. Canis ossa digerit, sed emolliendo: namque postquam triduum in ventriculo macerata fuerant, cartilaginea invenit WALAEUS ap. BARTH. p. 764. utique non a tritu, sed a vi emolliente, qualis est in machina Papiniana; incocta vero & nihil mutata egeffit canis famelicus in experimento JOSEPHI POZZI *comm. Epist.* p. 75. 76. Sunt tamen validae fatis. Pylorum ita constrictum, ut duritie fere cartilaginem imitaretur WEPFER. *de cicut. aquat.* p. 162. 221. vomitum a sola constrictione ventriculi p. 154. in lupo. Conf. elegantes observationes c. XI. p. 177. 179. eam quam HARTMANNUS habet EPH. NAT. CUR. Dec. II. *Ann.* VII. *Obs.* XL. & tristissimam mortem Baronis WASSENAARII, cui Oesoph-

demum agere possunt (1), quando ventriculus distenditur magis, quam a quinque aquae unciiis. Tunc vero cibi facile protruduntur, non vi propria ventriculi, quae eo tempore nulla est, LXXXI. not. 1. 2., verum vi incumbentis septi transversi, quod in inspiratione descendens, ventriculum exprimit LXXXVI. not. 13.

*Cruda*] Puer gulosus, ab epulis domum refert ventriculum (2) infartum ferculis diversi generis; ea omnia retinebit per horas octo vel decem, distento ventriculo, tum a ciborum copia, tum longe magis a rarefactione. Sed id omne quod ingessit, nihil patitur a ventriculo, cujus orificia contracta sunt, fibrae vero circulares paralyticae. Tandem post luctas & anxietates maximas, quando jam ipsae fibrae, inter Ventriculi orificia positae, resolutae sunt, apertus (3)  
ven-

phagus a convulso inter vomendum Ventriculo disruptus est. Verum hae efficaciae longe superant vim peristalticam naturalem, quae est in digestionem.

[1] Non liquet. Intestina etiam vacua agitantur motu peristaltico. Idem de Ventriculo verum. conf. LXXXI. not. 1.

[2] Confirmat haec in cane nuce vomica enecto WEPFER. l. c. p. 194. 213. In lupo, qui cicutam devoraverat p. 161. 253. summa distentio ventriculi, clausis osculis.

[3] In inflammatione ventriculi, inanes ad vomitum conatus perpetui, qui in plenum vomitum erumpunt, vel ex medicamento laxante alvum, vel resolutione facta, vel  
Ven-

ventriculus, & fursum (4) & deorsum ea dimittit, quae tanto cum incommodo suo retinuerat; magis tamen ad superiora, quod relaxatis omnibus fibris, flatus ex cibis generati fursum ament erumpere. Talis Consul ANTONIUS [5], dum hesternam crapulam

Ventriculo in sphacelum exeunte. FOREST. L. XVIII. *Obs.* 39. & 21. HOFMAN. *Med. Systemat.* IV. p. 382.

[4] Vomitus fit, vel a sola efficacia Ventriculi, motu fibrarum a pyloro initium faciente, & directione successione fursum facta WEPFER. p. 251. p. 297. p. 221. p. 154. &c. vel a sociata efficacia Septi transversii p. 250. ita tamen, ut ea sociata contractione non egeat Ventriculus p. 221. p. 250. Neque negaverim, socias esse vires musculorum abdominis, quod docuit CHIRACUS (TOURNEF. *hist. des plant. aut. de Par. pref.* & *Hist. de l'acad. des Scienc.* 1700. p. 36.) & confirmant exempla vomitus voluntarii, quale ex Agyrta habet BARTHOLINUS *hist. anat.* 39. *centur.* I. Ita tamen ut initium actionis fiat a Ventriculo, ut qui solus emeticorum rofionem experitur, consensus lege succedant muscoli abdominis, & agant, quiescente Diaphragmate LXXV. *not.* 1. quod in societatem trahi potest, ob consensum fibrarum LXXXII. *not.* 9. neque exprimente Ventriculum, sed quod expresfit, resolutum demum transmittente. Neque CHIRACI experimentum id est, quod refutet oculos WEPFERI: licet prehensum ventriculum post mercurii sublimati dosin, quiescere senserit. Id enim referri debet ad observationes *not.* 2.

[5] CICER. in *Philipp.* II. p. m. 285.

lam evômuit, togam laticlaviam & omne tribunal foetido vini odore & eruâtatis ferculis replevit. Fibrae rectae vero diutius solent vim suam fervare, cum & validiores sint **LXXXI. not. 4.** &, minus a se invicem distantes, se trahant potentius. Deinde orificia inprimis valide clauduntur. Nam Oesophagi quidem ingressio musculosis validis fibris munitur & constringitur a Diaphragmate: Duodeni vero pars musculosa non continua est musculosae parti ventriculi, verum in ventriculi musculorum tubum ita se inmittit, ut a coarctatis ventriculi fibris claudi possit (5\*). Inde fit, ut quiescentibus ex resolutione fibris transversis, recte fibrae, ostiis ventriculi interpositae, pergant contrahi, & ingestum cibum retineant valida vi, donec distentione jam summa, compressis penitus a distento ventriculo & nervis & arteriis (6), resolvi & eas fibras necesse (7) sit. Sed cruda manent ingesta; quia clauso Oesophago saliva non adfluit, & ventriculo valide distento succus gastricus non secernitur, tum vasis impeditis, tum desinente vi musculorum emulgente vasa. Quare & adtritum omnis abest. Reliquum est, ut cibus sibi permissus rarefiat, & pro sua indole fermentationem, aut putrefactionem

[5\*] vide **LXXXIII. not. 10.**

[6] Quare vacuus ventriculus, (**WEFFER. p. 250.**) aut contractus musculorum more, (**Id. p. 162.**) crassior est, distentus tenuioris substantiae.

[7] Conf. **INST. MED. CCCCI. not. 4. & 6.**



tionem moliatur. Unde fit, ut liquamen, quod ab ebriis evomi solet, acerrimum & acetosum sit, vino intra breve tempus in vappam corrupto, quæ aceti naturam habet (8).

*Liquores*] Strenui bibones, si maxima pocula absque mora ingurgitent, vel crebra exiguis intervallis superinfundant, protinus inebriantur, & male habent. Si moram concedant vino, neque poculum admittant, nisi calefacto quod prius erat, tunc & plus vini ferunt, & absque damno, & vomunt facilius. Namque frigore constringitur ventriculus, merumque retinet, atque arcet, quæ ingeruntur. Quare qui aquas medicatas frigidas (9) bibunt, si subito ad multas uncias admittant, sæpe anxietatibus exagitantur, aqua neque per urinam viam inveniente, neque laxante alvum (10), & visi sunt, quibus a potu frigidus subito in arteriis ventriculi nati sunt polypi, tuncque præsentissimum auxilium est vomitus ope pennæ oleo madentis concitatus. Idem si exiguos cyathos potitent, sed raros, atque corpus moveant; aquam  
epotam

[8] LISTER. l. c. p. 51. pingua in nidorosum liquamen, Terebinthina in flatu &c.

[9] Debiliores aegri aquas medicatas calefactas potare, & corpus leni sudore tepescere solent.

[10] Ratio quaerenda in constrictione valida fibrarum rectarum LXXXI. not. 6. a frigore subito, quæ contractæ ventriculum claudunt, uti solent post adsumpta venena.

epotam summa celeritate transmittent, quasi per patulum canalem, atque destinatos effectus efficacissime experientur.

### §. LXXXVI.

*Sufficientes*] Quia exigua cibi copia, non experta vires ventriculi (LXXXIII. not. 1.) feliciter digeritur, & expedite migrat ad Intestina.

*Calor*] GALENUS (1) Ventriculum comparavit cum lebete, cui subditus esset focus hepatis. Certe, si ignis non adest, maximus (2) tamen calor in iis partibus perpetuus est. Namque Ventriculo Cor incumbit, sola, & tenui Septi transversi crassitie distans. Omentum & Mesenterium utrinque fovent. In posteriore sede arteria Aorta ingens flumen vehit calidissimi

[1] HIPPOCRATES voce *πρὸς* perpetuus usus est, & cibum a calore concoqui tradidit. GALENUS eam opinionem magis ornavit, vid. ubique & *de usu part.* L. IV. c. VIII. Hunc omnes secuti sunt, ad usque regnum acidi. LISTERUS calorem cum putredine, DRAKE cum aëre clauso conjunxit. Potest utique calor fermentationes & putredines incipere, fixa reddere volatilia, coacta resolvere, solidas partes emollire, elicere succos.

[2] Ut passim calori cordis eum aequalem aestimaverit WEPFERUS l. c. p. 199. & c. Ad ventriculum felis junioris adscendere visum est Thermometrum a 600. ad 880.

mi sanguinis. Exhalatio tenuis & calida mollem teporem, & quasi vaporis balneum, efficit. Sed non alia vis resolvit potentius, quam calor corporis humani sani. Nimius ignis omnia cogit; sed atmosphaerae calor qui infra calorem corporis humani est, resolvit carnes ipsas in liquamen ante triduum. Sub Aequatore, ubi sol terrae ad perpendiculum imminet, musta solent intra viginti quatuor horas fermentationem perficere, & vina fieri (3), vina turbari, & flavescere. Pistoris pasta non alia arte fit sapidior, nisi quando ante coctionem diutius ad clibanum fermentationem passa est. Ovum, quod in fervida cogitur, id in sinu vividae juvenulae brevi tempore fatiscit in liquamen (4). Adparet itaque, magnas esse caloris in digestionem ciborum vires, licet eam non solus perficiat, quod antiquitati persuasum fuit.

*Ictus*] Arteriae, quae tanto numero [5], & amplae satis, ventriculo circumponuntur, alternatione perpetua, modo dilatantur in diastole, modo contrahuntur in systole.

[3] LOWTHORP. *abrigdm.* III. 2. 547.

[4] Et solo calore incubantis Gallinae, atque pressione aëris, abit albumen ovi in tenuissimum liquorem, qui possit trajici per vasa teneerrima cerebri nascentis pulli.

[5] Arteriae Gastro-Epiploicae dextra & sinistra, Gastrica Superior, & dextra inferior, Breves, vicina Lienaris, vicina Coeliaca, Hepatica, Mesenterica superior, Mesocolicae variae.

stole. Dum constringuntur, arctant utique parietes ventriculi, cibos subiectos quassant. Sed tales vires undique experitur ventriculus, medius inter viscera plena vasculis copiosissimis. Tam innumerabilium arteriarum ictus, ventriculus qualibet hora patitur ter mille & sexcentos, toties comprimitur, laxatur toties. Sed repetita & alterna vis aquae etiam lapides excavat, & innumerabiles exigui ictus idem efficiunt [6], quod facerent contracti in unum fortiolem, sed brevem inpetum. Gutta ex alto cadens in marmor si millies repetatur, deterit de lapide eandem particulam, quam detereret millies se ipsa major, & semel ex eadem altitudine cadens. Eadem ratione arteriarum pulsus ter millies repetitus, idem valet in comprimendo ventriculo, quod efficeret potentior, sed intra breve tempusculum arctatus; & cum arteriolae adeo exiguae durae membranae cerebri, sulcos durissimis cranii ossibus insculpant, magna omnino erit efficacia arteriarum tot vicibus ampliorum, in Ventriculum, adeo evidenrer molliorem. Neque objici debet, arterias sulcos cranio adhuc molli & tenero inpressisse; namque & arteriae cum cranio mollio-

[6] Voces PRAECEPTORIS, sed nisi fallor mollius interpretandae. Nempe, si pondus decem librarum, fibram flexam ad 10 lineas deprimit, una libra, decies repetita, decies deprimet ad lineam unam, minus ergo flexam minus violabit.



molliores (7) fuerunt, & fulci in adultis una cum arteriis crescunt. Sed, quo quisque debiliior est, eo crebrius saliunt ejus hominis arteriae, ut aliquando ictus intra horam sex mille numerentur, Adeoque ventriculus arteriarum ictus in firma valetudine fortiores, in adfecta crebriores patitur, neque unquam destituitur ea efficacia, quam aequalem fere esse existimo contractioni tunicae muscularis.

*Aortae*] Igniferum & vitale flumen, fultum posterius vertebris dorsi, anteriorem habens ventriculum, eum violente quassat, & si eo tempore, ut solent, abdominis muscoli ventriculum ad posteriora reprimunt, comprimitur inter duo prela robustissima. Vis autem arteriae Aortae ex eo aestimatur, quod procul dubio habeat vires aequales viribus simul sumtis arteriarum omnium: earum vero non maxima, Poplitea (8), crus totum cum inposito pondere elevat; deinde ex ea vi, qua digitus

[7] Utique ratio horum fulcorum in eo videtur quaerenda, quod incrementum ossium impediatur, in ea parte, qua sitae sunt arteriae.

[8] Velocitas sanguinis in aorta Equi ea est, ut intra minutum primum temporis percurrat 86. pedes. HALEs. *Haemast.* p. 22. & 25. & sanguis arteriae cruralis adscendat ad pedes 9. poll. 8. p. 11. KEILIUS in homine posuit 156. pedes de *veloc. sang.* p. 31. sed hujus pulsus duplo est frequentior.

digitus vivi canis arteriae Aortae insertus constringitur.

*Nervosi*] De natura liquidi nervei (9), & finibus nervorum (10) dicetur alibi ; & constabit , hos nunquam coecos esse, liquidum vero nervosum , mobilitate, subtilitate, hinc vi solvente, omnes humores corporis humani superare. Quod si interim libeat adsumere, & naturam liquidi, & adfusionem, utique constabit de efficacia maxima quandoquidem nervi ad ventriculum copiosissimi distribuuntur, plures quam ad papillulas necesse est, & adeo solventis liquidi vis maxima est [11].

*Con-*

[9] INST. MED. CCXCI.

[10] l.c. CCXCII. CCXCIII.

[11] Longe certe plures nervi ad Ventriculum abeunt, quam ad Hepar toties ponderosius, aut Diaphragma, adeo validi motus instrumentum. Conf. LXXVII. not. 17.  
22.

[12] *Peritonaei, in Text.*] Saccus pyriformis superius compressus, medio latior, ad inferiora in obtusum finem diminutus, a Diaphragmatis sede inferiore, deorsum ante Iliacos Psoasque musculos, deinde ante Intestinum rectum continuatus, reflexus supra vesicam, ante os pubis, & pone musculos abdominis, pertoratus pro admittendo Oesophago & vena Cava, & pro emittendo Intestino recto, continens Hepar, Lienem, Pancreas & omne volumen Intestinorum cum Ventriculo. Aorta, vena Cava, ductus Thoracicus, Renes,

*Contenta*] Ventriculus in abdomine positus est. Quod machinae quoddam genus est, firmum posterius, superius & anterius mobile, musculofo pariete septum, efficacia sua

Renes, & vasa vicina, Recti Intestini major pars, extra Peritonaei cavum ponuntur, in ea cellulosa fabrica, quae, Peritonaeum ambiens, id ipsum necit Diaphragmati, musculis Transversis, Vesicae, Levatoribus Ani, Psoae, Iliacis, atque vertebrarum Lumbalium involucris tendinosis. Superficies exterior, aequabilis, in anteriori sede abdominis fibris firmioribus fulta; Interior humecta vapore madente, perpetuo. Hoc, quod descripsimus, Peritonaeum, ita repletur visceribus quae continet, ut etiam Intestinorum impressiones recipiat, & id ipsum Ventriculum a Diaphragmate depresso repellit fortiter; & vicissim, compressum a musculis abdominis, reprimat Ventriculum. Quare eo perforato, etiam in cadavere, sed longe magis in vivo animale, Intestina & viscera magna vi per vulnus erumpunt. Hanc veram structuram, vide apud WINSLOWUM & DOUGLASSIUM (*de periton.*) licet simplicem naturam Peritonaei, atque cellulosam fabricam exteriorem etiam GALENUS recte tradiderit *de Admin. Anat.* L. VI. c. IV.

Vasa non magna habet ab Epigastricis (CASSER. ap. SPIGEL. L. VIII. T. I. & VESAL. L. V. f. I.) a spermaticis, aliisque truncis vicinis.

sua ventriculum perpetuo fursum & retrorsum pellit eo validius, quo ipse magis tumet. Plenissimum enim est abdomen, neque ventriculus inter partes molles tanquam in liquido suspensus est, sed in plenissimo loco, urget partes sibi vicinas, & ab iis vicissim urgetur: descendit cum diaphragmate & cum eodem repulso adscendit; eundemque tritum patiuntur cibi, quem pisa in vesica, quam valida vi manuum alterne homo conprimeret. Diaphragma  
in

[13] *Diaphragma, in Text.*] Carneus & tendineus fornix, imminet universo abdomini, proximus Hepati, & ventriculo, & lieni. Oritur a cartilagine ensiformi, fasciculo singulari bifido (SENNAC. *Mem. de l' Acad. des Sc.* 1729. T. XIV. *fig. sup.* FF, f. *infer.* D. D.) atque a vicinis carnibus separato propriis fasciculis pinguedinis. Deinde a costa septima, ex cartilaginea sede & osseae initio; ex octava postquam flexa est, & cartilaginea parte & osseae haud ampla sede. A nona magis ab osse, quam a cartilagine; A decima majori parte ab ossea; Ab undecimae sede ossea, & apice duodecimae. Ita ut alias late ad IX. X. & XI. costam confluat, continuata carne, cum Transverso Abdominis (ALB. l. c. p. 300. post veteres contra SENNACUM.) ut nuper vidi, alias interferatur pectinatim, ut & ipse vidi, & ALBINUS. Deinde, relicto spacio a fibris vacuo, triangulari; a tendinea membrana tegente musculum Quadratum, [SENNAC. *fig. sup.* T. V.] & a continuo arcu tendineo, qui



in expiratione adscendit ad eam lineam usque, quae mammillas conjungit, quod pauci norunt. Neque enim ita habetur in figuris anatomicorum. Quando vero se versus abdomen explanat, premit Ventrículum antrorsum & deorsum; Quando denuo in expiratione musculi Abdominis agunt, tunc sursum agitur & retrorsum.

Vtraque

qui transmittit Psoam, [l. c. V. W.] Tandem, variis modis, a variis vertebrae lumborum; & quidem ab inferioribus, quarta aut tertia, aut secunda, tendineis principiis; a supremis duabus etiam carneis; Hae a vertebrae origines, efficiunt carneos lacertos, qui medio septi transversi tendini late inferuntur; incerto numero, ut modo quatuor sint COWPER. *Myot. nov.* 1714. T. XXXIV. XXXV. E. E. SENNAC. p. 167. modo plura, incerto, & in quovis latere diverso numero ALBIN. III. c. LXXXI. Namque ab omnibus fibris carneis, insertis septo transverso, tendineae fibrae educuntur carnearum directionem sequentes, quae obposito concursu efficiunt magnum Tendinem bicrurum [SENNAC. f. sup.] apice posito in media sede anteriori, crure sinistro longiori, latiori dextro. In eo, tela fibrarum praecipua, sequitur lineas a rectis lacertis educas, convergentes in tendineam expansionem; Intertexuntur vero strata fibrarum tendinea alia. Quorum alia ad decussim priorum a contrariis carnibus incedunt antrorsum & introrsum. Et proprii fasciculi tendinei quadrato ambitu, (rectius

Utraque haec vis nunquam quiescit, & quae abdomine continentur, perpetuo sursum & deorsum urget. Quare sequetur effectus, adtritum, divisio ciborum in partes minutissimas. Et ea ipsa vis eo agit validius, quo ventriculus distensus magis renititur (14). Vis vero Diaphragmatis ipso oculorum

COWPER. T. XXXIV. XXXV. SENNAC. triangulum facit *fig. sup. b. c. d.*] sed obtuso ambiunt iter venae Cavae, quod in dextri cruris tendinei initio est. Alii praetervehuntur supra oesophagi transitum; SENNAC. ad b. f. sup., cujus reliquam longitudinem intercipiunt lacerti praecipui a lumborum vertebrae orti, sub ipso oesophagi transitu, lacertis bis, vel quater omnino, decussatis conjuncti, ita ut supra foramen tendineae fibrae denuo se in decussim fecerint. ALB. l. c.

Sed omnes omnino carnae fibrae & a costis & a vertebrae & a Sterno adscendunt, estque Tendo medius altior omni adhaesione carnum ad ossa, unde facile deducitur, quod septum transversum more musculorum se contrahens, descendat intra abdomen, fornicem, qui hepatis, & Ventriculo inminet, explanet, & Ventriculum deprimat contra viscera plenissimi Abdominis, & resistens Peritonaeum. Et videtur omnino princeps esse machina, qua ventriculus aut cibos adterit, aut evacuatur. Relaxatum, cedit visceribus abdominis, & redit in Thoracem, sed altius in dextro latere.

[14] Efficaciam alternam harum potentiarum omnium

lorum testimonio aestimari potest; Quando nempe vivi animalis abdominales muscoli inciduntur vulnere, abdomen protinus maxima vi se extrorsum extendit, & viscera abdominis vulnere proxima violenter nituntur in vulnus: Quando vero Peritoneum ipsum perforatur, tunc erumpunt (15) cum miro murmure & enixo inpetu Intestina, & digitus, si inferatur vulnere, comprimitur vi magna. Sed ea omnis vis debetur Diaphragmati: Cujus etiam efficacia in vomitu, magna vi sursum expellit alimenta (16): deorsum egestura, si per alvum enitenda sint.

*Decem*] (17) Musculi abdominis ita disponun-

omnium optime CAR. DRELINCOURTII *Canicid.* VII.

[15] Omentum, Intestina, Pancreas, Ventriculus, & hepatis aliquando fibra aliqua, v. BRUNNER. *de Pancr.* in experimentis omnibus.

[16] Sententiam CHIRACI hic sequi videtur PRAECEPTOR. de ea vid. §. LXXXV. not. 4. Evacuari omnino Ventriculum a Diaphragmate, demonstrat experimentum, ubi laeso bovis ventriculo, materia pultacea per vulnus, succussibus alternis, ad aliquot passus projecta est. WEPFER. ad *merycol.* PEYERI p. 275. conf. in *Huanao* FEULL. *Fourn.* II. p. 30. licet omnino ipse etiam ventriculus sufficiat, vid. §. LXXXIII. not. 6.

[17] Obliquus anterior, posterior, & transversus, efficiunt unum saccum musculosum,

ponuntur, ut semper subponatur aliquis, ubicunque alterius carnea pars nulla est, atque ita in universo ambitu abdominis aequabilis esset contractio. Caro obliqui descendentis (18) fere superior est, ad inferiora deficit.

circumpositum visceribus Abdominis, & supertensum, ita ut insigni fornice, inter pectus & pubem, intumescat antrorsum. Quare fibra se restituente in lineam rectam, quae arcu brevior est repelluntur viscera valide retrorsum & sursum, si cedat Diaphragma; deorsum, si imminens valide simul deprimat abdomen. Prior conatus in vomitu est [WEPFER. *de cicut. aquat.* p. 160. HAGUENOT. *Mem. de l'Ac. des Sc.* 1713.] Posterior in egestionem alvi. Uterque ventriculum a peritoneo, quod contingit anterior [LXXVI. *not.* 1.], repellit validissime, & evacuat.

- [18] *Anterior, descendens & major carneus* oritur a costis imis octo, WINSLOW. ALBIN., vel novem [ALBIN. l. c.], digitatis, normam imitantibus initiis [COWPER. *Myot. reform.* 1724. T. XIV.] ab ossea earum sede; descendit in tendineam expansionem, quae costae sextae & septimae in cartilagine (VESAL. l. c. p. 231. ed. LUGD.) & ossis Sterni portionibus duabus interioribus (EUSTACH. T. XXXI.) inseritur: deinde ex ordine omni abdominis mediae lineae, decussatus cum conpare (VESAL. l. c.) imo vero cum interioribus etiam *Obliqui posterioris* (inferioris) WINSLOW. II. 118. SANTORIN. l. c. p. 161. & Transversi fibris, descendente



ficat. Ibi ab inferioribus adscendit obliquus minor (19), & cavum supplet. Sed & hujus

dente fibrarum ductu: Et inferiores quidem fibrae carnae ortae a crepidine ossis Ilium [DOUGL. c. I. c. I. p. 2. EUST. T. XXXV. WINSL. 79.) conjunctae prioribus, efficiunt continuam aponeurosin, quae fissa ad emittenda vasa spermatica, tendine *exteriori* [COWP. T. XIV. T. XV. K K.] valde robusto, ut ligamentum P OUPARTII dictus sit, [*Hist. de l'Acad. des sc. 1705. p. 64.*] inseritur in tuberculum ossis Pubis & spinam continuam; *interiori* verolato & debili (COWP. T. XV. M.) tum lineam albam perficit COWPER. l. c. T. I. tum in decussim [ALB. l. c. WINSL. 82.] cum fibris similibus paris sui, finitur in cartilagineam & ligamentosam naturam, conjungentem ossa pubis,

Quare contrahit abdomen & arctat; Thoracem brevior, & arctior facit, & praeterea, modo cum pare suo elevat pelvim ad costas (SPIGEL. L. IV. c. X. p. 110.), in iis qui jacentes se erigunt, aut pectus supra pelvim conflectit, modo solus rotat in sedente corpore truncum corporis super firmatam pelvim PICCOLHOMIN. *Prael. anat.* VIII. p. 74. GLISSON. *de Ventr. & Intest.* p. 98. edit. BAT. & COWPER. *Myot. parv.* p. 19. 20.

[19] *Posterior, adscendens, & minor.* Oritur tendineus a processibus spinosis aliquot vertebrarum lumborum, & ossis sacri, (VE-

jus musculi fibrae posterius ad latera deficiunt. Ergo ibi addita est carnea vis

Trans-

SAL. L. II. c. XXXI. T. XI. a. b. SPIGELIUS, l. c. p. 109. SANTORINUS. c. IX. §. 1. & ALBINUS l. c. c. XXXVI. nam multi omittunt.) atque ab aliquot transversis processibus inferioribus lumborum: Deinde a crista Ilium, tendineus, tum carneus, (EUST. T. XXXV.) &c. adusque spinam anteriorem superiorem: tum a vicino tendine robustiori, exteriori Descendentis, [FALLOP. *Observ. Anat.* p. 70. ed. 1606. COWP. T. XV.] Binum. Inde fit in carnem lunatam, positam pone tendinem *Descendentis*, quae ad modum radiorum [EUST. l. c.] emittit supremas fibras adscendentes & tendineas, in costas spurias omnes & veras duas ultimas ad sternum usque DOUGL. l. c. ALB. l. c. WINSL. 89. COWP. T. V. f. 1. Deinde ex media carne fit tendo, qui dividitur in duas laminas COLUMB. L. V. p. 142. WINSL. 93. SANTOR. c. IX. §. 3. quarum anterior, CASSER. apud SPIGEL. T. X. L. IV. lit. M M. COWP. T. XV.] ante musculum Rectum cum simili expansione musculi Descendentis, nexu aliqua parte solubili in medio abdomine intricatur cum conpare & vicino descendente: posterior simili modo educitur ad posteriora musculi Recti, iter simile facit cum Transverso, cui arctissime cohaeret, intra Rectum continuata, & inplexa priori. Denique fibrae inferior-

Transversi. Demum hi omnes antèrius in tenuitatem tendineam abeunt, sed ibi positus est Rectus carneus totus: Huic ad inferiora, si latus fuerit, nihil additur, ut docuit

feriores tendinae descendunt, absque duplici vagina, junctae Transversi aponeurosi, ante Rectum, & partim albam lineam perficiunt partim inferuntur pone descendentem, in tuberculum, spinam & synchondrosin ossis Pubis. ALBIN. l. c. Vasa spermatica plerumque sub eo musculo, & supra tendinem exteriorem Descendentis, non perforato transeunt: licet aliis aliter visum sit.

Abdomen & Thoracem constringit, costas deprimit; Rectum coercet; Truncum simili modo deprimit SPIGEL. l. c. p. 111. si uterque agat, vel rotat, si unicus, ad suas partes PICCOLHOMIN l. c. GLISSON. l. c. p. 100. COWPER. &c. contrarius Descendentis sui lateris, & socius Descendentis lateris alterni; forte & ossa pubis diducit in partu: Si quidem diduci credas MORGAGNO *Advers. Anat.* III. p. 28. & aliis, oculatis testibus.

[19\*] *Pyramidalis, in Text.*] A FALLOPIO primum distinctus *Obs. Anat.* p. 716. ed. LUGD. BAT. & VENET. p. 68. Exiguus, majore sui parte carneus, pone initium musculi Recti, ex margine superiori coalescentium ossium pubis, & ex synchondrosi ossium pubis oritur, ascendit, & plerumque alter altero longior, nexus praeterea Recto musculo ALBIN. III. c. LXXIX.

docuit dudum RIOLANVS [19\*\*]; si angustior fuerit, adjicitur Pyramidalis musculus.

§. LXXXVII.

LXXIX. inseritur posteriori laminae vaginae musculi Recti, ex Obliquo posteriori, & Transverso factae, inter umbilicum, (conf. EUST. T. XXXIII. COWP. T. I. lit. 3.) quem rarissime adtingit, (quod COWPERUS p. 2. §. III. vidit, & pauci alii conf. ALBIN. l. c. WINSL. &c.) & os pubis, ad altitudinem admodum variam. Frequenter eorum alter deest FALLOP. l. c. BIDLOO T. XXXII. aliquando uterque, uti FALLOPIO, SPIGELIO, BAVHINO, SANTORINO, p. 160. COWPERO &c. & nobis aliquoties visum est. Detrahit lineam albam, & vaginam Recti cedentem intendit, comprimit in junioribus vesicam (FALLOP. & reliqui, conf. INST. MED. CCCLXVI.) in mulieribus gravidis uterum. Vesicam elevare vult NICHOLSIUS *Compend Anat.* T. III. p. 14. verum raro Umbilico inseritur, etiam tunc non dimoturus Arterias umbilicales, quae totae immobiles, innascuntur Peritoneo. Ad ventriculum comprimentum non facit.

[19\*\*] *Anthropol.* L. V. c. XXXIV.

[20] *Transversus, in Text.*] Oritur a processibus transversis vertebrarum lumbalium trium vel quatuor (EUST. T. XXXVII.) tum ab ossis Ilium crepidine, & a tendine exteriori obliqui Descendentis, & a costis sex inferioribus adusque cartilaginem ensiformem, & ex costis quidem, a margine posteriori, ubi cum Diaphragmate saepe conjungitur; Deinde ab ipsa cartilagine mucro-



cronata. Hae fibrae carnae a costis, & a vertebra post brevem tendinem carnae omnes, transversae incedunt, ad Adscendentem posterius firmissime cohaerentes, & educunt tendinem, qui pone expansionem tendineam (EUST. T. XXXIII. SPIGEL. L. IV. T. XI. RR. & T. XII.) musculi Obliqui descendens, cum qua arctissime connascitur, excepta sede inferiori, qua secedit ab eo & fit anterior, COWPER. f. 1724. p. 5. ALBIN. ante peritoneum, a quo & cellulosa fabrica, & aliquando pinguedine multo distinguitur, incedit ad lineam albam, cum pare suo (VESAL. l. c. p. 232.) & utroque Obliquo intricatus. Imae fibrae ejus descendunt, & ossibus pubis pone obliquum internum inferuntur. Vasa spermatica non transmittit, quae longe sub eo migrant, consentiente nobiscum contra Anatomicos pene omnes MORGAGNO *Adv. Anat.* II. *Animadv.* XI. Comprimit accurate & aequabiliter universum abdomen, & Diaphragma cui nequitur detrahit. Infimae fibrae truncum corporis supra pelvim rotare possunt GLISSON. l. c. c. XIII. §. 39. 40.

[21] *Rectus, in Text.*] Duplici principio, alio ex symphyli ossium Pubis: alio inferiori, (DOUGL. *of the muscles*, p. 3. ALBIN. c. LXXV III.) & inferiori supra corpora cavernosa Penis, & hoc quidem decussato, ut a dextro osse Pubis sinister musculus oriatur, ex sinistro dexter, adscendit latior, & carneus adscendit in vagina (§. 18. 19. 20,) duplici, una ab obliquis (COWP. T. IV.) & alia ab Obliquo minore & transverso facta, & inseritur cartilagi-

## §. LXXXVII.

*Mollem*] Nisi enim cibus dentibus subactus (1) sit, & dilutus saliva, rejicitur integer & indigestus. Si robustissimus mortaliū uvam corinthiacam (2) siccam & duram deglutiat, non concoquet, & per alvum egeret absque mutatione. Robustissimus equus (3) avenam non manducatam adeo non subigit, ut aliquando visa sit egesta vim germinandi (4) retinuisse.

*Uno*

gineae fedi costarum quintae, sextae, septimae, (EUST. T. XXXIII.) & cartilagini Eniformi COWP. l. c. In ejus sede quae supra umbilicum est, fere tres (SPIGEL. L. IV. T. X. XI. VESAL. L. II. T. V.) inscriptiones tendineae, (COWP. T. XVI. & T. XV.) imperfectae tamen, & carne interruptae, validissime adnatae tendini Obliquorum, & aliquando sub umbilico una [COWP. T. II. & T. XV.]. Detrahit Thoracem, & corpus flectit, Abdomen medium deprimit, & ad vertebrae viscera repellit. Truncum jacentis erigit super prostratum Pectus. SPIGEL. p. 112. VESAL. L. II. c. XXXVIII. &c.

[1] De carne non mansa & diutissime in ventriculo conservata ALBRECHT. EPHER. NAT. CUR. DEC. II. Ann. IX. Obs. LXXXII. p. 140. 141.

[2] Observatio exstat apud GLISSON. *de Ventr. & Intest.* p. 313.

[3] Vid. not. 16. 17. 18.

[4] De avibus notissimum est, eas semina, baccasque in remota loca sylvasque plantare, quae elapsa per alvum germinant.

*Uno loco*] Dum superius ostium ventriculi clausum est per musculosas fibras, interjectas ostiis; inferius vero valvula distinctum arcte connivet [5].

*Levigari*] Cum enim ipsa vitra adtrita tunicarum adfrictione levigentur [7], longe major erit effectus in animalium partibus. In ventriculo bovis PEYERUS (7\*) ferrum expoliri vidit, non erodi, & similia sunt experimenta BORELLI. ●

*Solvi*] Dum adtenuantur insensibiles, & interponitur fluidum diluens, in quo natent solida elementa.

*Ci-*

[5] Accurate claudi utrumque, variis experimentis demonstrat VIRIDETUS l. c. p. 223. „ &c. & observat succum heliotropii in „ fufum per Oesophagum rubuisse in „ ventriculo, colorem in gula non mu- „ tasse, & in foetu, rescisso oesophago „ & duodeno nihil effluxisse.

[6] *Mobiliora, in Text.*] PITCARNIUS, ipsas solidas & simplices fibras animalium, & vegetabilium, quarum carnibus vescimur, existimavit resolvi a nexibus mutuis, atque sanguinem subire, futuram materiem reparandis corporis humani elementis, *de modo quo cibi &c.* p. 72. 83. *Epist. contra* ASTRUC. p. 245. 246. 247. Verum id non fieri, & chyli summa tenuitas demonstrat, & fibrarum solidarum perennis firmitas in faecibus aluinis equorum & bo- um, & ipsa mechanica difficultas, quae est in itinere longarum fibrarum, per longas & gracilissimas fistulas.

[7] HELMONT. *calor. effic. non digerit.* p. 163.

[7\*] *de ruminant.* p. 95. *conf.* LXXXIV. *not.* 2.

*Cinericium*] Cibus diuturna manducatione exalbescit, & radios lucis non mutatos reflectit [8]. Etiam si rubras betas, & panem atrum ingesseris, cibus in Ventriculo semper cinereus erit. Id levigatione fit, & politis superficiebus. Sed in ventriculo id ipsum, quod manducatum fuit, adteritur denuo, & uniforme magis, atque tenuius fit. Interim tamen Chylus nunquam albus in ventriculo visus est, aut vomitu redditus (9).

*Premi*] Quo magis Ventriculus distenditur, eo magis comprimitur, ab actione septi transversi (10) (LXXXVI. not. 13.) &, nisi nimia sit distentio, ipsarum etiam fibrarum Ventriculi. Verum pressum liquidum quaerit effugium; idque invenit ea in sede ubi resistentia est minima; Atqui Oesophagus clausus firmitus, resistit ipso pondere & coërcetur a Septo transverso [LXXV. not. 1.] Quare omnis effluxus alimenti ad Pylorum ten-

[8] Atqui omnes radii conjuncti jubar albisimum reflectunt, NEWTON. *Optiks* L. I. P. II. *Prop.* V. p. 117. Sed pulveres omnes, quo tenuiores, eo albi magis. Et laevissima corpora quaeque alba sunt.

[9] VERHEYEN L. II. p. 24. chylum in Ventriculo perfici, & perfectum in canibus visum esse, atque ex vulneribus ventriculi humani erupisse. Mihi semper mucosa, cinericia massa visa est, a chylo & colore & tenacitate, & odore diversa. Conf. HELVET. & LXXXIII. not. 12.

[10] Vid. apud PITCARNE *Epist. contra ASTRUC.* P. 251. seqq.



tendit, [11] ubi laxum atrium cibum recipit, & latius ostium facilius dimittit. Neque tamen ita patet, ut possint crassa, tenacia, solida penetrare, [LXXXIII. not 8.] effluent ergo ea sola, quae pulsem vel lac referunt, pulsa ea vi septi, & ventriculi, quae superet resistentiam Pylori; ferentur ad Duodenum, angusta equidem via, donec quae crassa sunt, ea ipsa resoluta, vel diu in laxum pylorum nitentia, & ipsa inveniant viam.

*Tenaciora*] Quando ventriculus plenus est, nihil potest crassorum ciborum expellere. Ergo crassa, cum superare non possint angustias Pylori, retinentur in Ventriculo, emulgetur quidquid in ipsis est fluxile [12], atque ad Duodenum praecedit, donec reliqua & ipsa adtenuata, laxo ostio, per vim Septi atque Ventriculi sequantur. Demonstra-

[11] Qui in pleno ventriculo, inclinatus, vix ascendit, vix plicam habet. LXXXIII. not. 8.

[12] Inde fit, ut cibi diversae naturae, diversis etiam temporibus ex Ventriculo expellantur. Bihorio a pastu BIRONII Marschalli globo plumbeo interemti, ventriculus, vacuus visus est RIOLAN. *Anthropogr.* p. 609. ed. 1649. Septem horis a pastu, appetitus ciborum integre restitutus est, haud levi argumento, Ventriculum evacuatum esse. VIRIDETUS etiam horas definit (*de prim. coct.* p. 253.) aquosis semihoram, horaeis fructibus, carnibus, & pani horas tres, etiam quinque, durioribus

stravit per experimenta WALAEUS [12\*], eos cibos, qui primi adsumti sunt, primos etiam expelli. Tempus vero, quod ad eam evacuationem ventriculi requiritur, non potest accurate definiri.

*Fibras*] Homo robustissimus nihil omnino solidarum particularum solvit, neque in chylum convertit. Namque, ut solida fibra carnis bubulae possit resolvi in ea elementa fluida, ex qua ea fibra constat, debet utique adhiberi efficacia major ea vi, qua ea elementa sunt compacta in fibrae naturam. Verum nimis adparet, eas vires non inesse corpori humano: neque ergo superest alia, nisi quae possit effringere vasa cavaeque fibras animalium aut vegetabilium, atque succos effusos in naturam nostram mutare. Sed ii succi carnis partem longe majorem, & ferre septem octavas efficiunt. Conf. not. 6.

*Ossa*] Receptum est in hominum opinione, idemque quod ossa ab animalibus (13) subigantur, cum HELMONTIANIS olim sensit BOERHAAVIUS, ut vero certior esset, curam adhibuit, ut observaret, quid cibis fieret in ven-

ribus cibis septem & octo. Alia tempora WALAEUS apud BARTHOL. p. 764. In cane vero, etiam post quartam aut quintam horam, lac ipsum in venis reperitur LOWER. C. V. p. 258.

[12\*] l. c.

[13] In aquila, noctua, serpente, piscibus, vere solvi ossa, cartilagines & tendines animalium, dictum est LXXIX. not. 1. Quare addi debet, in animalibus, quorum ventriculus humano similis est.

ventriculis animalium valide cibos coquentium, & experimento cognovit, non subigi. Dedit cani devoranda intestina animalium, famelicus erat, affatim deglutiit, subegit minime, & per extremum intestinum pendula misere post se traxit. Dedit famelico cani ossa butyro inuncta, reddidit immutata. Dedit panem, reddidit furfura, neque quidquam dissolvit, nisi quod in aqua dissolvi potest. Dedit carnes, reddidit fibras carnis exsuccas. Dedit ligamenta, ea post triduum nihil mutata egressit. Deinde in stercore canino, quod *album graecum* vocant, fragmenta ossium (14) pene non mutata reperiuntur, & fit mera rasura ossium, quae dentibus canis adrosit, exsuccorum, & in unam massam fictorum.

*Exsucca*] Equus (15) haud paulo homine robustius animal, vivit gramine & foeno; in ejus stercore globoso equidem & ficco cum aqua diluto, integrum gramen culmi-que foeni adparent. Bos, graminis globum devoratum avide, nunquam dissolvit in primo ventriculo, (16) sed regurgitare cogit, (17)

[14] BRUNNER. de *usu lymph. pancr.* c. III. p. 78. de *Duod.* p. 110. Imo vero neque in Papiniana machina solvi ossa, neque fibras mutari KEIL. de *Quantit. sang.* p. 23. 24. WALAEUS tamen cartilaginem fieri in canibus l. c. In homine certum est non mutari. Confer. LXXXIV. not. 8.

[15] Cujus ventriculus, ab humano fabrica non alienus est GREW *compar. anat. of the guts* p. 12.

[16] Neque secundo, neque tertio, quartus de-

(17) efficacia musculari, subigit iterato sub dentibus molaribus, adfundit salivam, macerat, devorat denuo, & repetita manducatione subigit, neque eo minus graminis, & foeni straminisque caules integros, in faecibus alvinis egerit (18). In hominum faecibus (19) solidae fibrae carnum reperiuntur. Idem verum est de partibus solidis stirpium, de pelliculis Fabarum, Pisorum, cuticula Cerasi, Ribium, Uvarum: eae omnes, tumescentes, sed non mutatae, neque resolutae egeruntur.

*Expelli*] Perspicacissimus Medicus (19\*) quaestionem proposuit. Quare ventriculus humanus non consumatur, dum ipse consumit ventriculos & intestina animalium, quibus vescimur. Sed facilius est responso, quam videtur viro clarissimo. Consumitur utique eodem calore, & eodem tritu, humanus ventriculus, sed renascitur, cum ventriculi animalium, quibus vescimur, non renascantur. Id quod solvi non potuit efficacia

mum pultem continet HELVET. *Mem. de l'Acad. des Scienc.* 1719.

[17] Non gramina adeo, quam duriores cibos PEYER. *de ruminant.* p. 217.

[18] PEYER. l. c. p. 120. 170.

[19] Et piscium LEUWENHOECK *Anat. & cont.* p. 61.

[19\*] PITCARNIUS in *diff. de motu quo cib.* Rationem reddit non bonam, quod nempe lamellae in ventriculo multae sint, neque noceat unius alteriusve iactura. Noceret certe, & dolores faceret crudelissimos. Vera ratio est in liquore exhalante, qui



Dentium, salivae, admisti aëris, succi Gastrici, caloris, adtritum; id exspectat in Ventriculo, donec egestum sit id omne, quod in cibo mobilius adfuit, tum vero laxatur Ventriculus (20) & Pylorus (21) flaccidus reclinatur ad inferiora, atque succussione incumbentis Septi transversi, id ipsum quod immobile est, per laxatum pylorum expellitur; nisi forte sursum feratur cum vapore regurgitante acido, aut putrido.

*Similem*] Mirificum (22) & vix credibile videtur rerum intelligentibus, eundem & ex animalibus & ex vegetabilibus, chylum parari. Verum, si rem profundius rimemur, re-

qui perpetuo repellit partículas alimenti, ne ventriculum durius confricent, & in glutine leniente ventriculum, & in epidermide renascente LXXXI. & in villis ipsis perpetuo regeneratis.

(20) Omnino videtur, ventriculo parum repleto, aut vacuo, non esse fibris carneis ullum punctum firmum, ad quod se contrahant, proinde, nullam vim se contrahendi. Quare integre depleri videtur Ventriculus vi aliena.

[21] Non videtur hoc obtinere: Magis adscendit flaccidus Pylorus, & angulo longe minori abit in Duodenum LXXXIII. not. 8.

[22] Quia nempe Vegetabilia pleraque dant ad ignem liquores acidos, aut fixum salem, animalia sales lixivos, eosque volatiles. Inde nata fermenta HELMONTII, acida in ventriculo, salsa in Duodeno stercorea in cocco Intestino. Verum multum decedet de miraculo, si consideremus I. Multa de

reperiemus omnia animalia duorum generum esse; Alia nempe vegetabilibus vescuntur; alia animalibus aliis. In priori classe, qua

cibus omnino non mutari,, Lac foeminae acescere, simillimum emulsioni vegetabili. Eosdem globulos, qui fuerunt in farina (LEEUVENHOECK *Epist. Physiolog.* xxvi. WOLF. *Versuche II. Tom.* §. 92.) solitarii, reperiri in chylo, ita ut duo, tres, quatuor, quinque, adunati sint (LEEUVENHOECK *Arcan. nat. detect.* p. 10. 11. 12.) in sanguine demum compacti, ut sex omnino in unum densentur,, Lac Vaccarum ab Allio montano, a Gratiola viciari; Turdos Rhamno pastos carnem exhibere, quae alvum ducat. Salem marinum superesse in sanguine. Et magnam partem liquorum animalium, etiam eorum, quae carnivoris animalibus aluntur, continere salem acidum HOMBERG. *Mem. de l'Acad. des Scienc.* 1723. p. 13. & copiosum quidem in junioribus l. c. p. 14. II Mutationem salium acidorum in alcalia volatilia, & putredine sola BOERH. *El. Chem.* II. Pr. LXXXVIII. & igne solo HOMBERG. 1708. p. 406. facillime obtineri. Desinet utique illa admiratio, quum multa de cibis non mutantur, omnia vero & putredinis initia patiantur, & calorem, & adtritum repetitum, quae ignis loco sint. Omnium minime vero admirari decet, qua ratione Ventriculus eam mutationem possit efficere; neque enim efficit, & cibos vegetabiles perfecte acidos dimittit, in ipso cane & aliis calidis animalibus, in quibus saepe caseosum lac, & acidissimum nidorem vidi.

qua frequentius utimur, succi animales sunt ipsi vegetabiles succi graminis, in humores bovis efficacia ventriculi & intestinorum parati. In altera classe, succi animales sunt succi vegetabiles, modo dicti; in animales facti ab herbivoris animalibus, & nunc, altera quasi *μετεμψυχωσι*, in alterius animalis naturam traducti. His ergo vescimur atque nutrimur, succis vegetabilibus, vel una ventriculi vi, vel iterata, in animales succos factis & stillantibus ex diffractis fibris animalium. Priora animalia, modice a vegetabilibus recedentem naturam habent, posteriora jam alienam magis, cum in iis sint succi vegetabiles duorum ex ordine animalium efficaciam vitalem & organa passi, inde in alcalinam naturam magis prona. Quare canis & Leonis lac non facile acciscit (23). Nostri succi simillimi fiunt succis animalium quibus vescimur, iidem nempe, easdem quas passi sunt efficacias, denuo passi in nostris visceribus. Quare si repetamus, omnia quibus vivimus, vel vegetabilia esse, vel vegetabilia eadem, aut simplici, aut repetita vi animalis subacta, non erit adeo incredibile, posse ex omnibus iis ciborum generibus, pene eundem sanguinem nasci.

*In-*

- [23] Urinosum est, & acre, & ad mundandos pannos bilis ad instar utile GESN. *de Hist. Animal. Quadrup.* p. 189. ED. FRO-SCHOV. Cum ex lacte herbivororum animalium omnino inebrians liquor ad ignem stillet LISTER. *de humor.* p. 434.

*Instaurationem* ] Parens artis nostrae HIPPOCRATES olim effatus est (24) omnia in corpore humano perspirare „vel, quod idem est, ubique dari arterias exhalantes & venas resorbentes. Per universam cutem (25) innumerabiles arteriae exhalant vaporem invisibilem, qui hominem nubis instar ambit, & ab aëre diffatur, idemque, si excipiat speculo, in guttas aquosas cogitur; qui idem vapor, calido coelo nunquam conspicitur, neque intra Tropicos; coelo vero frigido densatus, in nubes coit, ut fumum ex ore halemus, atque ex ipso etiam corpore atque manibus, visibilem effundamus. Haec transpiratio admodum inminuitur a densitate epidermidis, & ab aëris repellente frigore. Quare aequum est existimatu, hunc vaporem longe copiosius exhalare in caveis internis corporis humani, quae omnes tepido halitu perpetuo madent (26). Verum  
 ii

[24] Σαρκες ὅλκος, καὶ ἐκ κοιλίης καὶ ἐξ ὠθην, δὴλον ἢ αἰσθησίς, ὅτι εἰσπνοὸν καὶ ἐκπνοὸν ὅλον τὸ σῶμα. Ἐνθερμότερον φλεβίον αἵματος πληθεὺς ἀνίσχει τὸ καυσώδες, καὶ εἶθὺς ἀποκρίνεται. EPIDEM. L. VI. f. VI. p. 811. Ed. LIND. manifestum certe documentum arteriarum exhalantium, & venarum resorbentium.

[25] INST. MED. CCCCXX. CCCCXXI. Huc efficax experimentum RUYSCHII, feminae, quae per universum cutis ambitum, sanguinem menstruum cum impetu solebat effundere. Adv. Anat. Dec. III. n. 3.

P. 14. 15. [26] Nulla pars corporis humani sani sicca est. Ven-



fi exhalatur ex corpore humano, sequitur pene necessario, inhalari in iisdem locis: atque consentiunt experimenta. **BELLINUS** (27) inversum Ventriculum aqua replevit, & vidit, resorbta aqua, venas ventriculi intumuisse. Sed ex cute humana ipsa, ab epidermide liberata, si saccum facias, aquam inhibet. **Cantharides & mercurius** (27\*) cuti

Ventriculi cerebri, cavea oris Pericardii Thoracis, Abdominis, Pelvis, vacua Intestina, Ventriculus, Sinus atrabiliaris, vacua via urinae, perpetuo madent vapore humido, neque tamen in guttas confluentes.

[27] In cute cranii humani observavit, saccum ex ea cute factum, &, postquam clausus est. immersum aquae, recepisse aquam in cavitatem suam. *de sang. mission. p. 144.* Sed, **MORINUS** vidit ventriculum aqua repletum & firmiter clausum, exinaniri; vel vacuum, immersum aquae, hanc recipere; & demum, postquam inversus est, aqua repletum, eam eodem modo dimittere *Mem. de l'Acad. des scienc. 1701 p. 261.* Quorum experimentorum ultimum huc non facit, & reliquorum efficaciam minuit. Sed vid. **INST. MED. CCCLXXXV.** & simile experimentum duplex **VIEUSSEN. nov. vass. syst. p. 30. 34.** in quorum illo quidem, spiritus vini in ventriculi vasa se ex ejus cavo subduxit, atque omenti etiam venas tinxit, in hoc ex universo ventriculo omnis spiritus vini evanuit.

[27\*] Argentum vivum in ossibus tibiae & capitis repertum, & ad duarum unciae pondo.

ti humanae adplicatae resorbentur, & in omnes partes corporis integra efficacia sua distribuuntur. Et evidentius in argumento nostro testimonium est RUYSCHIANAE CERAE (28), quae supra valvulas (28\*) venis impulsæ, in caveam ventriculi se penetrat, eadem, aut majori copia, ac si inpelleretur per arterias. Idem vidit BOERHAAVIUS in pueri manu, quae rorem ceraceum per innumerabiles venosos porulos emittebat. Et his ipsis valis debetur ea recreatio, quae in manducatione ciborum adeo subita percipitur, LXVIII. sub fin. Ut possit utcunque excusari PARACELsus (29), qui, qua erat in augendo miraculo experimentorum poetica libertate, adfirmavit, veteres Sophos, manducando cibos, nulla parte deglutitos, vitam aluisse. Qualis est vulgaris illa historiola de DEMOCRITO (30), quem cum natus esset annos centum & quinque, soror, ne moreretur intra Thesmophoria, atque solennes cerimonias luctu turbaret, per triduum recentis panis odore dicitur sustentasse. Viden-

PETRUS CASTELLUS apud WEPFERUM *de Apoplexia*. p. 277. &c.

[28] Non succurrit locus. In ALBINIANIS *præparatis*, ut vocant, sæpe vidi.

[28\*] Non necessaria conditio. In vena Portarum humana valvulae defunt. CXXXII.

[29] PARAMIR. L. III. Tr. IV. & in *Tract. de origin. morb. ex Tart.*

[30] DIOGEN. LAERT. L. IX. p. 572. ed. HENR. STEPH. annos numerat centum & novem.

dentur omnino? subtilissimae venae (31) reorbere id, quod in cibo vaporis instar mobile est, infundere Lymphaticis vasis (32), unde ad venas rubras, cor, & arterias, ipsumque cerebrum breve iter est, quo absoluto, jam effecta est summa recreatio per univ-  
sum corpus humanum.

### §. LXXXVIII.

*Calor*] Post GALENUM (1) Medici ad unum omnes tradiderunt, Ventriculum solo calore cibos coquere in alimentum: atque ventriculum comparaverunt cum lebetes, cui foci loco esset calor a Corde, Liene & Hepate affatim additus. Eos aptissime refutavit HELMONTIUS [2], praecipuo in primis argumento, quod sanguis voracissi-  
mo-

[31] Earum necessitatem adgnovit olim WILLISIUS *Pharm. rat.* S. I. c. 1. §. 24.

[32] Quae maxima in ventriculo vidi. An hac lacteae illae venae Ventriculi, visae RHODIO *Obs. post Histor. Barthol.* no. 31. & WHARTONO *adenogr.* c. VIII. & apud GLISSON. *de Ventric. & Intest.* c. V. p. 135. VESLING. *Epist. posth.* p. 62. Quae & nobis suspectae sunt, & negatae post experimenta plurima a IO. HENR. PAULI in *anat. Bils. Anat.* p. 313. BRVNNE-RO de *Duoden.* p. 61. DRELINCOURT. *Canicid.* XI. p. 693.

[1] *De usu part.* L. IV. c. VIII. *de facult. natu-  
ral.* L. III. c. VIII.

[2] In dissertatione, cui titulum fecit, *calor effi-  
ca-*

morum Piscium [3], exiguo excessu aqua calidior sit,, Digerunt vero pisces alio modo quam homines. Cibus enim eorum diu in ventriculo stagnat, & sensim demum deliquescit. Iis nempe plurima bilis est, & in universum, quo magis pisces respirant, eo minorem bilem habent. Dissolvuntur autem facilius pisces a voracibus piscibus deglutiti, quia pisces ex propria indole facile putrescunt & in mucum resolvuntur. Deinde, quod nunquam visus sit cibus in liquorem chylo similem parari (4) solo calore,, quod in febre (5), cum validissimo calore, adsit ciborum summum fastidium, aliisque rationibus ex rei natura depromptis.

*Acor*] HELMONTII [6] haec est haeresis,

*caciter non digerit, sed excitative, perquam certe acute scripta.*

[3] l. c. §. XI. excepto nempe cetaceo genere. Testudinum sanguis aqua frigidior. STUBBS *Journ. in Transf. Phil.* 27.

[4] l. c. §. XXVIII.

[5] l. c. §. XVII. XIX. XIX.

[6] Acidum facere ad ciborum concoctionem, ipse GALENUS ex conjectura proposuit, excrementum melancholicum ad ventriculum ferri, & ex natura sua acida & austera contractionem fibrarum promovere, *de usu part.* L. IV. c. VIII. L. V. c. V. quo sensu acido coctionem cibos tribuit ipse RIOLANUS *Anthropogr.* L. II. c. XX. Primus vero fermenti locum habere, & solvere cibos ad menstrui chemici modum, docuit HELMONTIUS.



fis, quam adoptavit SYLVIVS [7], &  
 omnis secta *Chemico-Cartesiana*, quod nem-  
 ,, pe ciborum coctio fiat per efficaciam  
 ,, fermenti acidi (8), cujus equidem natu-  
 ,, ra, diversissima ab omni vegetabili aut  
 ,, chemico acido, fit acidum humanum &  
 ,, specificum (9), & quod ejus fermenti  
 ,, viribus, cibus in Chylum fiat, & vita-  
 ,, lem characterem (10) accipiat, & quod  
 ,, id ipsum acidum adspiret ex Liene in  
 ,, Ventriculum per vas breve (11): ,, Ad-  
 debant similitudines, aurum solvi a nullo  
 spirituum acidorum, nisi a solo spiritu salis,  
 qui in argentum careat efficacia &c. Infi-  
 nita sunt, quae contra eam sententiam dici  
 possunt. ,, Vasa brevia venas esse (12),  
 fan-

[7] Sed is, post inventum sanguinis motum in  
 circulum, non a Liene deduxit fermentum  
 suum, verum a saliva, aliquando adeo  
 acida, ut dentes stupefaciat. *Disp. Med.*  
*I. & Prax. Tr. V. app. p. 713.*

[8] *Sextupl. digest. §. 2. 3 4. 11. 12. 13.*

[9] §. 14. sapientior iis, qui chylum conficere  
 laboraverunt per efficaciam spiritus nitrī  
 LOWTHORP. *Abrigdm. III. p. 106. seqq.*

[10] Animam sensitivam in stomacho habitare  
 p. 450.

[11] *Sextupl. digest. §. XI. p. 168. Pylor. Reclor.*  
 §. 26. p. 185. &c.

[12] EX DRELINCOURTIANIS experimentis  
 constat, vas breve, ligatum ad lienem,  
 tumere, ut pene crepet, inter ventricu-  
 lum & Lienem, ad Lienem ergo sangui-  
 nem deducere *Canicid. VIII. Valvulas ta-*  
 men

sanguinem vehere a ventriculo ad Venam splenicam, a vena splenica ad Ventriculum nihil revehere. „ Sanguinem acidum (13) non esse, generare salem medium ammoniacalem, omnesque humores ex sanguine generatos dare meros sales lixivos volatiles. Fermentationem (14) nunquam in ventriculo visam esse. „ Falconem (15), aquilam

men habere vix crediderim HIGHMORE, pingenti ex cane T. VI. p. 61. Neque enim in Vena portarum unquam valvulas vidi, & cera ramo cuicunque mesenterico injecta, redit ad ventriculum per vasa brevia. Sunt nempe venae, comites arteriarum LXXVII. not. 14. a ventriculi sede maxime gibba, ad splenicam venam redeuntes. EVST. T. XXVII. f. II-IV. VESAL. L. V. fig. 14. 15. lit. g. SPIGEL. L. V. Tab. I. R. V.

[13] LXXVII. not. 28. &c.

[14] Fermentationem, in ventriculo canino factam, excitat ex WALAEO (apud BARTH. p. 763.) LISTERUS de humor. p. 151. spumamque, quasi a lotricibus sapo cum aqua intritus fuisset: & erat omnino bilis cum liquore Gastrico agitata motus peristaltici efficacia. conf. CI. not. intestini.

[15] LXXVII. not. 27. Acidum visum in Struthiocamelo adfirmat FECHLINUS de purgant. cap. V. p. 74. Sed repugnant experimenta VALISNERII, autoptae: & in aliis animalibus MUSGRAVE ventriculi succum alcallescere vidit Phil. transf. n. 162.

lam, lupum, alia voracissima animantia, etiam magis quam reliqua ad alcalinam naturam declinare. „ In lamiae ventriculo ab ipso BOERHAAVIO visum esse piscem dissolutum, natantem in muria foetida, mucosa, alcalescente. „ Casuarium, avem ipso struthione voraciorem, non acidum habere in ventriculo, sed falsum liquamen. „ Homines qui nunquam acidum eructant [16], efficacius appetere cibos & distere, „ in animalibus per biduum jejunis, media sua parte apertos Ventriculos ostendisse liquorem mucosum, falsum, acrem, ex Bile, Pancreatio succo & saliva mistum. „ Sed etiam hominibus jejunis, sanissimis, regurgitare, non acidum liquamen, verum falsum cum amaritie, unde CELSUS, famelicis bilem nasci.

*Acido*] Acida non adeo noxia sunt in corpore humano, quam quidem placuit recentioribus medicis. Superantur exiguo momento additi sales lixivi. Ita demonstravit

[16] Vel solis carnibus aluntur, Lappones [L.I.], Groenlandi. Imo vero validiores fieri LEEUWENHOECK *Epist.* CVI. p. 189. cujus rei manifestum argumentum est in animalibus carnivoris, ut quae robore omnibus praestent, Leone &c. & in ipso bove non adeo acescentia, quam putredo in tertio ventriculo observatur, quae foetore se prodit, facitque, ut is Romae in cibum non veniat. PAYER. *de rumin.* c. IV. p. 140.

Stravit HOMBERGIVS (16†) uncias quindecim fortissimi aceti, nonnisi tres acidi falis drachmas continere. Saturantur enim uncia una falis tartari, ita ut pondus falis medii, ex utroque conjuncti, tribus drachmis augeatur, reliquum omne sit aqua. Prodest vero adpetitui acidum, quatenus destruit salem alcalinum, qui appetitum prostermit. Si vero bilis inertia faciat, ut appetitus ciborum langueat, tum vero nocent acida, & profunt alcalia, sal volatilis oleosus SYLVII, tinctura myrrhae, essentia absinthii, horumque similia. Si nimis visceri fuerint, tunc vero omnia salium genera ad digestionem faciunt, five acida, five alcalia, five media fuerint. Adeoque neque perpetuo adpetitus ab acidis restituitur, neque potest ex eo experimento acidum fermentum demonstrari [17].

*Sal-*

[16†] In uncia una olei vitrioli, sunt falis acidi drachmae quatuor & grana quinquaginta sex; in uncia spiritus nitri falis acidi, sunt drachmae duae & grana viginti octo. In uncia spiritus falis; drachma una & grana quindecim. In uncia aceti destillati sola grana octodecim *Memoir. de l' Acad. des scienc.* 1699. p. 75.

[17] HELMONTIUS *sexupl. digest.* §. 12. p. 168. MOLINETTI *Diff. Anat. Phys.* L. VI. c. 2. VERHEYEN. & alii, hoc argumento acidum fermentum defenderunt. Res, nisi, fallor, eo recidit. Requiritur perpetua proportio inter cibos alcaliscentes & vegetabiles. Qui *alcalescentibus*



*Salsus*] In homine non adsueto, post jejunium paulo longius protractum, & mane a somno, adscendit per fauces humor subflavus, amaricans, si carnes aut pinguis novissime adsumta sint, acidus [18], si lac aut vegetabilia; submucidus, maxime si corpus incurvet homo, & resistantiam a pondere imminuat. Amaricies a bile est, quam dudum jejunis in ventriculum venire **CELSUS** dixit. Idem in brutis [not. ult.] &

bus uberius utuntur, carnibus, pinguitudine animalium &c., ii, nisi acida robustiora misceant, vina, aceta, cito nauseant. Neque existimo acida suscitare appetitum, nisi adsit ubertas ciborum alcalinorum, aut bilis abundet, aut pituita nimia obducatur papillas. Unde fit, ut ad plerasque de causis debilis appetitus, amara praestent acidis: Et, si acida abundant, in pueris, virginibus, ipsi acidorum adversarii, & princeps eorum chalybs, restituant cibi amorem.

[18] Eo experimentum **HELMONTII** pro acido fermento citatum; Quando post 20. horarum jejunium, rheda vectus, acidum liquorem, & dentes stupefacientem eructavit *Sextupl. digest.* §. XLI. p. 173. & Pituita acida a navigantibus evomitur **CELSUS** de *re med.* I. c. III. p. 27. *ed.* 1713. Sed is ipse liquor, alias nidorosus est, alias salsus muriaticus **EPH. NAT. CUR.** Dec. III. ann. I. p. 127. alias amarus, ipsa admista bile, in iisdem navigantibus. **CELS.** l. c.

& eadem in utroque natura, mista ex Bile, succo Pancreatico, gastrico, & reliquiis ciborum in Ventriculo haerentibus: expellitur vero sursum efficacia musculorum abdominis, quoties ea via liberior est Pyloro, clauso, aut constricto.

*Famem*] Mirabilis est is sensus, quem Famem dicimus, non omnino cum dolore idem, neque tamen eo mitior, adeo certe crudelis, ut matres in propria viscera arma-verit, atque adegerit, ut fercula nefanda ex prole sua pararent (19). Is ipse, adeo dirus sensus, a benigno creatore sapientissime datus est mortalibus, ut eos moneret (20) de imminente periculo ex putredine alcalina [22], quam humores nostri repetito motu concipiunt, cito destructuri corpus humanum, nisi, recente chylo & minus alcalescente diluti, mitigentur. Et idem ex providentia  
Crea-

[19] Samariae REGUM II. c. VI. v. 28. 29. HIEROSOLYMAE in obsidione TITI, in oppido SANCERRE narrante LER-  
RYO.

[20] Non de inanitate venarum, quae post GALENUM de *Ufu Part.* L. IV. c. VII. recepta fuit sententia; sed de certo atque determinato excessu alicujus acrimoniae in sanguine. Post muriaticorum salium ubertatem, nautae desiderant acida, acetosam, limones. In nausea ab acidis, cretam & absorbentia &c.

[22] In omni pene febre, quando & primae viae & sanguis ita male habent, ut alimentum in iis degeneret.

Creatoris deest, quoties ex cibo nasciturus esset morbus (21), vel quoties vires vitae non pares sunt subigendo alimento (23). Alter finis est famis, ut restituatur id, quod per SANCTORIANAM [24] perspirationem corpori perit, atque nova materies separando corpori subpeditetur. Hi fines sunt. Causae variae. I. Ventriculus vacuus, adtritns tamen perpetuo motu, confricat

[21] Quare ex hac ipsa humorum putredine ferocitas & furor in famelicis LERY *Voy. d' Amer.* p. 409. haemorrhagiae narium, post diem tertium, & mors die octavo, aut nono, etiam quinto, NEPOS in *vit. ATTICIANI* *med. ant.*

[23] In omni languore, moerore, cachexia &c.  
 [24] Sed ea necessitas lentior est. Est utique Perspiratio librarum quatuor vel quinque intra viginti quatuor horas INST. MED. CCCCXXVII. Sed ejus pars magna a cibis est, quare diutius a pastu SANTOR. I. 56. III. 76. & per inediam procul dubio exigua est Perspiratio, ib. 86. Deinde licet DIEMERBROECKIUS *Anat. L. II. c. XII. p. 299.* venas vacuas viderit, in homine qui fame enectus fuerat, neque recedat observatio HARTMANNI *EPH. NAT. CUR. Dec. II. Ann. VII. Obs. XVlll.*; contrariae tamen sunt observationes LOSSAV in *Maria* JEHNFELS, & LENTULI in *Apollonia* SCHREYER, in feminis, quae per multos annos inediam toleraverunt, non eo minus sanguine plenae & boni habitus.

fricat nuda juga (25), nervis nudis plenissima, super obposita, & similia juga: inde fit sensus ingratus violatarum papillarum. II. Acris natura liquorum, qui in ventriculo continentur, salivae [26], succi gastrici, & retrogradae aliquando bilis (27), atque salivae pancreaticae (28). III. Reliquiae (29) cibi prioris ex propria indole, in acrem,

- [25] Inde in ventriculo aviculae fame eneciae effusus sanguis EPH. NAT. CUR. l. c. An a jugorum defectu minor famis sensus, & longa patientia inediae in serpentibus & piscibus?
- [26] Bonus VERHEYENUS, ut demonstraret, quod saliva famem non faciat, dormiit incoenatus, mane omnem salivam exspuit, nihilo segnius acriter appetiit & egregie pransus est L. II. p. 258. Facile fidem invenit, incoenatum prandere uberius, quam qui probe pastus sit pridie.
- [27] Quae in cane famelico WALAE (ap. BARTHOL. p. 763.) & in homine inedia mortuo mihi copiosa visa est in ventriculo. Conf. INST. MED. XCIX. fin.
- [28] Aut Duodenalis conf. BRUNNER. de Duoden. p. 54. In homine summe famelico & vexato cruciatibus ventris, ductus Pancreaticus duplex. BLAS. *Observ.* p. 57. Conf. INST. MED. XCVII. not. 3.
- [29] Fuerunt scriptores, qui has ipsas ciborum reliquias pro praecipua causa digestionis, & fermento Gastrico habuerunt, GLISSON. de *ventr. & intest.* p. 326. VERHEYEN. L. II. p. 257. Id omnino certum est, acres esse, atque stimulare papillas. conf. LXXVII. not. 40.



acrem, sed variam naturam, degenerantium. Ventriculus enim nunquam evacuatur penitus (LXXXIII.) manet ergo aliquid in spaciolis cellulosis (LXXVII. not. 38.) atque papillas nudas sollicitat. Tollitur Fames I. repleto ventriculo [30] cibis novis, qui naturae scopus est. II. Adsumta majori copia diluentium aquosorum, tepentium [31], vel oleorum, quibus ventriculus ab acribus liquoribus, & a ciborum reliquiis, liberatur. III. Adfectus animi [32] & dirissimus eorum, horror. Si famelico homini unicum granum ovi putridi in ventriculum demiseris, uno momento fames omnis erit sublata, vomitus sequetur, & ejicietur id, quod ventriculum laceffit [33].

*Tu-*

[30] Cibus recens ingestus obruit reliquias acres prioris, interponit se jugis ventriculi, & clauso Pyloro, avertit uberem influxum Bilis, succorumque intestinalium. Idem sanguinem blandiori chylo mitigat. Quare Nutricibus, quibus lac flavum & rancidum fit ab inedia, acescens denuo & mite reditur post pastum. [INST. MED. DCXC.]

[31] Quorum princeps est Thea, inimica fami & coctioni Ventriculi, quae constrictionem fibrarum labefactat, succos solventes eluit. PRAEL. in APHOR. PRACT. LXXV.

[32] BRUNNER. de Gland. Duod. C. IV.

[33] Aequum videtur etiam de siti aliqua verba facere quae fluidorum est appetitus. Finalis causa, ut moneamur de acrimonia sanguinis varia [in scorbuto, febribus] &

*Tumescit*] (34) Ab aere incluso cibus, & a putredine.

*Omentum*] Ut interponat se peritoneo. (35),

spissitudine (in hydropse, febribus aliis) & praesente in Ventriculo atque Oesophago siccitate aut erosione, quoties liquor mitis & lenissime glutinosus, definit effundi. Sedes, in Oesophago, Pharynge, Ore toto: Sed & in Ventriculo. Quare & fami succedit. Nam Cameli, postquam cellulas ventriculi (LXXVII. 39.) repleverunt aqua, per integras septimanas abstinentiam potus tolerant TAVERNIER *Voy. de Perse* p. 130. Necessitas major, & hominibus quidem ad paucas horas tolerabilis, sequente inflammatione faucium, Ventriculi, Angina, febre, morte. Animalia vero alia fitim diu tolerant, etiam in calidissimis regionibus. STUBBS *Journ. in Phil. Transf. & Abridgm.* III. p. 550.

[34] Ab aëre elastico, qui ex fermentantibus cibus generatur loco calido. [LXIX.] Quare, dum tumet ventriculus & comprimit aortam arteriam pone se positam, moratur sanguinis in abdomen descensum, auget eam portionem, quae in caput & pectus distribuitur. Inde a pastu torpor, in omni animale, & rubor faciei. Adeo vero repletur ventriculus ut etiam crepet, quod in suis visum est, & veterinarii brachio inmisso in boum ventriculum, gramina eripiant, ne pereant distenti WEPFER. apud PEYER. *Merycol.* p. 275.

(35), ne ventriculus admodum tumens adfricetur ad resistens abdomen cum suo incommodo. Id ne fiat, praestat mollissima, quae interjicitur, pinguedo.

§. LXXXIX.

[35] Verius, quam quidem ipsi forte BOERHAAVIO visum. In magna enim ventriculi distentione, peritoneo obvertitur curvatura major Ventriculi, ex qua nascitur Omentum WINSLOWI. *Mem. de l'Acad. des Scienc.* 1715. p. 317. Utilitas major, vaporem exhalare, & frictionem mollire, quae adtrito ad resistens Peritoneum Ventriculo oriri potest. Altera, ad praestandum calorem, de quo vulgatum est experimentum GALENI de *usu part.* L. IV. c. IX. Sed & alterum omentum minus WINSLOWI curvaturae minori adpositum, quod in voracissimis animalibus magnum, & pingue adest. In *Catopardo* PARISINI *Dissect. des anim.* p. 52. Vid. XCV. not. 3.

[36] *Umbilicalis, in Text.*] Quae ex fissura hepatis descendens pone Peritoneum transit ante initia Pylori [SPIGEL. L. VII. Tab. II. III.] & cum ambeatur multo adipe, & ibi calorem augere, frictionem vero minuere potest.

[37] *Excipiens, in Text.*] Inde mutationes spontaneae alimentorum §. LXXVI.


[38] *Humores, in Text.*] Succum gastricum arteriosum WILLISIO ex conjectura notum *Pharm. rat.* cap. II. §. XXIV., de quo §. LXXVIII. & Salivam §. LXVI.

[39] *Musculi, in Text.*] Conf. LXXXI.

[40] *Adjacentum, in Text.*] Conf. LXXXVI.

## §. LXXXIX.

*Vacuus*] Saepe diu in ventriculo manent; quae ingesta sunt. Crassae alimentorum partes in ventriculo porci post triduum viscae sunt. Id facit angustia pylori, qui vix calami scriptorii latitudine patet. Quare multos ventriculi morbos solo jejunio 24 horarum superare possumus, maxime, si post id jejunium multum aquae mulsae, vel falsae superbibamus, qua alvus repurgetur (1).



## ACTIO INTESTINORUM IN INGESTA.

## §. LXXX.

Intestina perficiunt exquisitius, quod in ventriculo rudius inceptum est. Et tenuia quidem chylum conficiunt, atque ab excrementis separant; Crassa excrementa mutant, recipiunt, & excernunt. Neque enim unquam aut chylus in crassis intestinis, aut foetida excrementa in tenuibus reperiuntur.

[1] Vacuum vidi in fele, homine, in piscibus plerumque vacuus est, cibos certe non continet WEPFER apud PEYER. *Rumin.* p. 271. Etiam tunc vero continet, bilem, succum salivofum, gastricum & mucum. Conf. LXXXIII. LXXXV.



tur (1\*). In iis actionibus considerata sunt Intestina 1. tamquam canalis, recipiens cibos & continens. 2. tamquam organum secretorium liquidorum variorum, quae ad cibos adfluunt; 3. tamquam musculus cibos conprimens Denique 4. considerata, quae ab aliarum partium efficacia chylo in intestinis accidunt. Huc referenda est admittio bilis, succi pancreatici.

## §. LXXXI.

*Papillosa*] Si ventriculus recens, vel intestinum, invertatur, ut tunica villosa exte-

[1\*] In tenuibus Intestinis fere ab initio flava, spumosa, liquida massa reperitur, quae in progressu & cinerea fit, & viscida. Faeces alvinae vix in tenuibus intestinis reperiuntur, ne in foetu quidem.

[1] *Tenuium, in Text.*] Sed & crassiorum: Iis villosam tunicam denegavit BRUNNER. de *Gland. Duod.* p. 61. minus certe evidentem, cum brevior sit & papillae rariores. Vide ad Colon Intestinum RUYSCH. *Thef. Anat. Aff. II. no. IV. p. 19. no. XI. p. 22. Thef. V. no. 101.* In Intestino recto id. *Thef. VII. T. III. f. 4. &c. Epist. T. XII. f. 1. 2.*

[2] *Prima, in Text.*] Nemo enim hucusque epidermidem continuatam in Ventriculo & intestinis vidit, praeter RUYSCHIIUM *Dec. Adv. Anat. III. p. 34. Thef. Anat. VII. no. XL.* qui *Epithelium* vocat [confer KAAUW. §. 109.] atque PRICE  
Y 5 Phil.

terior fiat, deinde elotus suspendatur in aqua tepida, adparebunt per omnem superficiem emi-

*Phil. Trans.* Vol. XXXV. n. 404. MONROUS vero ipsam villosam pro cuticulae continuatione habet, *Act. Edinb.* IV. p. 79.

- [3] *Villosa, in Text.*] Multo quam in Ventriculo distinctior: Primum dicta & satis recte cognita, observata directione villorum, FALLOPIO *Obs. Anat.* ed. LUGD. BAT. 739. 743. a WILLISIO donata tunicae nomine. [*Pharm. Rat. C.* II. §. 28.] qui & utrumque villorum genus perspicaci conjectura adsecutus est. (ib. §. 24.) Depictam a SWAMMERDAMIO (apud PECHLIN, *de purgant.* T. II. f. 3.) uberius examinavit BRUNNERVS: qui villos descripsit „esse tubos membranaceos, „quibus involvantur vasa alias bina, alias „singulo ostia patentia (*de Duoden.* p. 61.) quorum alia ducunt ad Venas Mesentericas (in anfore) alia ad vasa lactea (in cane p. 56) Neque recedit haec villorum fabrica a PRICEANA l. c. Denique RUY-SCHIUS, docuit, villos continuari vasculis arteriosis, (*Thef.* I. 39. 40. 41. *Thef.* VI. p. 28. 33. *Thef. max.* CXIV. BOERH. *Epist. Anat. de Fabr. Gland.* p. 37.) alias venosis ALBIN. *de Int. tenuib.* 23. utrisque demittentibus ceram in Intestinorum caveam excolorem EPIST. XI. &c. Quam sententiam exquisite confirmavit HALES *haemastat.* p. 120. 121. 123. & nobis aqua quidem tam facillime subire visa est Intestinorum cavitatem, & per arterias, & per

per venas, ut PECHLINI contrarium experimentum non moremur. *De purgant.* p. 308. Quo pertinent, sanguinea puncta ex laesa villosa tunica, exsudare visa GLISSONIO *de Ventric. & Intest.* p. 243. &c. & sanguineae diarrhoeae, aliquando salutares RHOD. *Observ.* 85. *Centur* II. & sanguis ex alvo hydropici SCHRADER. *Obs.* 4. *Dec.* V. Atque ex ALBINI & nostris frequentibus experimentis clarissime mihi adparuit, venosos quidem villos majores esse, & numero superare, ut villosa tunicae triplo pulchrior fiat, si per venas injecta sit, eosque modo solitarios esse, modo ex pluribus compositos. Et hos quidem corruptos, vidisse HELVETIUM atque depinxisse pro papillis spongiosis, *Mem. de l'Acad. des Scienc.* 1721. omnino videtur. Potuerat mentem suam ita proposuisse, ut villos contra omnium Anatomicorum consensum & oculorum fidem non negaret. Sed cur easdem habet WINSLOW. IV. 122? An quod earum sit Auctor? Omnes autem liquet veros esse tubulos, cylindricos, ex nervea membrana ad perpendiculum educitos intra cavum Intestini, lineae longitudine, ultra quoseducta cera levi lentis opera facile distinguitur. Et videtur, GALEACIUM non vidisse eorum oscula, quod non repletos observaret *Comment. Acad. Bonon.* p. 360. Longe magis miramur, villos habitos esse a LEEUWENHOECKIO pro musculis *Arcan. Natur. detect.* *Epist.* LIX. *Epist.* II. p. 61. Miscentur hisce villis Papillae (*not.* 4.) folliculorum minorum (*not.* 8.) & glandularum agminatarum (XCII.) oscula.

eminentes Papillae (4). Earum in objectis a RUYSCHIO donatis, aliae cinereae, aliae rubrae, aliae demum albae, nerveae, flocculorum similes adparent. Inter eos enim villosi sunt arteriolae, & venulae, & nervi, & vasa lactea.

*Cinerei*] In optima nempe valetudine. Nam in inflammatione (5), & in penitissima repletione (6) vasorum, quae artificialis est inflammatio, tota penitissime rubet..

*Aquosis*] Per quas ultimae arteriae humorem (7) suum in cavitatem Intestinorum depluunt

[4] HARDERUS olim glandulas BRUNNERI pro papillis habitas esse a PEYERO narrat in EPH. NAT. CUR. Dec. III. Ann. Obs. XCVI. RUYSCHIUS autem non in Ventriculo solum, sed in Intestinis, papillas oblongas, villis similes, modo solitarias, modo confusas observavit *Thef.* VII. n. XL. & ideo villosam Membranam *Villo-Papillosam* vocat *Thef. max.* LXIV. LXXXV. Conf. *Adv.* III. n. X. Alibi monui, suspicionem esse Ill. ALBINI, quod hae ipsae papillae sint villi venosi inanes. Ab HELVETIANIS longissime distant, licet & HELVETIUS & FONTENELLIUS *hist. de l'Acad. des Scienc.* 1721. p. 36. ad eum consensum provocent.

[5] Stigmata rubra vel nigra in tunica villosa, a veneno. WEPFER. *de cicut. aquat.* p. 144. 155. &c.

[6] RUYSCH. *Thef. Anat.* IV. §. XXXVII.

[7] Conf. *not.* 3. PECHLINUS ligato hinc & inde Intestino, hunc liquorem vidit ea copia exstillare, ut distendat intestinum, salsum



pluunt, adeo dense congestae, ut vix sedes oculo possit dignosci, in qua non porus aliquis apertus hiet.

*Grandibus*] RUYSCHIIUS (8) ante hos quadraginta annos, cum intestina humana, quorum vasa materia ceracea repleta erant, diu

sum & similem succi Pancreatici *de purgant.* p. 509. 510. & T. IV. Existimabile est, hunc liquorem non organis solum & natura, sed officio convenire cum Succo Gastrico, & tanto maiorem efficaciam habere in parando Chylo, quanto Intestina ventriculo majora sunt, & ipse copia superat. Ut mirum sit, inter causas digestionis, succum Intestinalem fere omitti.

[8] Hos in Recto intestino depinxit RUYSCHIIUS *Thef.* VII. n. 66. T. III. f. 4. *Epist.* XI. T. I. & descripsit *Thef.* IX. p. 60. n. LXXXI. ex colo vero *Thef.* V. n. 101. diversos a Glandulis PEYERI & propagines glandularum simplicium, ubique vero *Epist.* IX. p. 12. quae etiam, de his ipsis glandulis, est theoria MALPIGHII *Epist. de gland. conglob.* p. 16. Eosdem a Villis, atque Glandulis BRUNNERI & PEYERI distinxit & fusc. descripsit GALEACIUS, „poros grandes, in universis Intestinis obvios, ducentes in glandulas simplices, minores quam ostia glandularum PEYERI „ v. *Comm. Bonon.* p. 360. & f. 1. 2. 3. ad p. 370. Huc videntur pertinere glandulae tunicae villosae WILLISII T. VI. ad EE.

[9] *Lacteorum, in Text.*] Quae ostia patentia intra Intestinatorum cavum paucissimis Anatomicis videre datum est. De spongiosis

pa

diu elueret tepida, vidit in tunica villosa Intestinorum insignes poros, sibi eo tempore ignotos. Eos BOERHAAVIUS in Intestinis manu RUYSCHII praeparatis, diu & saepe examinatos, vidit esse folliculos, in quos arteriae deponunt proprium liquorem, tamdiu adservandum, donec mora ipsa factus viscidior, ad suos usus quasi emungatur. Tota interna superficies intestinorum perpetuo madida est, & si abstergeris, renascitur aut sponte sua, aut levi pressione, lubricus humor.

*Jejuno*] Tunica interna, supra insertionem ductus choledochi fere triplo longior est

papillis HELVETHI l. c. p. 402. & folliculis SANTORINI *Obs.* c. IX. §. 10. p. 171. multae sunt dubii legitimi rationes. DUVERNOYI oscula, in inferiori crepidine valvularum conniventium (*Act. Petrop.* l. p. 266.) suspicionem movent, annon glandularum ostia viderit, apud J. G. PAULI ex BRUNNERO notata (in *van HORNE microsc.* p. 47.) vid. J. H. PAULI (in *Anat. Bils. Anat.*) & BRUNNER (de *Duod.* p. 56.) Villi lactei magis videntur probabiles, sed neque repetiti satis, neque ex homine, nisi alba filamenta WINSLOWI IV. 114. eo pertinere velis. RUYSCHIUS certe (*Decad. Nnat.* II. n. IV. p. 10.) & LISTER. (*Phil. trans.* n. 143. p. 6. apud LOWTHORP. Vol. III. p. 102.) & LEUWENHOECKIUS (*Arcan. nat.* Vol. II. Ep. LIX. p. 57.) de osculis vasorum Lacteorum desperaverunt.

[10] *Aquoso, in Text.*] Accedente ad serum sanguinis, nam in fervida coagulatur, instar gelatinae PECHLIN. de *purgant.* p. 511. BRUNNER. de *Duod.* p. 54.

est (11), quam nervea, infra eum ductum etiam sextuplo [noncuplo & decuplo in intestino Jejuno FELDM.] maxime cum tunica Nervea (12) vi contractili & frigore con-

[11] VOX FALLOPII, a quo WILLISIUS. Incerta proportio & inaequalis.

[12] *Fuga Intestinorum, valvulae conniventes* KERKRINGIO dicta, perperam & injuste, dicta sunt accurate a FALLOPIO *Observ. Anat.* ed. LUGD. BAT. p. 743. ,, & plicae sunt, a nervea portione exigua [WINSL. IV. 110. RUYSCH. *Epist.* XI. p. 7.] ut pene tota villosae sint RUYSCH. *ibid.* obliquae, longiores, breves, interruptae, ora varie plicata RUYSCH. *Epist.* XI. T. XII. f. 3. nunquam circulares, aliquando decussatae, raro longitudinales RUYSCH. *Thef. Anat.* I. *Aff.* I. n. VIII. Initium in Duodeno, Jejuno plures, GLISSON. l. c. c. XI. §. 8. p. 209. Ilco pauciores. Flatu & exsiccatione parantur in membranas lunatas, rigentes, arcusque circulares veros, quae encheiresis KERKRINGIANA *Spic. Observ.* XXXIX. novi nominis causa fuit, & naturam valvularum insigniter mutat. Sibi enim relictæ, molles sunt & huc atque illuc facillime cedunt, ab omni musculari fabrica admodum remotæ, neque certe proprio motu cibum moliturae, uti visum est PERRALTO *du mouvem. peristalt.* Vol. I. *Oper.* p. 59. edit. LUGD. BAT.

[13] *Vasculosa, in Text.* ] Non vasculosa, quam vocant, tunica, quae eadem est cum nervea XCII. *not.* i. sed fines vasculorum ex rete vasculorum quod est in cellulis vasculosae.

constringatur, Villosa vero, flaccida perpetuo, collabatur in rugas, eo ampliores, quo intestina minus distenta sunt, evanescentes, quando flatus fortius adigitur. Ad finem Jejuni juga imminuuntur, & tunicae internae ratio ad reliquas cum rugis decrescit. Sunt autem eae rugae majores, qua parte intestina ad mesenterium adnectuntur, cum in curvatura qualibet ea pars magis adstringatur, & plicetur. Neque orbicularia sunt, sed quarta, vel tertia pars orbiculi: & defectum arcus alicujus arcus vicinus supplet; atque adeo intestinalis fistula in tot portionculas dividitur, quot valvulae sunt, & per eas omnes capsulas chylus successive trajicitur.

*Glandulosa*] In ea nempe sitae sunt lacunae sive folliculi glandulosi, qui rectius ad nerveam (14) referri possunt (*not.* 8.)

*Remora*] Inter juga, & rugas ad invicem adtritae, atque deorsum motas saepissime, aliquando sursum, agitantur vario modo alimenta, quibus iter citum deorsum non permittitur. Quae rugae nisi aessent, recta via descenderent omnia, non mutarentur, & fieret Lienteria (15). Efficaciae harum

ruga-

losae. Eorum ultimi termini, qui villos faciunt exstant apud RUYSCH. *Epist.* XI. T. XII. f. 4. WINSLOW. IV. 114. 115. ALBIN. *Spec. de hist. Intest. ten.* §. 18. LEEUWENHOECK. *Epist.* LIX. p. 54.

[14] Cui arctissime cohaeret RUYSCH. *Epist.* XI.

[15] Laesa concoctio ex deletis ventriculi rugis BONNET. *sepulchr. Anat.* L. III. sect. VI.

Obs.



rugarum debetur, quod de libris decem aquae spadanae uno mane sumtae, ne gutta quidem alvo elabatur, sed ea omnis aquae vis per vasa resorberi, & per venas secerni debeat. Vidit BOERHAAVIUS hominem, qui aquae spadanae libras septem cum semisse adsumebat quotidie, & vix octavo quoque die alvum deponebat: ut omnino adpareat, intestina sani hominis clausa esse & facilius humorem in venas resorberi, quam ad anum pergere.

*Lubricatio*] Intestinorum motus nunquam cessat, dum vita superstes est; & ab ipsa morte (16) exempta abdomine, super mensam repunt. Itaque perpetuo ad se invicem confricantur sensilissima, & oriretur dolor non tolerabilis, si nudae valvulae nudas val-

vu-

*Obs. VIII.* & certum est in iis animalibus, quibus brevissima sunt intestina, foetida & fluida excrementa esse, cum voracitate insigni, ut in viverra, mustela, vulpe, GREW *compar. anat. of the guts* ab init. In Gulone intestinum uniforme & simplex BARTHOL *histor. 31. centur. IV.* Quibus longa, & cellulis profundis exsculpta, iis dura & ficca, & globosa excrementa, ovi, caprae, lepori, cuniculo; Plura vid. XCV.

[16] Repetita experimenta exstant WEFFER. *de cicut. aquat.* p. 162. 199. 209. 251. 253. 297. neque testem citare necesse est, cum in plerisque animalibus, donec paulatim refrigerata pinguedo rigeat, is motus facillime a morte possit oculis usurpari.

vulas contingerent, neque interponeretur mucus (17), ex cryptis & glandulis varii generis expressus. Eaque ratione fecit NATURA, ne intestina ab ingestis cibis adterantur, cum in omni puncto superficiei liquidum excludet, quod intestino, atque cibo medium se interponat, & mucus omnem adtritum solus patitur. Eas glandulas Natura posuit sub musculari tunica, ut emulgeri possint inminente motu peristaltico, eoque remisso paulisper, repleantur denuo. Quando vero mucum hunc improvida medicina deterfit (18), vel abratit dysenteria (19), tunc ab omni cibo acris dolor, & gangraena inminet.

*Ilei*] Ex ea massa alimenti, quae ex ventriculo descendit, velocissime omne id exsurgitur, quod est liquidius: induraretur adeo (20),

[17] Quare in sano quam in aegro is mucus uberior est, & male pro excremento habitus GLISSON. *de Ventric. & Intest.* c. XXIII. §. 10. p. 443. §. 34. p. 460. Ea est pituita albuminis ovorum similis, per alvum excreta, quam miratur STALPART. *van der WIEL. Observ.* 72. *Centur.* I.

[18] Mors ab emetico, cruentata tunica villosa, & sanguine stillante absque laesa vena, GLISSON. *ib.* p. 442. WILLIS. *Pharmac. ration* f. III. C. I. §. 22.

[19] Abrasa tunica interna BONT. *Medic. Indor.* L. III. *Obs.* III. p. 36. Sanguis ex venis mesentericis apertis effluens in gangraena Intestinorum ORTLOF. *Oecon. Anim.* p. 60.

(20), atque per intestina non absque incommodis iter suum faceret. Id ne fiat, facit humor, qui perpetuo per arterias exhalantes adfluit, miscetur alimento, dum in chylum convertitur, atque diluit, ut pergat per intestina moveri, indeque, quod utile est, resorbeatur per venas bibulas, mox refarciendum simili liquido adfluente. Id in Intestinorum initio. Quando vero desinunt exhalantes arteriae, praesto sunt, & augentur paulatim numero glandulae PEYERI, (21) diluentes massam chylo mistam, atque inungunt Intestina. In crassis intestinis similes machinulae succedunt, defensurae| teneram fabricam tunicae villosae. Atque ea quantitas exhalantis liquidi ex eo potest aestimari, quod aqua (22) arteriae Mesentericae injecta, pene tota, intra exiguum tempus per intestina effluat; quod omnium organorum secretoriorum (23) in corpore humano maxi-

[10] Exsugitur ex faecibus in Intestinis tenuibus, id omne, quod utile & chylosum est; sed scybala in iis nunquam visa sunt: id ergo est ab adfluente, & diluente liquido. Sed non diluere solum cibos opinor, verum solvere, uti similis in Ventriculo succus. Inde a callosa tunica interna apepsia QUERCETANUS apud BONNET. *Sepulchr. L.* III. f. VI. *Obs.* II. p. 56.

[21] Congestae demum & frequentissimae in fine Ilei in plerisque animalium. PEYER. *Parerg. I. cap. ult. & fig. III.*

[22] HALEs. l. c. & facillime succedit.

[23] Sint Intestinorum tenuium pedes triginta

ximum habeat; quod Diarrhoeae (24) & medicamenta purgantia (25) mirificam copiam aquarum per alvum expellant.

*Sensus*] Ob numerum papillarum nervearum. Quare homines celerrime pereunt ab inflammatione & excoriatione intestinorum, &, si summa doloris est vehementia, intra unicam horam hominem validissimum interimit. Huc etiam referri potest mirabilis illa sagacitas Ventriculi [26] & intestinorum, in

& tres GLISSON. l. c. 210. & circulus interior tunicae villosae 37, 68. erit superficies villosae tunicae 178, 904, 40. Et si linea quadrata decem villos habeat, erunt villorum 5, 367, 132. Et is numerus triplex est, si Villosa, triplo amplior est quam Nervea.

[24] Aquosae, incruentae, qualem describit WILLIS. *Pharm. rat.* f. III. c. VI. §. 7. p. 58. & POTERIUS *observ.* 62. L. II. quadraginta librarum. Polonus ille apud RHODIUM. *Cent. Obs. II.* no. 85. intra bihorium triginta octo sanguinis libras per alvum critice deposuit, absque noxa.

[25] Una dosi, sed quae duarum drachmarum esset, Gummi guttae, debellatus hydrops omni aqua expulsa EPH. NAT. CUR. *Dec. III. Aan. I* X. p. 57.

[26] Quam non ab acrimonia adeo, quam a mentis vel archaei irritatione explicant STAHL. *Theor. Med.* p. 898. & WEPFER. de *Cicut. Aquat.* p. 100. &c. cum acriora aliquando non tantos motus, quantos definita quaedam & mitiora acria excitent. Nobis videtur fibra omnis ad hostilem acrimoniam



in dignoscendis iis, quae corpori humano inimica sunt, & quae adeo validas convulsiones concitant, ut fursum [ 27 ] & deorsum hostem eliminent.

*Irritatio*] Acrimonia faecum, quam intra viginti quatuor horas concipiunt, tanta est, ut egerendi necessitatem nulla vis animae cohibere possit.

*Constrictio*] Totum corpus humanum ita comparatum est, a sapientissimo ARTIFICE, ut ad contactum acris alicujus particulae contrahant se exigui venularum resorbentium sphincteres, neque quidquam de hostili liquore admittant. Cutis universa, ad adlapsum frigidi aëris, elevatur in innumerabilia tubercula, quia perspirabile coërcetur, clausis va-

scu-

niam se contrahere ( BAC. de VERULAM. de augment. scient. L. IV. p. 309. GLISSON. de Ventr. & Intest. c. VII. p. 170. ) cum post ipsam mortem, ab admoto acri eadem convulsiones excitentur, uti oleo vitrioli in Intestinis ranarum expertus est PEYER. Parerg. I. p. 49. ubi nulla est suspicio de animae efficacia, & discissum Duodenum ita se constrinxisse, ut ductum Choledochum contractum absconderit, vidit PÉCQUET; & ab admissis venenis variis, intestina se contra isse, ut flatus vix magna vi possit stricturas convulsivas superare WEPFER. l. c. p. 91. &c. quod & in Ventriculo factum ibi p. 162.

[ 27 ] Salutari consilio. Ex iis qui cicutam aquaticam adsumserunt, perierunt omnes, qui non vomuerunt; servati sunt, qui vom-

sculorum (28) ostiis. Vesica urinaria (29) ab adtactu spiritus acidi mirifice contrahitur. Sed eadem vis non alteri parti, quam intestinis (30), magis necessaria inest: absque ea si forent, noxiae particulae libere in sanguinem fluere, totumque corpus corrumpere. Ergo contrahunt se ad olei vitrioli adtactum, & vermiculorum instar arctata repunt, in experimentis WEPFERI & PEYERI. Si solus liquor lubricans defuerit, non potest faex alvina per exsiccata sedem trahi, sed constringitur intestinum, & Ileum facit (30\*). Arsenico accepto, ea sedes, quae praesens venenum patitur, constringitur vi magna, hinc coërcitus inter vincula  
aër

tu ventriculum liberaverunt WEPFER.  
*de cicut. aquat. c. VIII.*

[28] Quod eo facilius fit, quia crassities eorum diametrum insigniter superat, LEEVWENHOECK *Epist. Phys.* XLIII. p. 406. f. 1. 2. 3. Confer LISTERUM *de humor. c. XXIX.* p. 295.

[29] Puncta acu PECQUET. *Experim. Anat.* p. 79.

[30] Mechanicam contractionem villorum vidit BRUNNER. *de gland. Duoden.* p. 63. conf. not. 26.

[30\*] Ileum coalitum, inde lethalis volvulus BARTHOLIN. *histor.* 36. *Centur.* VI. A valida constrictione intestini Coli passio Iliaca. BASS. *observ.* 9. *Decad.* III. A cicatrice connatum Intestinum, inde funesta alvi constipatio RHOD. *Observ.* 82. *Centur.* II.

aër (31) tumores enormes, & ex iis gangraenas, excitat. Eadem vero contractione, qua constringuntur venae bibulae, arteriae emulgentur, & liquida diluentia affatim affundunt: In oculo lacrumae; In ore saliva; In Intestinis succus Intestinalis, quorum communis est utilitas, infringendi aëris, atque eluendi, mulcendarum fibrarum excoctarum &c. Si scammonium adsumserit homo improvidus, statim sentient Intestina acrimoniam pharmaci, quod sanguinem vix tegnius quam argentum vivum in liquamen putridum resolvit. Ergo constringuntur valide, & affundunt copiosissimum liquidum diluens, atque exinaniant se, hostemque propellunt, donec omnis ejectus sit. Phaenomena narramus, obscuras qualitates pro causis nolumus adlegare.

### §. XCII.

*Aequaliter*] Tunica secunda non subit duplices rugas primae, sed in rectum protensa simplex educitur.

*Vasculorum*] Adeo vasculosa sunt intestina, ut jures massam cerae esse, qualia a RUYSCHIO donata possidet BOERHAAVE, & meram quidem arteriam, si arteriae repletae fuerint, meram venam a Portarum vena, si ab hepate injectio facta sit, a vena Cava

[31] GLISSON. p. 538. PEYER. & WEPFER. passim. Vide apud STUARTUM alternas in cuniculi intestino constrictiones T. II. f. 3.

Cava vero, si per eam materia sit impulsæ. Et ab his adeo copiosis tunicae villosae vasculis calor in Intestinis conservatur.

Veno-

XCH.

[1] *Alia, in Text.*] Internam membranam Intestinatorum, a carnea & villosa distinxit & *nerveam* dixit ab albo colore, WILLIS l. c. in text. Deinde a VERHEYENO, tum a vasculis quidem uberrimis dicta est *Vasculosa* T. VII. f. 1. lit. D. RUYSCH *Epist.* XI. f. 2. D. tum a glandulis *glandulosa* l. c. E. Eadem facillime, flatu impulso per inversi intestini cavitatem, paratur in fabricam cellulosam, aëre cum vasis, musculosam tunicam penetrantibus, ad *nerveam* penetrante: quod post ALBINUM (*de Int. tenuib.* §. 8-14.) facillimum est factu. Tuncque deponit habitum strictum, solidumque, ob quem *aponeurotica* dicta est HELVETIO *Mem. de l' Acad. des Sc.* 1721. p. 397. ex decussatis fibris (f. 2.) & WINSL. IV. 97. facta, atque migrat in eandem *cellulosam secundam*, quam HELVETIUS tantum suspicatus est l. c. p. 398. & RUYSCHIIUS jam senex descripsit *Cur. post.* CLV. *Cur. renov.* XLl. XXII. Haec membrana productiones exiles in valvulas conniventes inmittit WINSL. 100. RUYSCH. *Epist.* XI. p. 12.

[2] *Tenuis, in Text.*] Imo vero crassa satis & tenax, & firma, & crassissima quidem in Ventriculo, in Intestinis tenuior, coercens carneam, quae flatui non resistit, vera & praecipua basis Intestinatorum.



- [3] *Partem, in Text.*] Arcte cohaeret RVYSCH. *Epist.* XI. p. 7. Urique diversa, si Villosam dicas, congeriem arteriolarum exhalantium, & venarum resorbentium, tota firmior, alba, brevior, exterior, vasa minora & ramosa in retis figuram ordinat.
- [4] *Reticulari, in Text.*] Arteria a Mesenterica, quando venit ad Intestinum, dividitur in duos ramos, WINSL. IV. 229. ALBIN. §. XVII. EVLER. *de Mesent.* p. 28. quorum quivis suum hemisphaerium Intestini conscendit, per tunicam cellulosam primam (XCIV.) migrans, & uno ramo insigni per eam cellulosam repens, ALBIN. *de vas. intest.* p. 4. in convexitate, quae obponitur Mesenterio, anastomosi coit cum ramo socio; CHESELD. *Anat. of the hum. bod.* T. VII. f. 6. T. XVIII. 4. STUART *de mot. muscul.* T. II. f. I. Praecipui vero trunculi (cont. in ventriculo RVYSCH. *Thes.* II. T. V.) perforant muscularem, nacti areolas, quae inter fibras vacuae sunt (XCIII.) atque porro distribuuntur instar ramorum arborum, frequentissimis communicationibus & inter se mutuo, & cum truncis obpositi lateris, in cellulosa secunda sive Nervea, (RVYSCH. *Epist.* XI. T. XII. f. 2.) ex qua ramos & ad muscularem, (ALB. l. c.) exigui, & multo quam in nervea pauciores (*Epist.* XI. p. 9. D.) & per muscularem extrorsum ad extimam emittunt; ita ut longe plurimos in villosae membranae tubulos continuent. Hoc de arteriis & venis verum est, quarum fere eadem est distributio ALBIN. *de Vas. Intest.* p. 8.

8. & Icon. RVYSCHIVS icones dedit, factas ad Intestina, quae in aëre exsiccata fuerant, stratis omnibus vasorum in unum degenerantibus. Restituit veritatem ALBINVS *spec. Anat. de intest. ten.* 18-24. & *de Vas. Intestin.* tot. Idem observat retium areolas & distributiones, alias esse in aliis sedibus intestini, & a Ventriculo ad crassa Intestina, per succedentes gradus degenerare in proximis sedibus sui similes, diversas in remotis. Conf. ex Jejuno RUYSCH. *Adv. Anat.* III. T. I. f. 4. 5. cum iconibus ad Ileum factis. *ib.* f. 6. 7. & ALBIN. *spec. Anat.* §. XX. & ic. ALBINI.

[5] *Arteriosorum, in Text.] Arteriae ad Intestina sunt a Coeliaca, a Mesenterica superiori, a Mesenterica inferiori. Exiguæ aliae sunt, & arteriae & venae a lumbaribus & spermaticis (SPIGEL. L. VI. T. I. TKG.) ad Mesocolon sinistrum & flexum semilunarem (WINSL. III. 221.), atque aliae ab Hypogastricis ad finem Intestini Recti STAHL. *de Vena Port.* WINSL. IV. 238. 239. quas bis hac hyeme vidi etiam mesocolicam magnam arteriam replevisse.*

*Arteriae Coeliacæ Ramus idem EUSTACH. T. XXVII. f. 4. 20-16. f. 2. qui in Gastro-Epiploicam dextram fit, ramum insignem dat, qui sequens Duodenum juxta Pancreatis adhaesionem & Jejuni initia, ad sex omnino pedes Jejuni ramos edidisse visus est, ultimis arcubus, manifesta anastomosi, junctus arteriae Mesentericae superioris ramis. Alias brevior est, & inseritur alicui primorum rorum*

rum arteriae Mesentericae, qui ad Jejunum eunt. Est *Duodena*; cujus ramus, supra Duodeni primam partem ortus, adit duodeni flexum primum & secundum, & Pancreas, diversus a trunco.

Ex Arteria *Gastroepiploica dextra*, per Omentum, quod fundum Ventriculi cum Colo intestino connectit ad XCV. rami varii descendunt.

Sed & aliquando a sinistra *Gastro-Epiploica* rami pauciores, ad sedem sinistriorem Coli transversi feruntur.

*Arteria Mesenterica superior*, sub Coelica in ipso transitu per septum transversum ex Aorta prodit, sinistrorsum, obnupta nervis, comitem se dat venae Portarum, cum ea transit ante Duodeni flexionem transversam inferiorem, & cum ea in multos magnos ramos paulatim absumitur. Eorum graciles ad pancreas, & duodenum [EULER §. XXI.] exeunt, dum arteria inter duos flexus Duodeni media est. Sed sub Mesocolo transversio, ad dextra orientis jejuni perpetuus magnusque ramus antrorsum emergit *Colica* arteria, [WINSLOW. III. 204. EUSTACH. T. XI. 12-12. T. XXVII. f. 212-20.] ad sedem mediam transversi Mesocoli. Ejus ramus alius dexter sequitur Colon transversum ad hepar, & per Mesocolon dextrum repens inferitur ramo arteriae *Ileocolicae* confer WINSLOW. 205. Ramus vero *sinister* ad partem sinistram Mesocoli transversi erepit, & magno flexu facto, conjungitur in medio Mesocolo sinistro cum ramo adscendente arteriae Mesentericae inferioris.

[EUST.

[EUST. T. XXVII. f. 4. 25-21. f. 2. 16-45.] CHESELD. *Anat. of. hum. body.* T. XVII. f. 5. COWP. ad BIDL. T. III. DRAKE T. XX. a. 43. ad 45. WINSL. III. 204. IV. 234. 235. EULER. *de Mesent.* p. 25.] Sed arteria Mesenterica magna dextrorsum paulatim flectitur, & haud longe ab arteria Colica, ex dextra, si-ve concava parte ejus arcus, in quem incurvatur, unicum edit truncum, qui rectissima via tendit ad conjunctionem Ilei intestini cum Colo, & ramis quidem superioribus adscendit juxta Colon, & jungitur Colicae modo dictae; sinistris vero, juxta finem Ilei intestini magno arcu cum trunco arteriae Mesentericae conjungitur. Hanc *Ileocolicam* voco. WINSLOW. l. c. 205. Truncus autem ex convexa parte datis decem, aut pluribus insignibus ramis quorum primi ad oriens jejunum exigui, medii maximi sunt ad tenuia intestina, ultimo continuatur cum ramo sinistro Ileo-Colicae arteriae, modo dictae conf. WINSLOW. 198. 199. Haec addere visum est, cum magno consensu cadaverum perpetua sint.

*Arteria Mesenterica inferior*, minor, & sub emulgentibus procedens, non oriundae Mesocolicae Venae, sed progressae & pene in sinistri Coli medio sub Liene constitutae, se admovet, (EUST. f. IV. & II.) comesque sequitur Colon sinistrum, flexum semilunarem ipsumque Intestinum Rectum. (EUST. l. c. & COWPER. atque DRAKE l. c. 47. 48. WINSL. III. 210. 212. 213. IV. 235. 236. &c.) postquam



*Venoforum*] Venae (6) plurium generum ex cavo Intestinatorum absorbent. 1. Venae

quam dedit eum ramum, ex dimidio Mesocolo sinistro adscendentem, qui cum superiori arcum facit (WINSL. 209.)

Omnes arteriae Intestinatorum, ex magnis ramis in secundarios minores divisae, coalescunt inter se [ALBIN. *spec. de Int. ten.* p. 42.] magnis arcubus, Duodenalis a Coeliaca cum Mesenterica superiori, (EUST. l. c. WINSL. 200.) haec cum inferiori, ima Colica cum arteria Ileocolica, haec cum Mesenterica, Rami demum Mesentericae & Mesocolicae cum sui similibus [WINSL. lll. 202. ALBIN. l. c. 43.]. Ex his arcubus [EUST. l. c. WINSL. lll. 201.] alii producuntur, & ipsi frequentioribus arcubus conjuncti cum vicinis, donec ex ultimorum arcuum convexitate, vasa in rectum porrecta, [CHESLDEN. T. XVII. 3. WINSL. IV. 229. ALB. l. c. I. 17.,] hinc & inde abeant in Intestina *not.* 4.

- [6] Venae comites sunt arteriarum, crebriores & majores, & ramis, & truncis, uti solent. Fuit nuper in infante Venae Mesentericae magnae diameter partium 39, minoris 27, cum Arteriarum Mesentericae diametri, essent earundem partium 35. & 23. In multis ramis rationes variae fuerunt, 15. ad 11. 13. ad 9. 18. ad duas arterias, quarum diametri 10. & 10.
- Quae

nae a Mesenterica vena. II. Venae a vena Cava. III. Venae lacteae. IV. Venae Lymphaticae. Aqua arteriae, vel venae Me-

Quae rationes fiunt paulo majores ex tunicarum crassitie, quae in arteriis est. Origines eadem quae arteriarum. Ad Jejunum originem longe ex *Duodenali*, quae propago est trunci Mesenterici, orta supra Duodeni primam partem WINSLOW. III. *Tr des Veines* 239. conf. LXXVII. not. 14. & VESAL. L. III. p. 262 lit. I. L. V. f. XII. ad a. EUST. l. c.

Aliae & a *Gastro-Epiploica dextra* plures, & aliquando a *sinistra*, WINSLOW. III. 260. cum Arteriis exiguae.

Demum *Mesenterica Vena* (VESAL. L. v. f. XII. EUST. l. c. maxima, continuatus est truncus Venae Portarum, recta protensus deorsum, qui pone primum flexum Duodeni, ante secundum transit, ad tenuia Intestina [CHESELD. T. XVIII. f. 1.] late propagatur id. ib. Rami in universum arteriarum comites sunt. Trunci differunt. Ex Mesenterica magna oritur vena *Colica*, WINSLOW. 243. quae arteriae colicae se adjungit, & ramo dextro cum ramo Gastro-Epiploicae convenit. ramo sinistro cum Haemorrhoidali. Sed Gastro-Epiploica alium ramum dat ad colon transversum, ejus ramus sinister cum Colica vena conjungitur WINSLOW. 246. dexter per colon dextrum descendit, & cum Ileocolica continuatur l. c. Vena *Mesenterica inferior* modo ex trunco Venae Portarum [WINSLOW. III.

Mesentericae, vel Cavae venae injecta subit cavum intestinum, & demonstrat hanc resorptionem.

*Vieti]*

232. BIANCH. *hist. hepat.* T. VIII.] in angulo quo Splenica recedit a communi trunco; modo a splenica, [SPIGEL. VI. T. EUSTACH. f. II. L. V. p. 538. VESAL. L. III. p. 262. sed VESALIUS habet peculiarem, veramque Mesocolicam, ex ramis Venae Portarum l. c. quae varietas mihi nunquam visa est]; Modo a Mesenterica, postquam splenicam edidit, [EUST. f. IV. & EULER. l. c. XXII.] Ea primum dat duodenam secundam ad transversam sedem inferiorem WINSLOW. 263. deinde sub splenica vena, & fere parallela ad radicem mesocoli transversi ad Lienem fere transversa repit, [EUSTACH. l. c. f. IV.] tunc vero descendit, & in medio fere sinistro Mesocolo arteriae conjungitur. & ad Mesocoli transversum partem sinistram ramum exhibet, qui cum Colica conjungitur, WINSLOW. 264. atque adeo plures ramos arteria comparere edit, cum ii, quos ad Mesocolon transversum mittit, arteriae Mesentericae superioris ramos comites accipiant. Truncus arteriam Mesentericam inferiorem porro sequitur, & transverso colo sinisterius & omni sinistro, flexuique semilunari, & Recto Intestino prospicit, ubi cum hypogastricis non una anastomosi conjungitur. Arcum cum superiori facit  
similli-

*Vieti*] Unus ramus arteriosus, quando in tunicam nervosam distributionis finem facit, resolvitur in ramos ex uno trunco subito fissos, multos, & similes fibris penicilli ex uno

simillimum & comitem ejus, quem facit arteria [EULER. *de Mesent.* XXIII. & EUST.]. Arcus numeravi in Vena Mesenterica undecim, in Mesocolica majores tres, reliqui minores sunt, ultimi omnium in Recto intestino EUST. l. c. Quod a splenica ad coli transversae sedem pene mediam VESAL L III. l. c. *lit. L. L. V. p. 358.* vena eat, aliaque minor in sinistram, *lit. V.* notata, id non vidi, neque visum esse memini, si voces excipias WINSLOW. l. V. 228.

Praeter omnes has venas, alias a vena Cava tenex RUYSCHIUS deduxit, conf. BOHLII nostri *Epist.* ad RUYSCH. p. 57. In Ileo *Thef. max.* CXVII. CXXXIII. *Cur. renov.* XLV. & in Colo *Thef. max.* ib. CXXXIX. CXLVIII. *Cur. renov.* LXXI. atque peculiari Icone expressas, *Thef. max.* Tab. III. Sed eae neque Ill. ALBINO, neque mihi visae sunt, neque Vena Cava repleta flatu, aut materia ceracea, praeter solennes ramos, visa est vel minimum emittere ad Viscera Peritonaeo contenta [LXXXVI. *not. 12.*] An vidit vascula sub initium hujus §. nominata? an peculiarem fabricam? an humani quid passus? conf. INST. MED. CCCXXXVI.

Omnes & Arteriae & Venae ad Intestina vehuntur in celluloso intervallo Mesenterii,



uno calamo productis. Horum penicillo-  
rum [7] duplex finis est, alii in cavum  
intestinum liquidum suum effundunt; ab  
aliis glandulae PEYERI, liquorem suum  
recipiunt, & adservant, ut ex fluidissimo  
spissior fiat.

*Peye-*

senterii, non absque ramis ad glandulas  
exhibitis, inseparabili nexu conjunctae,  
ut nullum ramorum replere queas, quin  
simul omnes omnium Intestinorum trun-  
cos repleas, imo vero cera venis intesti-  
norum impulsæ, facillima via, ligatis  
truncis venarum Splenicæ & Mesaraicæ,  
ramis Venæ Portarum, remeat ad Ven-  
triculum, ad Lienem &c. cum omne  
systema Venæ portarum Valvulis desti-  
tuatur, quidcunque visum fuerit HIGH-  
MORO *Disq. Anat.* T. VI. p. 61. licet in  
equo omnino valvulas habeat RUYSCH.  
*Decad. Advers. Anat.* 11. Sed præterea  
ob insertiones arteriarum in arterias al-  
terni lateris per ipsas arterias, venoso  
modo posse retroagi sanguinem, atque  
versus cor recedere, existimat ALBINUS  
*de Vas. Intest.* Quod & verum esse li-  
quet, & præterea, retroagi debere san-  
guinem, donec ad truncum ejus magni-  
tudinis venerit, ubi jam impulsio recta  
retrogradam impulsione superet, tumque  
decessurum esse in vas aliquod laterale,  
arcumve vicinum.

- [7] Hi penicilli sunt ipsissimæ PEYERI  
glandulae, quas pro spuris habuit RUY-  
SCHIUS, & protuberantes intra cavitatem  
Aa intesti-

*Peyerianas*] Folliculi minimi, humorem excipientes ab arteriis, quae per folliculorum membranam distribuuntur. Eum adfervant, & quando plenae sunt, emittunt (8). Omnium minimae sunt ad pylorum, semper eo majores, & magis agminatae, quo coecum Intestinum propius est. Nempe chylus non acris est, ubi ex Ventriculo provenit, mora vero redditur acrior. Unde demonstratur, PEYERUM [8\*] non bene posuisse glandularum suarum actionem in dilutione Chyli: ibi enim copiosissimae sunt, ubi chylus crassior est.

*Nervosorum*] Nervi Intestinorum numero

intestinorum passim descripsit; procul dubio, conservatis, & tumentibus vasis, quae materia ceracea repleta erant destructo, membranaceo, & tenero folliculo *Epist.* XI. p. 9. & *T.* XII. f. 5. 6. *Thes.* I. *Aff.* III. no. VIII. *Thes.* III. *Aff.* II. no. XXXII. *Thes.* IV. *Aff.* II. no. XXXVII. *Thes.* VI. no. XXXIII. Sed & ipse alibi veram fabricam glandulosam agnovit v. not. 13. & LISTERUM *de humor.* p. 208.

[8] not. 3.

[8\*] Ad promovendam fermentationem, qua in chylum cibi praeparantur *de gland. Intest.* *Exerc.* I. c. 2. p. 23. c. 3. &c.

[9] *Continuitate, in Text.*] Vt non difficulter cera per arterias impulsæ, redeat per venas ALBIN. *de Vas. Intest.* p. 8. facilius tamen in Intestina effluit.

ro excedunt (10). Sed quo abeunt omnes?  
An ad modum arteriarum partem liquidi  
fui

[10] Nervorum Intestinalium historia adeo composita est, adeo cohaerens, ut pene tradi non possit. Oriuntur autem & diversis modis, & in singulo fere corpore diversa ratione. Hi nobis & majores & constantius visi. Primum Duodenum ramos habet, a trunco dextro Octavi Paris trans ventriculum vecto ad hepar (LXXVII. not. 17). Deinde alios ab Hepaticis WINSL. IV. 241. III. 330. BIANCHI. T. IV. hh. VIEUSS. T. XXIII. 59.) & a magno Plexu, qui medius Gangliis semilunaribus interjacet.

Intestina tenuia, & ea sedes coli, quae ab arteria Mesenterica superiori ramos habet, innumeros ramos habent a plexu illo *Mesenterico maximo*. [WILLIS de cer. & nerv. T. XI. O] qui, interjectus gangliis semilunaribus, ab utroque, & a stomachicis nervis (WINSL. III. 141. VIEUSS. l. c. 63.) & ramis trunci Intercoastalis factus, adjacet origini arteriae Mesentericae superioris (WINSL. III. 415. VIEUSS. inter 61. & 65. & 77.) Hi omnem arteriae membranam albis filamentis obnubunt, comitesque sparguntur. (WILLIS l. c.)

Intestinum Colon finisterius, a Liene descendens, a Plexu *Mesenterico inferiori*, qui ortus a ramis Plexus superni, (WINSL. III. 416. VIEUSS. l. c. 78.) & ab aliis ab Intercoastali, aliasque a Splanchnico ner-

fui tradunt conparibus venis (11)? an quod residuum est, sub specie exhalantis vaporis effunditur in Intestinorum cavitatem (12)? Hoc probabile videtur, etli non admittat demonstrationem. Certe summa virium iactura, & velocissima est a Diarrhoea. Habuit ex India reduces aegros BOERHAAVIUS, miserrimos mortales, quibus aquosae dejectiones adeo funestae fuerunt, ut extenuati denique quasi evanescerent.

Ca-

vo accedentibus (VIEUSS. l. c. 83.) & Intercostrales ganglio lumbari, adjacet origini arteriae Mesentericae inferioris, ad sinistra Aortae, eamque amplectitur eodem modo.

Ejus flexus semilunaris, atque Rectum Intestinum VIEUSS. 81. a plexu singulari, qui, adjacens bifurcationi Aortae, fit ex ramis descendantibus a plexu Mesenterico superiori (WINSL. lll. 416. 420. VIEUSS. l. c. 79.) & Plexu Mesenterico inferiori, & ab Intercostralis trunco. Et Rectum denique a finibus ultimis nervorum Intercostraliū [WINSL. lll. 427. VIEUSS. 84.] & a sacris [ib. 303.]

Omniū distributio in Intestina sequitur fere arteriarum iter.

[11] Conf. INST. MED. CCXCII.

[12] Conf. INST. MED. LXXVII. not. 22.

[13] Peyerianae, in Text.] In Intestinis tenuibus, & ipso Duodeno (HARD. ad PEYER. Ep. XXXIII. & XL. & PEYER. de Gl. Int. p. 14. & Ic. I.) magis vero Jejuno, omnium



*Calor*] A vasis, quae tanto numero ambeunt Intestina. Ea vero efficacia caloris, quae dicta est LXXXVI. in Intestinis pergit adhiberi coquendo alimento, potentior, ob diuturnam continuationem, & organi magnitudinem. Nunquam vero frigent Intestina, dum vivimus, & quamprimum a morte frigent, cessat motus peristalticus, atque

omnium maxime in Ileo [PEYER. l. c. p. 14. l. c. III.] versus finem, in unam cruram confluunt. [PEYER. ib.] In membrana nervosa [PEYER. p. 8. RUYSCH. *Epist. Anat.* XI. p. 89.] siti sunt folliculi simplices [MALP. *de conglob.* p. 3. WINSL. IV. 146. HARDER. ad PEYER. p. 89. RUYSCH. *Adv. Anat.* II. p. 7. & *Ep.* ad BOERH. p. 57. BOERHAAV. *Ep.* ad RUYSCH. II. p. 19.] similes glandulis simplicibus faucium, [GREW. l. c. c. VII. p. 29. GALEAC. in *comm. Bonon.* f. 1. a. f. 2. f.] agminatim congesti, propriis poris patentes in Intestinorum cavum [PEYER. l. c. p. 19. RUYSCH. *Ep. An.* XI. T. I. E. E.] coque fundentes pituitam (WEPF. *de cicut. aquat.* p. 146. BRUNNER. *de Duod.* c. 7. HARDER. ap. PEYER. p. 93.) in recentibus liquidiorum HARDER. ib. p. 95. Sedes omnes occupant, tum mesenterico obversas, tum obpositam COWPER. in fig. 40. app. BIDL. raro tamen rugas conniventes, conf. WINSL. IV. 230. cum PEYER. p. 160. RUYSCH. *Epist.* cit. p. 10. Inventae, sed brevissime de-

atque collabuntur vasa Lactea. Praeterea pulsatio arteriarum perpetua facit adtritum diversum ab adritu, quem fabrica musculosa facit.

### §. XCIII.

*Musculosa*] Membrana carnea, a Pyloro oritur, & terminatur ad finem Ilei. Ejus haec in universum est actio, ut longitudinales quidem abbrevientur; circulares vero coarctent latitudinem, sicque omnis diameter inminuatur, ut absolute nulla cavitas reliqua fiat. Ut omnino major sit, quam efficacia ventriculi, is enim non potest

scriptae a PECHLINO de purgantibus T. II. f. 2. & p. 510. deinde anno 1673. a LISTERO *Phil. Trans.* 95. LOWTHORP. *Abrigm.* III. p. 93. & anno eodem a PEYERO *Exerc. de Gland. Int.* & GREWIO *compar. Anat. of the guts* in variis animalibus confirmatae. conf. GREW. in vulpe, cuniculo, talpa, mure. In Intestinis crassis, adpendice vermiformi [RUYSCH. *Adv.* II. f. 4. T. III. & PEYER. l. c. G.] Colo & Recto similes, solitariae, PEYER. l. c. Ic. III. & majores prioribus a PEYERO describuntur, ex minoribus folliculis compositae GALEAC. l. c. f. II. 9. f. III. i. Sed & in tenuibus non infrequentes sunt solitariae, minores RUYSCH. *Epist. cit.* p. 10. f. 6. MORG. *Adv.* III. An. VII. Glandulas Duodeni vide XCVI.

est parietem parieti adplicare, neque adeo integre se ipsum exinanire (LXXXIII.) Sed praeterea adeo densa est muscularis haec membrana, ut Intestina ad vermium modum mensae inposita repant, in vivo homine, plane dissimilia a se ipsis flatu distentis, tenuibus, & membraneis, qualia reperiuntur in cadaveribus (1). In omni enim animale dissecto observatur, intestina perpetuo moveri, atque in aliqua particula modo contrahi, tuncque duriores fieri, modo relaxari; atque relaxationem a contentis cibus & aëre fieri, contractiones a fibris ipsis. A morte ipsa non subsistit haec motitatio vermicularis, cuniculos enim, postquam diu venatorum persecutionem passi sunt, mortuos ex fracta medulla spinali, solent aperire venatores, atque intestina evellere, eaque intestina projecta non exiguo tempore pergunt repere. Biduo integro a morte superesse hunc motum in hominibus, demonstratur, cum chylus vasa lactea subeat. Quare ea actio, cum

[14] *Sollicite, in Text.*] Omnis glandula, nisi fibrosam membranam nata sit, debet a musculo vicino emulgeri [MALPIGH. *de Gland. conglob.* p. 4] maxime si mucum fecernat. Id aptissime fit, dum folliculi hi inter carneam & nerveam tunicam medii intercipiuntur, carneae compressiones passurae.

[1] Observatio verissima, & sectionibus vivorum confirmata.

cum validissima sit, & per tantam longitudinem Intestinorum perpetua continuetur, effectus etiam sibi aequales, nempe maximos praestabit.

*Ten-*

[2] *Annularibus, in Text.*] Transversas fibras Intestinorum GALENVS habet *de Vsu part.* L. IV. c. 17. Primus vero tunicae propriae eas adscripsit, & fusius definivit WILLISIUS *Pharm. rat.* S. I. c. II. §. 28. T. VI. CC. & ad vivum depinxit COWPER. ad BIDL. f. 39. lit. D. Easque cum spirales esse contenderet COLE (*Transf. Phil.* 1676. no. 125. & app. ad *Tr. de febr. intermitt.*) atque uno ductu a pyloro ad anum convolvi, nova sententia vix recepta est ab ullo Anatomico, omnium minime a MORGAGNO *Adversf.* III. *Anim.* V. Media inter duas opiniones est HELVETII *Mem. de l' Acad. des scienc.* 1721. p. 396. & WINSLOWII IV. 94. 95. qui circulares equidem ductus fibrarum habent, sed obliquos, & decussatos HELV. l. c. ic. 2. T. XV. Nobis videtur, fibrarum non integros circulos esse, neque adfectatam legem, sed exiguos arcus fibrarum, post breve iter se sub vicino arcu subripere, non spiram adfectare aut parallelos orbiculos, sed laxae & inordinatim circumponi ambitui Intestini. Conf. ALB. *spec. Anat. Intest. ten.* §. VII.

[3] *Fimbrinae, in Text.*] Conjectura fuit WILLISII l. c. sed intercedit interjecta muscolari & extimae cellulosa prima XCIV. [ALBIN. l. c.] & in cane intestina validissima,



*Tendini*] Musculus est substantia rubra motrix, tendo vero est continuatio substantiae rubrae motricis, quae neque ipsa motrix est, neque rubra, Verum fibrae intestinorum veri sunt muscoli, ordinati in plura strata, quorum exteriora contegunt alia & alia interius posita. Non necesse est, ut eum ruborem prae se ferant, qui in musculis est majoribus, neque enim rubor est character musculi, cum omnis fibra musculosa probe elota instar cornu Limacis pelluceat. Sed in intestis nullus est rubor, cum potentissimae sint musculorum actiones, longe validiores humanis actionibus, uti in l. de *Saltu pulicis* demonstravit ROBERVALLIVS. Atqui hae fibrae anulares versus mesenterium tendinosae fiunt, quod recte observavit WILLISIVS, & deum continuantur nervis, qui per mesenterii intervallum ad Intestinum veniunt. Et omnis musculus non est nisi nervus explicatus.

*Assurgentibus*] Namque contracta membrana musculosa, toto intestino minori facto, necessario propellitur laxa tunica Villota (5), & majores plicas facit, quae cavitatem

diffima, mesenterium tenerrimum est, neque ea densitate, ut sustineat fibras carneas.

[4] *Nervos, in Text.*] INST. MED. CCCXCV.

[5] Cum sint circuli concentrici inter se in ratione quadrata radiorum, fit ut inminuta membrana carnea per unam quartam par-

Aa 5 rem

tatem intestinorum inminuant, & dividant. Eadem opera intestina ab adfurgentibus jugis in totidem fere cellulas dividuntur, quot sunt jugorum paria: cibus vero dum conatur egredi ex aliqua cellula in proximam, moram invenit, adprimitur villis bibulis, atque resorbetur adeo per venas trium generum, quod fluidissimum adfuit: reliquum similem in secunda, & tertia, & centesima tritum, dilutionem, resorptionem patitur, toties repetita omnia, quot valvulae sunt, unica deinta. Adeoque nunquam tota fistula intestinorum aperta est; sed alibi clausa, laxata alibi. Sed eadem actione effluunt in relaxatione humor exhalans, pituita PEYRIANA &c. & majori copia cibus adfunduntur, & miscentur tempore contractionis. Pinguedo denique, quam in stadio relaxationis accepit tunica cellulosa, ea per constrictionem Intestini in musculotam adigitur, omnibusque fibris carneis se oblinat.

*Sur-*

tem suae diametri, areae circulorum intimorum intestini reducantur fere ad dimidiam. Et juga, si quidem obposita sibi occurrant hujus dimidiaae partis majorem partem abolebunt propulsa a tunica nervea, & in spacium compulsa sedecuplo minus. Atque si valvulae altitudo sit quinta pars radii in circulo intestini, abolebit absque contractione triginta sex centesimas, post contractionem vero aream ex hypothesei reducet a 100. ad 29. quam proxime. Sed quarta pars non nimia est. Testatur autopsia in vivi sectione.

*Sursum*] Ex repetitis experimentis docuerunt (6) duo clarissimi viri, uterque Helvetius, WE-

[6] Dudum notus erat motus *antiperistalticus*, sed ad morbos relatus GALENO [*in Hipp. de morb. acutor. Comm. III. 33. &c. vid. SENNERT. Prax. L. III. c. 217. &c.*] Sed utrumque motum fuisse descripsit addiditque varias observationes GLISSONUS l. c. c. XV. Deinde WEPFERUS in femina apud PEYER. *de Gland. Intest. Exerc. I. P. II. C. IV. p. 26.* motum Intestinorum fursum & deorsum agitatorum luculenter vidit. In brutis *idem de cicut. aquat. p. 199. 209. 251. &c.* PEYERUS in ranis l. c. c. IX. p. 47. Et ego quidem saepissime vidi aperto abdomine animalium morientium, aut mortuorum, sed nondum refrigeratorum, intestina alternatis conversionibus, modo fursum & antrorsum, modo deorsum & retrorsum agitata fuisse, ut una particula intestini sola moveretur, deinde alia, & alia. Quem motum *delectationis* gratia fieri GLISSONIUS l. c. §. XVII. Quod vero HAGUENOTUS omnem omnino motum peristalticum tollere voluerit, & ad motum Diaphragmatis atque musculorum abdominis referre (*Mem. de l'Academie des scienc. 1713. sub fin.*), id videtur factum ex paucitate experimentorum captorum in fele, cui motus peristalticus est obscurior, neque potest evertere innumera experimenta WEPFERI &c. Adde in homine observationem in ZOD. MED. GALL. *Ann. II. JUN. p. 124. 125.* ubi intestino vulnerato, pendente ex abdominis vulnere, motus

WEPFERUS & PEYERUS, intestina, non solum a ventriculo versus anum moveri, sed eadem, contrario ductu, ab ano versus Oesophagum retrocedere, cibosque repellere, dum vermium intar repunt, adjuvantibus contrariam hanc directionem musculis abdominis. Quia reciproca actione fibrarum muscularium, mirifice ciborum remora, & adtritum, & subactio augentur. Et ea quidem actio, non solum tota vita superest, sed etiam cessante cordis motu, a morte perennat (7).

*Concretione*] Sit terebinthinae una drachma, adhaerebit manibus, vix poterit elui. Eadem fingatur in pilulas, non adhaerebit, neque Ventriculo, neque Intestinis, & per urinas absque mora aut obstaculo transibit: Mirabilis haec efficacia debet referri, partim ad perpetuam effusionem liquorum saponaceorum, & diluentium, partim motui peristaltico, quo fit, ut nunquam duobus se excipientibus temporis momentis, ulla particula cum vicinis massulis in eodem nexu maneat;

motus peristalticus, a sede ventriculi incipiens, progressus paulatim, ultimo cibum propulit ex vulnere. Imo vero in duobus foetibus motum Peristalticum vidit RUYSCH. *Obs. Anat. Chir.* 72. 73. in alio MERY *Hist. de l'Acad.* 1699. & olim in Damis HARVEY. *Exerc.* 67. *de generat. animal.*

[7] Crebra sunt experimenta DRELINCOURT. *Canicid.* V. p. 586. Quiescentibus tamen Intestinis post aliquot horas cordis & auricularum motus superest.



neat; sed praecipue, exhalantibus arteriis, quae tenuissimis, creberrimis vero, siphunculis, perpetuo, ex omni parte intestinorum, liquorem ejiciunt, repulsurum ea, quae conantur adhaerere, & viscidas particulas discerpturum, atque dissipaturum ex nexu mutuo, ne connasci possint aut inter se, aut cum Intestinorum membranis. Quare si excoriata intestina, destituta fuerint hoc munimine, & expolita, quod in inflammatione fit, aut aphthis oblita, tunc nihil quidquam de cibis in hominis usus cedit, sed moriendum est miseris. Imo vero intestina ex iis causis visa sunt (8) coaluisse, atque fuisse mirabilem causam funesti volvuli. Alioquin rarissime visae sunt faeces intestinis adhaesisse (9), etiam si aliquando piceae, atque duros in globulos

[8] Inde mors & gangraena BARTHOLIN *hist. Anat. Cent. VI. no. 38.* & post dysenteriam coalita RHOD. *Observ. Anat. Cent. II. no. 77. & 82.* Cretacea & calculosa coagula rara, sed non rarissima sunt, conf. Epist. SIGISMUNDI REGIS *ad Societ. ANGLIC.* & de variis infantibus BONNET. *Sepulchr. II. p. 195.*

[9] GALENO notas fuisse adparet ex L. IV. *de usu part. c. XVII.* neglectas revocavit WILLIS l. c. & T. VI. lit. B. B. qui distinctum a prioribus transversis planum, & integrum descripsit. Deinde HELVETIUS *Memoir. de l'Acad. des Scienc. 1721. p. 395.* eas restrinxit ad unam sedem, quae a Mesenterio remota est, quod & ALBINUS *spec. Anat. §. VI.* & WINSLOW de jejunio adfirmat IV. 125. Neque negaverim, eas  
ibi

bulos compactae coeperint adhaerescere, neque absque digitorum auxilio potuerint ex Recto Intestino egeri. In Corde certe, ubi perpetuus & validissimus motus est, frequentissimi sunt Polypi, coagula visceri sanguinis cum cordis parietibus varie connata.

*Longitudinalibus*] Earum (9) magnum est artificium. Intermiscentur cum fibris circularibus, atque variis modis ab iis intersecantur, idque potissimum in tenuibus Intestinis. Harum intersectionum eadem ratio est, quae intersectionum tendinearum in musculo Recto abdominis (10), Complexo &c.

ibi crebriores esse, sed ubique dari, etiam subtiliores, breves, interruptas, neque planum efficientes, & insperfas transversis, id saepe vidi, & confirmat COWPER. ad BIDL. f. 39. & ipse WINSLOW. l. c. 94. neque recedit HELVETIUS, aut noster BOERHAAVIUS. MONROUS vero etiam facilius demonstrari ea sede, qua accedit ad Intestina Mesenterium. *Aët. Edimb.* IV. p. 77.

- [10] Conf. INST. MED. ad CDXIII. Nempe fibra longa, super arcum expansa, contrahenti liquido resistens, ne fiat in arcum majorem, maxima vi eget. Eadem divisa in quatuor, pluresve funes supertensos eidem arcui, sive in arcus plures ejusdem circuli, sed quatuor hypomochliis distinctos, vi multoties minori egebit. Quia vis dilatans fibram in longiori fibra agit, ad distantiam semiperipheriae ab hypomochlio; in fibra divisa vero, ad distantiam semichordae segmenti arcus, sive, in  
ex-

&c. ut nempe interponantur crebri tendines, ad quos se contrahant fibrae longae, quarum vis, si continuato ductu portenderentur, post brevem flexionem omnino elangueret, neque sufficeret copia spirituum ad tantam fistulam. Caeterum, actione fibrarum longitudinalium, adducitur pars posterior intestinorum ad anteriorem, Intestina in rectitudinem exporriguntur (11), rugae augentur, & valvulae ad mutuos contactus propius accedunt, & adjuvatur (12) actio fibrarum orbicularium, in formandis cellulis intestinorum. Neque tamen id simul in toto tractu, sed modo hic, modo alibi, inaequaliter contingit.

## §.XCIV.

exemplo, semilateris octogoni inscripti. Erunt ergo efficaciae resistentes dilatationi uti 17. ad 1. proxime.

[11] Quae princeps est earum efficacia. Nempe Intestinorum sectio non est circularis, verum figurae ovalis, cujus vertex acutus ad Mesenterium est, obtusus ad obpositam sedem WINSL. IV. 89. Quod si nunc agant fibrae longitudinales, robustiores, & firmiores, curvaturae majoris Intestinorum, super arcum aliquem expansae, exporrigent totum arcum, dum laxa manet & innota sedes mesenterio adfixa, unde nova coarctatio intestini, axi eorum inminuto.

[12] Dum locum tenent fibrarum transversarum, quae muscutorum fibrillas connectunt. LXXXI. p. 234. CCCCXIII.

## §. XCIV.

*Cellulosa*] Meretur rei ipsius elegantia, ut justam cognitionem ejus adquiramus. Ergo tenendum, prodire Mesenterium ex Peritoneo, (XCV.) ad Lumborum vertebrae antrorsum in se ipsum redeunte ita, ut procurrat intra propriam cavitatem plano duplici, inter quae media intestina continet. In intervalla harum laminarum per, mediam intercapedinem, iter faciunt Arteriae, Venae, Nervi, vasa Lactea. Sed arterias, vasaque, quocunque decurrunt, ambit adgesta cellulositas, lubricum oleum affusura. Quae cellulosa fabrica efficit corpus aliquod fibrosum [2], una cum congesta pinguedine [3] interpositum laminis. Qua demum se-

[1] *Incumbit, in Text.*] Laxa, & amplior ea sede, qua vasa deducit ad Intestinum, paulatim imminuta, demum nulla, in sede quae mesenterio obponitur. Recte ALBIN. *spec. Anat.* & in icone RUYSCH. *Catal. Mus. rarior.* ad p. 146. licet utrimque aequalem depinxerit idem T. V. *ad Thes.* VI. fig. 2. an ibi loquitur de *secunda cellulosa* XCII. not. 1.? cum primum a se inventam dicat no. IX.

[2] Quod WHARTONUS *substantiam propriam Mesenterii* vocat (*Adenograph.* p. 26.) licet ante eum GALENO, VESALIO, aliisque minime ignoratum fuerit. Huic motum singularem tribuit GOHLIUS (in *Act. Berolin.* Dec. II. vol. V. p. 78.) sed ex ignorantia fabricae.

[3] Pollicis crassitie vidi. In cane & fele nulla, &



de lamina mesenterii utraque adtingit Intestinum, ea secedunt laminae, atque medium Intestinum amplexae continent, & obvolvunt. Id in macilento cadavere, levi in externam membranam inflicto vulnuscule, commode demonstrat flatus adactus, qui inter utramque mesenterii laminam late obambulat, & extus etiam super intestinorum membranam musculosam se conjicit. Atque in parte quidem magna intestinis firmiter adnascuntur musculosae tunicae, & artissime quidem in sede, quae a mesenterio est quam remotissima XCIII. *not. tendini*, ea vero sede, qua primum se adplicant Intestino discedentis Mesenterii laminae, non adnascuntur. Atque praeterea, qua sede vasa a Mesenterio ad Intestina venientia inter carneam membranam externamque repunt, ea sede cellulosa fabrica sequitur arteriarum iter, mediamque se subdit inter tunicam a peritonaeo, & carneam. Haec est *Cellulosa RUYSCHII*, quam flatu detexit. In obesis & bobus adipem recipit, & *Pinguedinea* [4] dicitur. In macilentis, a laminis,

& Mesenterium pellucens. Sedes est morborum qui non in glandulis, sed in ipsa substantia sedem habent PAREUS L. XXIII.

P. 707.

[4] In brutis variis. Inde glandulae externae Intestinorum, quales habet PEYER. *Exerc. II. de Gland. Intest.* p. 84. ACT. HAFN. Vol. III. no. LXIV. p. 105. atque morbosae illae verrucae ACT. BEROL. Dec. I. vol. IX. §. 7. Inde etiam procul dubio

B b

bio

nis, fibrisque in rete complicatis, nomen habet *Cellulosae* [5]. Ejusdem est indolis, cum membrana omnibus musculis substrata. In Intestinis nempe tenuis est, subjecta musculis exilibus; sic in fronte, scroto & pene aequae exilis, ut auctores existant, qui nullam ibi faciant, quam tamen in iis ipsis locis, leucophlegmatia [6], atque Emphysemata demonstrant, quando humores, in vicinas partes effusos, ipsae recipiunt. Utilitas hujus fabricae est in vasis inungendis, conservanda flexilitate, adjuvando motu, impedienda connatione, exsiccatione, ad quam fibrae musculares pronissimae sunt. Ea si destituatur musculus, concrevit cum vagina sua, & fit immobilis. Si in molem nimiam excreverit, idem musculus debilitatur laxitate nimia, & absque motu torpet, ut in porcis conspicitur, qui sex continuis mensibus saginati, nisi mactentur, adeo obplentur pinguitudine, ut compressis vasis, fluidorum motus intercipiatur.

quatit aegros

Tussis anhelata fuit, & faucibus angit  
obesis (7).

Neque alibi sedes est tumorum, qui cavitatem

bio adeps, quem per alvum effusum legimus STALPART. *Observ.* LXI. Cent. I. TULP. *Observ.* 18. L. III. HILDAN. Cent. IV. *Observ.* 47. Vidit olim eam pinguedinem LEEUWENHOECK II. p. 63.

[5] Conf. LXXXII. & CCCCXVI.

[6] *Hydrocele* & flatu pulchre paratur, continua, penis scrotique cellulosa.

[7] De peste porcorum MARO,

tatem Intestinorum saepe conprimunt, enati in ipsis intestinis, quales apud BONNETUM existant observationes (7\*). Videtur vero similis cellulosa fabrica etiam inter villosam membranam & carneam esse.

### §. XCV.

*Longaque*] (1) Intestina quater aut quinques eo homine longiora sunt, ex quo depromuntur; complicantur tamen in brevissimum mesenterii spacium, neque ullus ex millenis nervis, nullum ex innumerabilibus vasis contorquetur, aut conprimitur incommode. Id facit Mesenterium, plicatum, & intestina ordinans. In vivo animale breviora sunt, quam in cadaveribus adparent; *Omen-*

[7\*] Conf. multa exempla citata apud STALPART van der WIEL. *Obs.* 56. *Centur.* I.

[8] *Extima, in Text.*] Huic fibras varii generis tribuit WILLIS. l. c. Longitudinales facit RUYSCH. *Epist.* XI. T. XII. f. 1. lit. A. simplex est ubique, & Mesenterio atque Peritonaeo continua & similis.

[1] De ea longitudine sententiae diversae sunt. Plerique sexies longiorem volunt fistulam omnem, crassis connumeratis SPIGEL. L. VIII. c. IX. &c. alii sola tenuia aestimant pedum 33. ut GLISSONIUS *de intest. ten.* p. 210. quae GARENGEOTUS vix 22. pedum facit; & omnia intestina septies vel octies longiora proprio corpore GLISSON. ib. PICCOLHOMIN. & WINSL. IV. 89. Nu-  
B b 2 per

per in puero, cujus longitudo sesquipedis fuerat, tredecim pedes intestinorum mensuravi, sedecim cum sex unciiis in altero, cui corporis totius longitudo uncia fuit supra duo pedes. Sed haec varia ratione reperiuntur se habere, imo DIONISIUS corpus humanum vidit, cui intestina non longiora fuerunt, quam quae ab ventriculo ad anum est distantia, *Cours d'Anat.* p. 190. cui observationi consentiunt aliae CHAUDONI apud CABROL. *Observ.* X. & *Ant. de POZZIS* apud VIRIDET. *de prim. coct.* p. 279. Prima portio hujus fistulae, quod ad *gracilia* Intestina spectat, est *Duodenum*, cujus limites alii a duodecim digitis determinaverunt, alii longe breviorum ad insertionem usque ductus Cholechoi GLISSON. l. c. c. XI. p. 207. Alii, & quidem peritius, Duodenum dixerunt adusque eam sedem, ubi circa Mesocolon inflexum transit ad cavitatem abdominis inferiorem (VESAL. L. V. c. V. p. 429. SANTORIN. *Obs. Anat.* c. IX. §. VII. WINSL. IV. conf. XCVI.) Altera *Jejunum* est, quod dicitur, quam primum pone Mesocolon emerfit, longe angustius, magis rubicundum (quas notas plerasque primus dedit FABRICIUS *ab Aquapend. de Intest.* p. 141.) valvulis frequentissimis, glandulis PEYERI paucioribus, ita ut haec omnia in remotis extremis utriusque Intestini evidentissima sint, ad mutuos limites confluant GLISS. I. c. VESAL. l. c. WINSL. l. c. 122. *Ileum*, album magis, valvulis minus crebris, glandulis agminatis magis & magis frequentibus, longius priori, si credendum WINSLOVO IV. 123. pene una quinta parte totius, & sesqui-



quiertia ratione, si GLISSONO, in Colon denique terminatum. Utrumque medium coërcetur ambeunte undique Colointestino EUST. T. X. f. 11.

[2] *Fimbriae, in Text.*] *Intestinum Rectum* in ipsa pelvi membrana adiposa sustinetur DOUGL. *de Perit.* 27. ubi vero supra vesicam, pliam duplicem Peritonaei, dictam WINSLOWO 209. & DOUGLASSIO l. c. superavit, jam verius *Mesocolon*, late flexum semilunarem sustinet EUST. T. XI. f. 2. 45. ad 50. 20. ad 10. fere. VESAL. L. V. f. XXIV. 14. Et denuo angustius, sinistram sedem coli qua ad Lienem adscendit EUST. l. c. ad 5. Eo in loco accipit arteriam Mesocolicam, deductam propria membrana, in Mesocolon inserta. Ad Lienem transversum fit, & amplius, erigitur recta antrorsum, geritque Colon quod sub ventriculo transit, supra omnia tenuia, quae separat a Ventriculo & Hepate, donec ad hepar perveniat, WINSL. 204. EUST. l. c. 52-42. 5. SPIGEL. L. VIII. T. VI. FF. quam partem *Omenti membranam inferiorem* ubique vocat VESALIUS p. 496 ed. 1543. ibi inflexum descendit dextrorsum VESAL. L. V. f. XXIV. minus pingue & brevius, ut aliquando pene nullum sit, atque, educto mesenterio Caeci, continuatur *Mesenterio* WINSL. IV. 202. EUST. 35-15. Hoc *Mesocolon dextrum* vocat GALEN. *de Venar. dissect.* c. 1. Mesenterium vero ad originem arteriae Mesentericae superioris VESAL. L. V. f. X. ad K. & f. XII. a vertebrarum lumbarium suprema sede, sub Mesocolo transverso, cui continuum est inter dextrum & sinistram Mesocolon, de-

*Omenti*] Mirabilis haec adipis metropolis, est membranaceus faccus, (3) ex duabus

scendit antrorsum, & in ambitum late expanditur, plicis ambitu denuo plicatis & reduplicatis WINSL. IV. 199.

Communis origo Mesenterii & Mesocoli est Peritoneum, quod recedens intra se ipsum, duplicem laminam facit, mediaque vasa cum pinguedine recipit, donec intestinis productum occurrat, & nactum ea obvolvatur XCIV. Id ad Psoam Musculum in Mesocolo sinistro & in Mesenterio facile adparet.

Mesenterium, quod tenuia intestina sustinet, uti amplius ita pinguius, & glandulis magis conspicuis ornatur. Mesocolon dextrum, & sinistrum, graciliora sunt & saepe omni adipe carent, imo vero colon ibi saepe absque ullo Mesocolo adhaeret ad Peritoneum EULER. *de Mesent.* XI. & ad Renem. Duodenum absque Mesenterio est excepto fine.

- [3] Omentum notius, & amplius, est marsupium (WINSL. IV. 352.) factum ex tenerissimis membranis, per quas vasa in retia ampla disseminantur RUYSCH. *Thef.* II. T. V. SPIGEL. L. VIII. F. 3. comite pinguitudine GLISSON. *de ventr. & int.* p. 116. WINSL. IV. 351. ita ut frequenter, praeter vasa, nullus adsit adeps, aliquando tamen omne omentum in unam massam adipis condensetur, qualem unciae crassitie vidi, & quinque librarum pondere VESALIUS, alias omne omentum in tabidis pene evanescat. Oritur ejus anterior membra-

bus laminis factus, inter quas vasa pinguifera & epiploica ambulant. Involvit ad umbilic-

na ex peritoneo, quod facit parietem superiorem & anteriorem ventriculi, & continui duodeni, tota ea longitudine, quae est a prima accessione Duodeni in duplicaturam Mesocoli se abscondentis, (conf. fig. RUYSCH. *Thef.* II. T. V. SPIGEL. L. VIII. T. IV. f. 1. 2.) adusque Lienem, cui vasa adducit & adhaeret; inde descendit, recipiens cellulofam fabricam ventriculi & vasa, v. IC. RUYSCH. atque protenditur longius in sinistro latere ad Ilium sinistrum usque VESAL. p. 494. aliquando tamen ad umbilicum finitur BIDLOO T. XXXIII. RUYSCH. *Cent. Obs. Anat. Chir.* LXIII. LXV. alias etiam pelvi incumbit, conf. SPIG. L. VIII. f. 3. BLAS. ad VESL. & HIPPOCR. *Aphor.* V. 46. Ubi finitur, adnascitur ipsi *membrana posterior VESALII*, longior, quae ex coli transversae membrana externa (SPIG. L. V. T. II L. VIII. f. 1.) e regione inserti Mesocoli, pone laminam priorem descendit, ei in unum marsupium conjuncta VESAL. L. V. f. 4. 5. Sed & aliud *minus Epiploon* olim in catopardo visum est a PARISINIS f. CC. & ab EUSTACHIO T. X. f. 1. depictum; quo etiam referre licet *tertiam portionem Omenti* RIOLANI *Anthropol.* L. II. c. XIII. p. 97. Id ex Hepatis magna sede, fossa nempe ductus venosi, oritur continuum membranae exteriori hepatis, tenui lamina, cui locum tenet oppositae laminae Pancreas, & continuum hinc quidem li-

bilicum usque Intestina, eorumque gyros subit, ita ut cum his gyris visum sit concrevisse (4). Defendit ubique Intestina, ne adlisa duro, tensoque Peritoneo, laedantur, eadem levigat, fibras inungit, intercedit, ne vel inter se, vel cum Peritoneo connascentur: eoque exsecto, viia sunt Intestina Peritoneo adnata fuisse. Erat Parisiis homo insanus (4\*), inflixit proprio ventri vulnera numerosa, & periculosissima, convaluit  
ta-

gamento, quod ab Oesophago ad Diaphragma abit, inde ligamento lato, quo Hepar jungitur Duodeno, trans lobulum SPIGELLII, quem tegit (WINSL. IV. 356.) inseritur omni curvaturae minori Ventriculi e regione prioris (GARENG. *Splanchnol.* T. VI. f. 2. male,) totum tenuius, vasis simillimis, sed parcioribus.

Flatus in hoc omentum subit, inter ligamentum *hepaticorenale dextrum*, (WINSL. *hepatico-pancreaticum* IV. 359.) & *hepatico-duodenale*, ad dexteriores venae Portarum & pone eam, eoque & minus omentum repletur, & deinde postquam flatus WINSL. *Mem de l'Acad.* 1715. p. 315. inter Ventriculum & pancreas, Colonque transiit, etiam *majus, vulgare & verius* Epiploon.

[4] Atque in maximo omento manifesta fuerint indicia intervallorum.

[4\*] In *Histoir. de l'Acad.* locus vero excidit. confer historiam COWPERI in *Philos. transact.* n. 302. qui intestina inter se invicem connata vidit, & confer non paucas historias intestinorum crassorum rescissorum, quae connata cuti, novum in abdomine anum  
tece-



tamen, & anno vertente ex summo templo se praecipitem dedit, visa sunt intestina con-  
nata esse cum Peritoneo, ad omnes vulne-  
rum sedes. De utilitate, quam praestat ca-  
lesfaciendo abdomini, admodum nota est hi-  
storia GALENI (5), qui gladiatorem vidit,  
cui exsectum post vulnus abdominis omen-  
tum, perpetuum frigus reliquit, ut calenti-  
bus pannis se tueri deberet. Quod vero O-  
mentum Intestina non longius, quam ad  
Umbilicum usque, comitetur, ideo factum  
est, quia ibi vis muscutorum abdominalium  
admodum inminuitur (6), atque ita peri-  
culum adtritum atque coalitionis minus est.  
Neque tamen ibi provida Natura sibi defuit,  
ibi enim cellulosa membrana Peritonei, ma-  
gis magisque pinguitudine abundat.

*Experimentis*] A perpetuo motu, & loci  
calore, oleum omenti resolvitur in subtilem  
vaporem, & adeo volatile fit, ut per tenuis-  
simos poros exhalans, inungat intestina.  
Exhalare vero hoc oleum multis experimen-  
tis

fecerunt. RAW. in Orat. Prorect. TULPIUS,  
*Hist. de l'Acad des Scienc.* 1723. &c.

[5] De usu part. L. IV. c. lX. Sed contraria sunt  
experimenta RIOLANI l. c. p. 99. FO-  
RESTI *Obs. Chir* L. VI. *Obs.* VII. neque  
rari sunt, quibus ob hernias portio non  
exigua Omenti refecatur, nullo coctionis  
detrimento.

[6] Namque ibi Rectus gracilior est. Oblique  
adscendentis lamina unica (LXXXVI. not.  
19.) & Descendentis fibrae magis dispa-  
ratae.

tis confirmatur. RUYSCHIIUS microscopio in omento vidit innumerabiles fenestras, post quam oleum diuturna maceratione resolverat. Per easdem exhalans in cadavere oleum manus adtrectantis anatomici protinus oleoso liquore obungit. Deinde cera RUYSCHIANA (7) easdem vias invenit, per quas vapor exit; & halitus abdominis nidorosus id arguere videtur; & animalium saginatorum subitum decrementum, quae, si motu violentiori subito urgeantur, triplo se ipsis macilentiora fiunt; uti in equis adparet, quorum sacculi oleosi, medii inter binas membranas, exsiccantur, expulso oleo, atque visum est verum oleum, subito ex fortiori motu liquefactum, de omento effluxisse, in cavum abdominis manasse, causamque fuisse pereundi pulcherrimis equis (8).

*Am-*

[7] Pori subtiliores, nullo experimento visibiles utique adeste videntur. Sed poros visibiles & receptos suo tempore, non industriae anatomicorum, verum inperitiae tribuit RUYSCHIIUS, quem auctorem excitat PRAECEPTOR *Thef. II. Aff. III. no. 15. Consentit WINSLOW. Mem. de l'Acad. 1715. p. 317. Expos. Anat. IV. 362.* & facile convincitur, cum omentum, flatum, adactum per hiatus sub hepate, facile, etiam per diem, retineat, atque in rosulas turgeat, vide icones GARENGEOTI. imo vero aquam tinctam venis abdominis impulsam, etiam in puerulis, contineat Marsupii simillimum.

[8] RUYSCH. *ibid. & Thef. Anat. II. Aff. III. n. XV.*

*Ambeuntes*] Actio musculorum Abdominis, Obliquorum omnium, Reſtorum, Tranſverſorum, alternis vicibus cum Diaphragmate nitens, viſcera abdominis perpetuo retrorſum (10) premit.

*Diluta*) Adparet ex anatome, qua demonſtratur, a pyloro ad coecum inteſtinum uſque nihil quidquam craſſi unquam reperire, non abſque admiratione obſervantium, quam ſubito hoc ſolo loco craſſeſcant, & praeterea ex ipſa copia aduſi liquidi aeſtimatur. In Coeco inteſtino, & coli cellulis demum ſcybala figurari, & foetere incipiunt (11).

*Arctata*] Receptus error eſt, Inteſtina eſſe

[9] *Peritoneo, in Text.*] Omentum ipſum morboſum ſcirrhofumve adnatum Peritoneo, habet Ruyſch. *Obſ. Anat. Chir.* XVIII. LXIII. & ipſe cancroſum pugni craſſitie vidi, hepatis atque ventriculo firmiſſime adnatum, ab icſtu equi.

[10] Et valida vis eſt. Abdomen enim in inſpiratione pene in ſphaerae dimidium tumens, poteſt reprimi valida exſpiratione aut conatu vomendi, in lineam rectam, aut inter pubis oſſa atque coſtas excavatam; ſed prior contractio ſi quidem abdomen hemiſphaerium foret, quod nimium eſt, eſſet ab 11. ad 6, qua poſterior etiam major eſt, tanta certe, ut ventriculum exinaniat, per experimenta HAGUENOTI.

[11] Plerumque & in homine non aliter ſe habere vidi. Sed in cane excrementa Inteſtini Ilei ſimillima faecibus coli WEPFERUS *de cicut. aquat.* p. 144. & in foetu.

se tubum papyraceae tenuitatis, aëre turgentem. Verum quicumque vivorum animalium intestina viderit, aut in homine, emicantia per vulneratum peritoneum, ille certe novit, repere lumbricorum simillima, crassa, angusta (12), neque pellucentia, & cavitatem pene nullam habere, nisi a flatu fuerit, aut a morbosa intestinorum relaxatione.

*Perpetuo*] Motus peristalticus perennis (13) est, & a morte perstat, & (14), postquam quievit, facili opera suscitatur. Uti ipsum etiam cor, flatu per ductum Thoracicum adactò, motus suos integrat (15). Neque aliam reperio rationem, qua ex perfecto deliquio animi, ubi jam pulsus omnis quie-

[12] Multoties vidi ventriculum & colon non ampliora Jejuno. gracilia, & ad tactum densa (vid. XCIII. not. 5.) ut pene nulla sit diameter praeter crassitiem; sed a morte, sublato peristaltico motu, aër, renixum non inveniens, dilatat relaxatas membranas, atque crassitiem eadem opera minuit. Confer STUART. *de mot. musc.* c. XII.

[13] Omnino quiescentem vidi, tum integre, post inediam, tum in aliqua parte intestinorum, dum movebatur alia portio, ut hic laxarentur, ibi constringerentur, alibi sursum, alibi ad anum agitantur, demum alibi quiescerent.

[14] WEPFER. & passim p. 89. & DRELINC. & MERY *hist. de l'Acad.* 1699. vid. XCIII. not. 6.

[15] In variis animalibus PEYER. *Parerg. Anat.* VII. WEPFER. *de cicut. aquat.* p. 303. & apud BRUNNERUM *de Duoden. gland.* p. 73. 74.



quievit, ad vitam possumus revocari, nisi ex motu novi chyli parati in intestinis, atque per motum intestinorum peristalticum superstitem in ductum Thoracicum ipsumque cor propulsi, sic ad vitalem efficaciam cor elanguidum revocantis. Incipit autem ab oesophago, & definit in Intestini Ilei fine, neque enim crassa intestina motu peristaltico agitantur: atque descendit a pyloro ad coeci initium, denuoque *circumlatus* adscendit a colo versus pylorum; peculiaris tamen alicui intestini particulae, neque unquam universalis.

*Diluendo*] Copia (16) diluentis liquidi aesti-

[16] Ex comparatione laxissimi organi secretorii, atque maximae copiae liquoris, ex quo fit secretio. Pancreaticae certe arteriae vix aequant decimam partem Coeliacae arteriae, cum Splenica, Coronaria, Hepatica, Gastro-Epiploica utraque, Duodenalis, omnes adeo magna ratione exsuperent. Sit ergo lumen omnium Pancreaticarum 1. Lumen Coeliacae 10. Et Mesenterica in nupero subjecto lumen habuit, quod fuit ad coeliacam uti 900. ad 289. Mesenterica vero inferior ad eandem uti 441. ad 289. Quod si Duodenam facias aequalem Pancreaticis, lumenque ejus sit 28. 9. erunt lumina Arteriarum Intestinalium 28. 9. 900 + 441. 1369. 9 ad 28. 9. quae ratio est fere 48. ad 1. Sed licet utique velocitatem arteriarum intestinalium aequiparare illi pancreaticarum, quam facile ipsa

aestimari potest ex amplitudine fistulae intestinalis; ex copia, & magnitudine articularum mesentericarum, quarum calculum inivit BORELLUS (16\*); ex RUYSCHII experimentis, in quibus ceracea materia in ipsum intestinorum cavum tubum exsudat; ex cibi phaenomenis, qui post tantam portionem liquidioris substantiae resorbtam, in intestini ilei sine vix crassior est quam quidem ad Ventriculum, manifesto argumento, insignem quantitatem novi humoris accessisse, quae debet aequalis fuisse resorbtum chyli quantitati, nisi enim aequalis esset, aridae fierent faeces in ipsis tenuibus Intestinis. Ea vero nonnisi ex Arteriis Mesentericis adfundi potuit XCI. no. 3.

[*Separando*] Nunquam felicius omne liquidum educitur ex materia pultacea, quam hac ratione, ut ad pulvem eam adfundatur liquoris quam maxima copia, ille vero liquor omnis forti expressione separetur, denuo adfundatur novus, & denuo iterata expressione eliciatur, idque denuo fiet felicius,

ipsa repletio aqua facta demonstrat majorem esse. Ergo, siquidem intra viginti quatuor horas salivae pancreaticae in cane fecernuntur unciae tres (*de GRAEF oper. p. 416.*) & in homine ter ponderosiore unciae novem, erit secretio succi intestinalis librarum medicarum triginta sex, si-ve unciarum 428. Neque videor calculum fecisse nimium, & facile crederem positiones intra veras esse.

[16\*] Confer not. 5. ad CVI.

cus, si eam pultaceam materiem in multas ex ordine cistulas admiseris, in quarum singulis coercita, & conclusa, non aliam non resistentem viam invenerit, praeter eam, quae duceret ad venas absorbentes. Sic enim id omne obtinebitur, quod in pulte fluidum fuit. Sed in Intestinis id ipsum cibo contingit, in amplo tot pedum spacio, per aliquot continuas horas; sequitur ut, quam diligentissime fieri potest, id omne emulgeatur ex cibo, quod utile & fluidum adfuit. Ex semine farinoso aliquo, utile ab inutili efficacissime separatur, dum, adfusa magna aquae copia, lactescere cogimus farinam, lactescentem exprimimus, recentem aquam adfundimus, exprimimus denuo: ita nihil omnino reliqui fiet, quam quod crassum, & insolubile, & terreum in farina fuit (17).

*Volatilem*] Nempe particulae ciborum ita adtenuantur, ut per adscendentes atque longissimas ambages viarum lactearum, absque mora, obstructione, lentore, ad sanguinem

[17] *Emulsionem* vocant, vid. BOERH. *Elem. Chem.* II. Proc. XXI. Sed in vivo homine, liquor diluens valdius quam aqua dissolvit, & calor accedit, quasi lenior destillatio, & emulsio diuturnior, quam quae fit ex arte; superest ut longe efficacius operentur Intestina quam Pharmacopolia. Est autem eo felicior similitudo, quo propius omni dote chylus & lac animalium ad emulsiones accedunt.

nem meare possint. Atqui volatilia (18) reddi corpora, docuit BOYLEVS (19), quando „, vel I) superficies corporum adeo augetur, ut gravitas tandem pene pereat. Ita aurum bracteatum, in adeo immensam superficiem dilatatur, ut aquae innatet (20), in aëre aegre descendat, idem aurum, quod omnibus corporibus notis adeo magna ratione ponderosius est, specifico suo pondere. „, vel II) adplicatur fixo corpori aliquod corpus volatile (21) & mobilissimum, quod gravius illud ita amplectatur, ut adscendens, secum id elevet. Ita ferrum (22), adeo pon-

[ ] Volatilia dicuntur, quae eo igne adscendunt, quo nondum adscendit aqua BOERH. II.

P. 345.

[19] *De mechan. product. Qualit. p. 223. 224.* conf. FREIND *praelect. Chem. Prael. III.* Ita aquae particula 800ies aëre gravior, si diametrum nanciscatur decies majorem, in aëre natabit, ut quae millies se ipsa fit tenuior. Inde pulveres facile adscendunt.

[20] Non vere volatile fit aurum in laminas tenues bracteatum, sed ab aëre adhaerente sustinetur, eo destructo cadit PETIT. *Memoir. de l'Academ. des scienc. 1731.* p. 78. seqq.

[21] BOYLE l. c. c. V.

[22] Id. p. 242. Addi debet omnino impulsus ab igne: & destructio cohaesionis BOYLE. l. c. c. IV. FREIND. p. 16. Solus nempe ignis summus omnia volatilia facit, si adcedit solutio partium, uti argentum cum antimonio volatile fit; vel solus omnino,



ponderosum & metallicum corpus, addito ammoniaco sale adeo redditur volatile, ut sub florum specie adscendat in alembicum. Utraque methodo utitur natura ad mutandum chylum (23). Calore expandit, & diluendo auget superficiem particularum nutritiarum, & idem diluens liquor mobilissimus segniores alimentorum particulas secum elevat, sic *volatile* fit (24), quodcunque fixi adfuit. Quae certe mutatio adeo potens est, ut bos vel homo, solis vegetabilibus pastus, quae salem & acidum & fixum exhibent, sanguinem ex iisdem conficiat, qui & volatilis fit, & in alcali sponte sua convertatur. Volatilem naturam animalium insigni argumento confirmat BERNIER (25), quando narrat, quod intra paucissimos dies, calore coeli Indostanici,

omnino, quando in foco speculi caustici auri magna pars in fumum exhalat HOMBERG. *Hist. de l' Acad. des scienc.* 1702. p. 47. Mem. p. 50. Ad alteram causam volatilisatio urinae per calcem referri debet.

[23] Chylus nondum est alcalescens, neque factis volatilis. Nam & ipsum lac acefcit, & immobilem caseum habet. Sanguinis demum motus repetitus volatilitatem facit, neque ipso quinto die generatur evolutum alcali in Urina BOERHAAVE. ll. p. 306.

[24] INST. MED. LXXXVII. not. 15.

[25] Non invenio, sed verum esse, abunde demonstratur alijs experimentis.

nici, Elephantis, animalis vastissimi, cada-  
ver consumtum, in auras abiverit, & solum  
reliquum fecerit sceleton. Sic in Hispania  
faeces humanae, per vicos projectae, calore  
coeli, una die in pulverem inodorum tor-  
rentur, neque inficiunt aërem putredine  
(26).

*Macerando*] Tenacissimae & lubricae  
pelles (27), sola maceratione (28) ita prae-  
parantur, ut alibili succo omni educto,  
sola exsucca crusta per alvum expellatur.

*Resolvendo*] Ita ut humores, qui per va-  
sa minima animalium & vegetabilium  
mo-

[26] Salubris MADRITI aër, & homines lon-  
gaevi, ubi maxima inmundities.

[27] Princeps de SOUBIZE in obsidione *Rupellae*  
propriae rhedae corio vixisse dicitur. Rhe-  
gienses in dira obsidione pellibus vixerunt  
DIODOR. SICUL. XIV. c. 112. Belgae  
in ora deserta BENGALAE naufragi, pel-  
lem bubali, ab undis marinis in litus ejecti,  
putrefactam avide devoraverunt. *Hist.*  
*d' un naufrag.* in collectione des Voyages  
qui ont servi a l' etabl. ac LERYUS te-  
statur, se famem non magnopere refor-  
midaturum, dum coria & pelles praesto  
sint *It. Americ.* p. 408.

[28] Non facile subigi, demonstrant experimenta  
in canibus facta WEPFERRI de *cicut.*  
*aquat.* VERCELLONI de *gland. conglob.*  
*Oesoph. Sect.* 11. neque enim ea animalia  
pelles, quas integras deglutiverant, visa  
sunt magnopere immutasse conf. LXXXVII.  
*not. ossa:*

moventur, effundantur ex diffractis vasis, & per vasa lactea resorbeantur. conf. LXXXVII. *not. fibras.* Adplicatur nempe ad particulas eas nutritias eadem vis tritus, qua natura ad eas conpingendas olim usa fuit. Neque tamen tenaces pelles, & membranae vi vitae destruuntur, quia nempe eae quatuor aut ultra mensium continua NATURAE opera fabricatae sunt, ad destructionem vero vires humanae longe breviori tempore inpenduntur.

*Oscula]* Cum minuties horum vasorum omnem aciem instrumentorum eludat, multi exstiterunt, qui iter chyli ad vasa adeo exilia non aliter existimarunt explicari posse, quam per suctionem. Nempe Intestina, exemta e cadavere, abscissa, inflata, continent aërem & aquam, neque videntur adfuisse pori, qui liquidum ex cavo intestinorum susciperent. Verum id fit ob deficientem motum peristalticum, & collapsum osculorum resorbentium, nunc inanium & flexilissimorum. Crassum certe lac nunquam subiret vasa lactea, si liberum iter nactum esset per intestina, sed coercetur ubique, & moras patitur, adeoque repetito offertur vasis lacteis, tot vicibus, ut necessario ocius serius osculum commodum offendat, per quod subire possit. Namque in animale modo extincto, si tenuem tincturam pigmenti Indigo injicias in intestina, tuncque conservato calore, addas mollem compressionem, qualem chylus patitur, ut resorbtio adjuvetur, tunc lactea visa sunt tingi colo-

re coeruleo (29), quod experimentum in Anglia factum est. Esse vero in ipsa morte rationem, cur oscula lacteorum pene nullo experimento possint conspicua reddi, vel exinde adparet, quod idem contingat venis Mesentericis (30), namque per eas flatus ex intestinis ad sanguinem promoveri non potest, cum adeo evidentibus osculis, aquam, aut ceram ad cavitatem Intestinorum demittant.

*Remorandis*] Ex unciis quatuor panis, jejuno corpore adsumti, totis viginti quatuor horis, semper aliquid alibile superest, quod resorberi possit. Id fit ob valvulas, motum peristalticum retrogradum, (xciii. not. 5.) & tubi intestinalis longitudinem (xcv. not. 1.) quibus fit, ut eadem alimenti

[29] LISTER. *Phil. Transf.* no. XCV. p. 6060. MUSGRAVE no. CLXVI. p. 812. & uterque apud LOWTHORP. *Abrigdm.* vol. III. p. 101. *seqq.* Idem, sed aqua, imitatus est KAAUW. 486. Sed flatum etiam ex intestinis se in lactea penetravisse BARBETTE, apud I. M. HOFM. in *van HORNE* p. 104. paradoxo experimento.

[30] In homine & quadrupedibus non succedit, sed in avibus flatus ex Intestinis ad sanguinem migrat PEYER. *de Gland. Intest. Exerc.* l. p. 32. Facile vero potest ex Mechanicis ratio reddi, quare exigua, & flexibilissima vascula pendula a columna aëris obliqua facillime prosternantur, cum ex infinitis columnis paucissimae sint, quas recipere possint.



menti drachma , centies omnino adplicetur  
 vasis absorbentibus, priusquam in crassa In-  
 testina possit pervenire , & toties id ex ea  
 drachma exhauriatur, quod fluidius in ea  
 est. Hoc artificium, producendi fistulam  
 Intestinalem in magnam longitudinem, a  
 NATURA (31) pene in omni animalium  
 genere

[31] Sapiientissimus CREATOR pro diverso pa-  
 stu animalium, diversa organa fabrefecit.  
*Carnivora* animalia, quae cibo molli u-  
 tuntur, & esuriunt atrocius, brevia intesti-  
 na habent, Cola brevissima & simplicia,  
 Coeca exilissima. Leo (*diff. de anim.*)  
 Tigris WOLFSTRIGEL EPH. NAT.  
 CUR. Dec. I. ann. II. Obs. VII. Felis  
 GREW. l. c. p. 3. Corvus Aquaticus PA-  
 RIS. p. 105. Crocodilus Mem. de l' Acad.  
 1693. Bombyx MALPIGH. p. 22. T. II.  
 f. 1. Quibus victus ex gramine & foeno,  
 tolerantia famis, & mitius ingenium, iis  
 longa Intestina, colon cellulatum, & am-  
 pla Coeci appendix, ut Equo GREW.  
 l. c. T. XXV. Bovi GREW. T. 18. &  
 PARISINIS p. 100. & si praeterea velo-  
 cissimo motui destinantur, longissima in-  
 testina, Coeca magna, ut Lepori, GREW.  
 l. c. p. 10. Cervo PARISIN p. 130.  
 Phocaenae, cui vigesies corpore longiora  
 SCHELHAMMER EPH. NAT. CUR.  
 Dec. III. Ann. VII. VIII. app. p. 20. &  
 KULMUS ib. 1727. p. 12. Aliquando  
 pro longitudine intestinorum sufficit u-  
 nica lamina spiralis, uti in Galeo pisce  
 (cui Intestinum vix sesquipedem aequat)  
 PARISIN. & in Carcharia STENON.

genere adhibitum est, sed pro ratione ad diversas & compositas reliquarum partium fabricas, mirabiliter varium. In Lepore (32) intestina brevissima sunt, ne velocitati animalis officiant; verum Coecum eidatum est amplissimum, in quo spiralis valvula intus cavitatem ita dividit, ut omnia longissimorum intestinorum commoda conserventur in brevissimo spacio. Galeus, piscis rapacissimus, Intestina vix pede longiora habet, verum per eorum cavum pulcherrima spiralis lamina deducta est, quae moram imponit itineri cibi. Cervo Dama Laponica, quae *Rangifer* (33) dicitur, habet intestina longissima, sed minutissima simul,

post *Myolog. spec. idemque in Raja de musc. & gland. p. 60. & Lumbrico WILLIS de anim. brut. T. IV. f. 1. Atque in universum, quibus breve intestinum est, liquida & foetida excrementa sunt, uti Viro illo avidissimo & perpetuo famelico DIONISII (not. 1.); quibus longa, siccae faeces, cibus parcius & fames modica. Homini, animali omnivoro & mediocriter se habente, omnia mediocria. Coecum exiguum, uti carnivoris. Colon longum & cellulosum, uti herbivoris. Longitudo quam illis major, minor reliquis.*

[32] Vid. in Cuniculo GREW. l. c. & T. XXIV. & in lepore RAI. apud LOWTHORP. vol. V. p. 337. In Struthiocamelo VALISNERI vol. I. T. XXX. f. 1.

[33] STENONIS *Act. Danic.* 1670. l. p. 275.

simul, ut & validissimos motus, & longam inediam, ferre possit.

### §. XCVI.

*Duodeno*] Antiquissima est divisio intesti-  
norum in tenuia, & crassa, & tenuium  
denuo in Duodenum (\*), Jejunum, &  
Ileum. Quaerunt recentiores, quatenam  
fuerit eorum nominum necessitas, cum te-  
nuia unus sint, & continuus canalis; sed  
sapienter certe eas regiones distribuit NA-  
TURA, & secuta naturam *veterum* industria  
observatio (\*\*).

*Reſtitudo*] Hoc solum Intestinum, & in-  
itium

[34] *Crudis, in Text.*] Et praeterea contra tur-  
pissimam perpetuo egerendi necessitatem  
longitudo Intestinorum est praesidio GA-  
LEN. *de Uſu part.* IV. cap. XVlll.

[\*] Cujus nomen exſtat apud HEROPHILUM  
GALEN. *admin. anat* L. VI. c. 9.

[\*\*] Imo vero, niſi nomina incommode mu-  
tarentur, omnino videretur obportunius,  
ut duo tantum tenuia intestina eſſent,  
crassa totidem. Duodenum quidem ipſa  
ſede ſupra Meſocolon tranſverſum ſe di-  
ſtingueret a reliquo volumine, in inferiori  
abdominis cavea conſtituto. Colon vero  
a Recto ligamentis, & cellulis, & fibris  
tranſverſis, quae in Recto longitudinem  
ſequuntur. Ita de Coeco dubitatio exi-  
meretur, & dubii limites Jejuni & Ilei  
non eſſent incommodi.

itium Jejuni recta (1) sunt, reliqua omnia in mirabiles & vix describendos gyros implicantur.

*Omenti]*

- [1] Non possum tueri sententiam PRAECEPTORIS, quae neque tum satis firma est, quando Duodeni finis ad insertionem ductus Choledochi ponitur; Neque terreor auctoritate RVYSCHII, qui Duodenum „intestinum Rectum brevissimum vocat *Decad. Advers. II. p. 45.* Nempe Duodenum ex Pyloro primo leniter sursum [EUSTACH. T. X. f. 3. SANTORIN. C. IX. §. VII. MONRO *Edimb. Eff. IV. p. 66.*) deinde magis retrorsum (WINSL. IV. 105.) & paulum deorsum pergit, ita ut duplici, vel triplici alternatione iter in universum transversum emetiatur, ad usque vesiculam fere fellis. Tunc vero descendit ad angulum rectum, & prius sinisterius, dein dexterius se in Mesocoli duplicationem insinuat, atque ita per inferiorem laminam pellucet. Sed brevi postea inflectitur sinistrorsum, in ea ipsa duplicatione Mesocoli, & simul adscendit modice, atque ante Aortam, comite vena Renali dextra, pervenit ad communem Mesocoli transversam, & Mesenterii radicem, pone Vasa magna Mesenterii, tunque, circa eam radicem conflexum, descendit emergendo in abdomen inferius, estque Jejunum. Confer icones GRAAFII de *Succo Pancr.* EUSTACHII & MONROI. Duodeni vero adsurgens origo postquam flatu distentum est, fit descendens WINSL. l. c. conf. icones GARENG. T. VII. & X. f. 1.



*Omenti*] Pancreati nectitur Intestinum Duodenum. Sed Pancreas est in lamina posteriori (3) *Omenti*: hujus itaque inter-ventu

[2] *Angustia, in Text.*] Imo vero omnibus tenuibus intestinis latius est. VESAL. L. V. p. 499. ed. 1543. SANTORIN. l. c. WINSL. IV. 119. MONRO l. c. p. 71. BRUNNER. *de Duoden.* VESLING. *Syn- tagm. anat.* c. 111.

[3] Omentum de quo VESALIUS, est Mesocolum transversum. Hujus laminae a peritoneo orientes, divergentes, intercipiunt Duodenum, multa cellulari fabrica intercedente, eo intercepto, coeunt denovo, faciuntque Mesocolon WINSL. IV. 106. 119. MONRO l. c. T. I. H. I. idque de Duodeno & descendente & transverso inferiori verum est. Qua primum ex Ventriculo oritur, & retrorsum tendit, ligamento membraneo nectitur ad hepar, atque ab eo habet communem membranam MONRO l. c. G. H. Sed & finis a Mesenterio tunicam externam habet (MONRO p. 68. & I. K.) sola ergo media sedes descendens absque membrana externa est. Pancreas praeterea vasa ad Duodenum adducit.

Sed & BRUNNERI Glandulae reticeri non debent. Eas, leviter tactas a WEPFERO *de cicut. aquat.* c. IX. p. 119. & apud PEYERUM in I. Icone depictas, descripsit, quod in nervea tunica fundatae, tectae villosae, in universo Duodeno, atque ad initium Jejuni usque glandulae sint, generis conglomerati, p.

ventu. Duodenum cum omento & lumbis nequitur, deinde ad hepar per ductum choledochum. Quod necesse fuit, cum destituatur mesenterio, communi reliquorum intestinorum sustentamento.

*Meatu*] Qui scriptorii calami (4) crassitiam habet, & caruncula quadam instructum ostiolum (5), quae liquores ex Hepate

ad

23. 46. ad ventriculum maximae & frequentissimae Ic. I. & II. ad jejunum & raras & exiguae. de *Gland. duoden.* tot. conf. WINSL. 116. 117. Mihi, non conglomeratae, sed *simplices* & mucosae videntur, papillarum similes. An eae penicilliformes glandulae Duodeni distinctae a cryptis RUYSCH. ad BOERH. p. 57? conf. WINSL. & GALEAC. in *Comm. Bononiens.* p. 364. Reticulum SANTORINI, simile forte reticulo RUYSCHIANO in Ventriculo viso, nondum vidi. In vasis Bilariis distinctissimum adest.

[4] Imo vero diametrum trium linearum.

[5] Est eminens papilla, sive monticulus, factus a ductu Choledocho, qui pollicis fere longitudine inter tunicam Duodeni externam & carneam deorsum repit, priusquam aperiatur, hinc intra intestinum prominet, & resectus oblique, hinc longius excurrit, altera vero sede brevior terminatur, subito perforata carnea tunica. Neque hic valvula adest, ut BARTHOLINO visum *Anat. reform.* p. 150. Neque duae, ut VESALIO L. V. 436. edit. LUCD. neque sphincter, ut BIDLOO T. XXXVI. f. 2. f. 1. BRUNNERO de *Gland. duod*

ad Intestinum dimittat, ex Intestino nihil admittat in Ductum. Visus est a calculis ad incredibilem magnitudinem dilatatus [6].

*Gemi-*

*duod.* Ic. ext. Et aër ex Duodeno accessurus non excluditur sed obliqua est insertio, qualis venae Coronariae, Ureteris. Et parum tribuo rugae eminenti, quam *frenulum* dixit SANTORINUS c. IX. §. VIII Conf. WINSLOW. lV. 289. MORGAGNI *Epistol. Anat.* I. §. 31. WEPFER. *de cicut. aquat.* p. 120.

[6] Conf. observationem TACONI apud BIANCHUM *Hist. Hepat.* T. VI. quam sibi tribuit JOSEPHUS POZZI apud MORGAGN. *Epist. Anat.* p. 299. Sed calculi in vasis bilariis frequentes GLISSON. *Hist. Hepat.* c. VII. p. 89. REVENHORST. *de mot. bil.* p. 43. &c.

[7] *Pancreatico, in Text.*] Omnino notus fuit, & ductus pancreaticus, & ejus saliva HEROPHILO & EUDEMO, GALEN. *de semin.* L. II. c. VI. p. 683. edit. FROB. 1562. Deinde MAVRITIUS HOFMANNUS duplicem in Gallo Indico visum anno 1641. demonstravit WIRSUNGO, (BARTHOLIN. *Anat. reform.* p. 113.) qui WIRSUNGUS, cum publice primus ductum demonstraverit, publice suum nomen ei reliquit. Praecipuus, & vulgo cognitus *ductus Pancreaticus*, oritur ab omni Pancreate, ramis fere in uno plano positus, pene recta via dextrorsum tendit, descendit tamen ad transitum venae Portarum, recipit ramum a Pancreatis parte descen-

*Gemino*] (8) Pauca sunt exempla, in quibus ductus Choledochus & Pancreaticus Duodenum in principio pertuderint. In nonnullis, & voracissimis quidem, animalibus tres sunt, & diversae insertiones horum ductuum, ut in piscibus, Leone, Tigride. Insertio vero ita obliqua est, ut non exiguo spacio inter duas membranas duodeni incedat, necessario comprimendus, quoties cibus extendit intestinum. Primum enim

descendente juxta Jejunum, WHARTON. *Adenogr. c. XII.* WINSL. V. 324. ORTLOB. *Oecon. anim. p. 120.* cumque eo aperitur in ductum Choledochum, jam emensum intervallum membranarum duodeni, proxime ejus ostium inferius, postquam eum ad decussim subiit, ad angulos rectos. Totus albus, tenuis, salivalibus adfinis, lineae crassitie, ut justo major fere pingatur apud GRAAFIUM & BIANCHUM. Per morbos etiam digiti capax visus PEYERO *Parerg. Anat. p. 182.*

- [8] Quoties ductus a Pancreatis lobo inferiori ortus, seorsim inseritur. WINSL. l. c. VIEUSS. *nov. syst. vas. p. 279.* Hunc alterum in cane longissimum vidi. vid. HIGHMOR. *disquis. anatom. T. III. f. 1.* & nuper fissum in puero ductum communem, atque alium ramum cum bilario recepto more, alio seorsim sinisterius Ventriculo insertum vidi. Aliquando etiam exigui ramuli in homine seorsim inseruntur. Aliquando vero ex majori Pan-



enim inter extimam duodeni membranam, & carneam paululum repit, deinde Unciae longitudine inter carneam & villosam, quod loco valvulae est, atque facit, ut bilis quidem expedite possit ex ductu elabi, ductum ipsum nihil subire valeat.

## §. XCVII.

Pancreate duplex venit WINSL. 323. Conf. duplices ductus BORRICHI apud BARTHOL. IV. *Cent. Epist.* LI. BARTHOLIN. ib. II. *Epist.* LXX. & *hist.* 32. *Cent.* I. RUYSCH. *Observ. Anat. Tr. de Valv.* no. XII. p. 17. DRAKE *Anthropol.* L. I. c. XV. p. 94. BLAS. *Observ. rar.* P. III. no. IV. p. 146. MARCHETTE *Anat.* p. 37. de GRAAF l. c. WHARTON. l. c. p. 64. RHODIUS *Mantiss. anat.* Obs. XXX. SCHELHAMMER. *Progr. Anat.* XXII. In Quadrupedibus solet simplex esse, in avibus plerisque duplex (Anate, Ansere, Cygno, Gallopavo, Scope) triplex in aliis (in aquila PARISINI). In piscibus pancreatis loco sunt Intestinula, sub ventriculo, copiosa, effundentia amarum, & turbulentum liquorem. (PEYER. *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. *Ann.* I. p. 204. PERRAULT. *Mecanique des Anim.* T. XII. f. 4. BLAS. *Anat. anim.* T. XLIX. L. LII. LIII.) Sed pro coecis habet GREW. sub fin. Neque tamen adeo propinqua ventriculo, succum copiosum fundentia, & glandulosa, absque efficacia in coquendo chylo videntur esse.

## §. XCVII.

*Jejunum*] Duodenum incipit a pyloro, definit in flexione sua (\*): ibi incipit jejunum

[9] *Separati, in Text.*] Plerumque conjuncti sunt, ut Pancreaticus etiam bilem ex Choledochro recipere visus sit van HORNE apud BARTH. *Anat. ref.* p. 114. in homine: & si duo sint Pancreatici, unus Choledochro inferitur BORRICHIVS l. c. WINSL. l. c. quod nuper vidi; aliquando tamen distinctis osculis, in homine, ut BARTHOLINO visum *Epist.* LVI. & LXX. Cent. II. VESLING. *Epist. Posth.* LVII. RUYSCH. l. c. In animalibus, quibus frequenter plures Pancreatici, alias conjuncti sunt ductus, ut in genere piscium, Gallo Indico DISS. PARIS. p. 148. Scope &c. sed distincti in Cane, Casuario, Aquila, Lepore, Hystrice, (ubi totis viginti uncis distant Struthiocamelo, Elephante: vid. de GRAAF & PARISINOS.

[10] *Pauca, in Text.*] Sic & BRUNNER. *de Duoden.* p. 54. SANTORIN. c. lX. §. X. Sed nobis in cane & cuniculo satis frequentia visa sunt, & MORGAGNO *Adv.* III. *Anim.* XVII. HEISTERO etiam in homine *Compend. Anat. not.* 14. LEPROTTO *comment. Bonon.* p. 123. WINSL. IV. 114.

[11] *Minora*] SANTOR. l. c. p. 167. & interrupta.

[\*] In eadem omnino sede, cui ductus Choledochus infigitur. Vetus est opinio, ut ibi duodeno ponatur finis, ubi ductus bilarius

junum dici, quia semper vacuum est: id adgnoscutur valvularum copia. Ileum vero incipit, ubi valvulae rariores fiunt, idemque semper continet materiam ex ventriculo pressam, eo crassiozem, quo Colon est propinquius.

*Rectos*] Quando cylindrus, quae ad perpendiculum adscendit, mutato ductu, fit ad horizontem parallela, nascitur in eo angulo angustia [2]: demonstrant id facile Geometrae;

rius frequentius inseritur, imo non paucissimi id ostium posuerunt in Jejuno: RHODIUS pro singulari observatione narrat, bis sibi visum ductum cysticum in Duodenum aperiri *Mantiss. Anat. Obs. XXIII.* Verum nullus limes certus aut evidens videtur, si ab eo recedas, ubi Duodenum secundam cameram abdominis subit, & proprium Mesenterium nanciscitur.

[1] *Triplicem, in Text.*] Atque quadruplicem, si quidem glandulae BRUNNERI liquorem fecernant, qui coctioni ciborum inserviat, quod enixe defendit BRUNNERUS.

[2] Existimo PRAECEPTOREM non adeo de plicis dicere, quarum efficaciam in morando fluido per vas plicatum inoto, aliter CHEYNEUS, aliter ex LEIBNIZIANA theoria MICHELOTTUS determinavit, *de separ. fluidor.* p. 142. sed de eo impedimento, quod in canali ad angulum rectum flexo oritur, quia ad ipsum flexum circelli contrahentes deficiunt, & ea tantum vi, quae est succedentis liquidi, id pro-

metrae; & ab angustia remora. Id cum contingat in Duodeni fine, mora nascitur, & gradum sistunt commista liquida, Bilis, succus Pancreatis, & adveniens ex Ventriculo semicocta massa alimentorum, prius quam primam Jejuni valvulam superet. Namque adeo conspicua est resistantia in eo angulo, ut viderit BOERHAAVIUS, animalia fame enecta [3], ut lapidiora fierent, habuisse ventriculum plenum bile, quae Pylori resistantiam superare potuit, flexum Jejuni non potuit. Intelligitur ergo utilitas Intestini Duodeni (4), miscere cum massa alimenti, Bilem & Pancreatis liquorem, haec omnia, dum moram inperat flexus jejuni, aliquantisper retinere, inter se conterere. Praeterea, neque Chylum valde resorbet, cum vasa lactea non habeat, vel paucissima, neque succum Intestinallem uberius secernere videtur [5], cum Mesenterico destitutum sit.

DE


propellitur, quod antea est. Quae imminutio virium in angulo acuto etiam major est.

[3] Et perpetuo in famelicis animalibus bilem vidi regurgitavisse in Ventriculum. Vix enim altius Pylorus adscendit, quam emergens a Mesocolo Jejunum.

[4] Et ideo in Equo, animale graminivoro, neque tamen ruminante, Duodenum per amplum, alterum quasi Ventriculum refert BRUNNER, *de Duoden.* p. 28. 29. 30. In homine etiam latius est Pyloro.

[5] De Mesenterio Duodeni v. XCVI. not. 3. Succum





## DE ACTIONE BILIS VTRI- VSQVE.

### §. XCIIIX.

*Amarior*] Est longe amarissimus omnium humorum, qui cum sanguinis motu in circulum moventur. Cum amaritie tamen conjunctum habet aliquid balsamici saporis, quem vix ullum aliud corpus imitatur [1]: Helenium equidem utcunque amaritiam ejus refert. Quo vero firmiori valetudine est animal, & quo voracius appetit, eo acrior & amarior ei bilis est: qualem & in pisce lupo, & in cognomine quadrupede deprehendimus. Quamprimum corpus

Succum vero Intestinalem non secernere, dubium videtur. Habet enim villosam tunicam, nihilo minus rubram a repletione, & vasa ubertim a Duodena utraque, quarum altera superior, eademque dexterior, minor est; altera per totam Duodeni curvaturam & pancreati & Duodeno ramos exhibet. Deinde & a Mesenterica magna, dum ante Duodenum secundum transit, cum Pancreate ramos habet idem Duodenum. Vena Duodena parva ad venam Portarum, major & inferior ad Gastro-Epiploicam abit, & tota ejus substantia ex flavo rubri-coloris est.

[1] Excepto cerumine aarium.

corpus incipit languere, tunc etiam de amaricie bilis degenerat.

*Non fluens*] Inde fit, ut animalibus diutius jejunis (2), vesicula fellis plenissima sit, & pene crepet distenta bile. In suis, quae per aliquot dies jejunaverant, BOERHAAVIUS factò aliquoties experimento, acerrimam, & flavam, & viscosam, & ea copia reperit, ut mire vesiculam distenderet. Cum nempe ductus cysticus ex vesicula ad perpendiculum [3] adsurgat, nihil potest, nisi valide pressus, educere.

*Externo*]

[2] Hoc vulgo, & pene ab omnibus dicitur. Reponit MORGAGNI, in animalibus fame enectis, vesiculam moderate plenam, intestina vero bile uberrime tincta fuisse *Advers. Anat.* III. p. 55.; & ego ipse in homine, quem dicebant fame enectum fuisse, cui certe intestina ab omni cibo aut faece purissima fuerunt, adtatis in ventriculo & Intestinis bilem effusam vidi. De Hepatica dubium non est, quin fluat perpetuo, conf. PECHLIN. *de purgant.* c. XXXVI. REVENHORST. *de circula bilis.* MALPIGH. *de Liene* c. VI. & vide INST. MED. XCIX.

[3] In homine erecto, fundus vesiculae, ultra hepatis oram descendens, imus est & anterior, cervix suprema & posterior, ductus denuo descendit. EUSTACH. T. X. f. 2. Sed hic ipse situs in homine dorso innixus fit horizonti parallelus WINSL. IV. 291. &

*Externo*] Tumens ventriculus (4) nititur in inclinatum collum vesiculae, deinde & Diaphragma (5) hepar, atque vesiculam urget (6). Aptissime vero fit, ut tunc in pri-

& in cadaveribus magis obliquus. Retrorsum inclinatus, & pene transversus visus est, quale quid etiam WINSLOW. agnoscit.

[4] Antiqua haec est explicatio, quam amavit in primis GLISSON. *de hepat.* c. XX. & plerique scriptores proposuerunt: ut sit, cur miremur, potuisse BIANCHUM pro suo invento eam proponere *hist. hepat.* c. XIX. Sed, ut verum fatear, neque tunc laudem mereretur, si nova dixisset. Ventriculus enim sinisterius finitur, quam Vesicula, quae Duodeno obponitur, sed & ipsa dexterior, colo incumbens. Vasa autem Hepatica magna, Vena Portarum, Ductus Hepaticus, Arteria hepatica, fasciculum faciunt, qui & ipse sinisterior est quam vesicula, cum Ventriculo sit dexterior, & vena Umbilicalis, maxime sinistra omnium, respondet principio nascentis pylori. Conf. fig. XII. XV. VESAL. II, & fig. II. T. X. EVSTACH. II. Ut evidens sit, a Ventriculo non posse emulgeri vesiculam, nisi ad eam diametrum distendatur, quam accipit flatu summa vi impulsio: tum demum enim visus est posse vesiculam conprimere.

[5] Praecipua vis est musculorum Abdominis, hepar repellentium retrorsum, exprimentium Vesiculam. Quod fit validius, si tensum Diaphragma renitatur, tunc enim Vesicula in prelo est.

[6] Conf. LXXV. not. 1.



primis bilis in intestinum urgeatur, quando major ejus adest necessitas, nempe tempore digestionis ciborum. Potest vero & ab externis causis exprimi, & sola compressione hypochondrii dextri emulgetur, uti ex rutibus bilosis mox sequentibus adparet. A vomitoriis medicamentis aliquando ita incitatur, ut in ventriculum redundet. Quare peregrinatores, insolentes agitationis & aëris marini, dum convulsam diaphragma valide nititur in vomitum, ipsam bilem, cum Pancreatis succo, & ventriculi liquore evomunt: vocant Nautae *Watergalle*.

*Contractione*] Fibrae secundae tunicae Vesiculae Biliariae, musculares auctore RUY-SCHIO, vario ductu intricantur, aliae sequentes longitudinem folliculi, aliae ad eas transversae (7). Eae si contrahantur, irritatae a Bile, quae acrimonia & nimia copia molesta fit, tunc vero inanitur folliculus.

*Hepatica*] Exstiterunt Anatomici (8), qui Bilem ab Hepate advenire negarent. Imo

[7] Harum, quae robustiores sunt, splendentes, in longos & raros lacertos collectae, longitudinem sequuntur, sed oblique, ut se decussent ad angulos acutissimos. Omnes, si quidem firmior sit ductus cysticus, videntur elevare vesiculae fundum, bilemque effundere vesicula breviori facta. Sed debilis est ea vis, vid. GLISSON. l.c. XX. p. 174. Transversae mihi obscuriores videntur, conf. CCCXLVI.

[8] Duplex hic est controversia, quam & alio loco INST. MED. cap. de Hepate AV-  
CTOR



imo vero eam bilem, quae in folliculo parata est, ad hepar ferri, & ad sanguinem vehi existimarent. Sed non videntur mente satis adtenta rem perspexisse. Nam „Hepar in universum, ratione sanguinis, & vasorum, quae accipit, non aliam functionem habet, praeter secretionem Bilis (9), „Vesicula fellis nimis est exigua (10), neque sufficit illi copiae Bilis, quae quotidie in Intestina effluit „Bilis verissime duplicis (11) na-

CTOR uberius illustrat „Nempe alii Anatomici negaverunt, quod in universum Bilis in Hepate secernatur, „alii id saltem negaverunt, Bilem in Hepate secretam ferri in folliculum, & ibi in Cysticam mutari: Quarum propositionum utramque adfirmat BOERHAAVIUS, in posterioribus scriptis, nam olim negaverat alteram. Primam sententiam, quod omnis Bilis in folliculo fellis generetur, inde ad ipsum hepar fluxura, post BACKIUM (*de Corde S. II. c. VI.*) ornavit SYLVIVS *Dissert. Med. II. p. 13.* licet, alio tempore, aliquam partem Bilis etiam in Hepate separari adgnoverit. *Prax. Med. I. §. XLIV. p. 296.* Rationes opponit PRAECEPTOR huic sectae, quam, dum florere incipit, in Belgio regnantem reperit.

[9] INST. MED. CCCL.

[10] *Not. hujus §. 18.*

[11] Id unum quaerimus „num Bilis Cystica dotibus suis ita differat ab ea, quae ex hepate per bilarium ductum adfluit, ut mereatur *duplicis* nomen. Videtur haec sententia provenisse a JASOLINO, qui bilem

naturae reperitur,, Iter ex Hepate ad In-  
testi-

claram & sinceram vesiculae, turbidam & permistam tribuit ductui Hepatico *Epidoch.* III. c. II. IV. Deinde PECHLINUS l. c. p. 494 hepaticam bilem nigricare, cum cystica viridis esset, observavit in avibus, atque in cane parem adesse diversitatem. Magis obscuram & viridescentem in Vesicula, in Poro aqueam & minus amaram BOHN. *Circul. Anat. Prog.* XVII. p. 233. MALPIGHIUS eadem ratione hepaticam bilem flavam, minus amaram, ad ignem foetidissimam, destructa vesicula puram habuit. *de Liene.* c. VI. & hepaticam non amaram esse observavit in *posth.* p. 47. PEYERUS in noctua, atram & amarissimam in folliculo legit, viridem amoene & tenuiorem in ductu hepatico *Observ. Anat.* p. 113. Bilem hepaticam sulfuream magis esse. Salinam magis & terream, quae in folliculo est GALEAC. *Comment. Bonon.* p. 356. Conf. BIANCHUM *Histor. Hep.* II. p. 942. HOFMANNUM, REVENHORSTIUM & alios. Nobis quidem semper visa est diversitas aliqua, & bilis hepatica, parum amara quidem, & flava & cum lentore fluens, bilis cystica, profundius flava & tenacior, & amarior. Ita tamen, ut haec diversitas aliquando exigua sit, cum nulla visa sit verissimo RUYSCHIO *Observ. Anat. Chir.* XXXI. & amaram esse etiam in minimis ductibus hepaticis adfirmet FERREN. *hist. de l'Acad. des sc.* 1733. p. 52: & similis sit POZZII observatio, & talis, quae a sola mora possit ex-  
spe-

testinum Duodenum expeditum est (13), ex Vesicula difficilior (14) ob ductus Cystici adscensum, & ob angulum acutum, quem intercipit cum cystico ductu hepaticus; ligati Hepatici Ductus tumor inter Hepar

spectari, cum in Elephantis dilatato ductu hepatico, qui loco folliculi est [eo enim caret Elephas] diversitas adsit, & viridis in receptaculo, flava in Poro reperiatur RAL. *Synops. method. quadrup.* p. 138. & in notua, ubi modo dictum est, bilem vesicularis bilis ex hepate per ductus hepaticocysticos adferatur.

[13] Rectissimum, aut a recto lenissime declinans EUSTACH. T. X. f. 2.

[14] Ex vesicula adscendit bilis in homine erecto, not. 3. deinde moram patitur ex plicis cervicis internis CCCXLVI. & aliquando ex duplici curvatura cervicis totius. Reliquum iter rectum est, sinistrorsum, deorsumque. Sed ex Vesicula in Hepar iter longe difficilior. Nam uterque ductus, Cysticus & Bilarius, longe se comitantur, adpositi, & cellulosa substantia conjuncti, tuncque demum aperiuntur in communem Choledochum, & conjunguntur, non acuto angulo, uti fere omnium Anatonicorum & ipsius EUSTACHII icon habet, sed acutissimo & pene nullo WINSL. IV. 302. cont. ic. XII. L. V. VESAL. Quo fit, ut iter ex vesicula ad Hepar, ex Hepate ad Vesiculam difficile sit: neque tamen insuperabile, cum aer id ipsum iter, maxime compresso Choledocho, facillime absolvat.

par & ligaturam,, perennis adfluxus Bilis (15) etiam excisa, & rupta Vesicula fellis,, & aliae (16) gravissimae rationes suadent, fluere utique ab Hepate bilem in Duodenum. Et si velis, nonnisi amarissimum humorem Bilis nomen mereri posse, liberum est, id quod Bilem vocamus, dicere *Lympham hepaticam*, vel quocunque alio nomine designare. [Imo vero etsi verum est, in certis flexionibus intestini Duodeni Bilem posse per ductum Choledochum ad hepar regurgitare, adprime tamen dubium est, num unquam per ductum cysticum bilis hepatici-

Et rationibus BELLINI, *de Mot. Bil. Prop.* XXXI. 175. omnino praestat non uti.

[15] MALPIGH. *de Liene* c. VI. p. 309. *de Hepate* c. VII. p. 264. Ex quibus experimentis adparuit, ligato ductu Choledochi, intumuisse ductum inter Hepar & ligaturam, etiam destructa Vesicula, aut ligato ejus collo. Sic ligato cystico ductu, TECKOPIUS ex Choledochi, intra modicum tempus, tres quatuorve uncias Bilis collegit, apud PECHLINUM *de purgant.* p. 502. & VERHEYENUS ligati choledochi tumorem, post interruptum commercium cum Cystide, confirmat, L. II. *Tr.* I. *Cap.* XVIII. p. 80.

[16] Namque 1<sup>o</sup>. dantur plusscula animalia, folliculo fellis destituta, in quibus non alia Bilis nisi hepatica gigni potest. Elephas (RAI. *synops. meth.* p. 138.) Dromedarius (PARISINI *diff. de anim.* p. 135.) Equus, (ACT. HAFN. *Vol.* I. *Obs.* XI. *Vol.* III. *Obs.* xxxv.) Asinus (ib V. p. 272.)



patica in vesiculam regurgitet: idem enim, quem modo excitavimus, obstat acutus hepatici ductus cum cystico angulus. Respon-

det

272.) Cervus (*Dissect. des anim.* p. 131. 132.) Alce (ibid. p. 86.) Tajacu, (LOWTHORP *abridgm.* II. 875.) &, qui forte idem priori, Aper Zain (*WORM. Mus.* p. 349.) Nam de glire, licet exstent experimenta BLASII & PEYERI, dubitat MORGAGNUS ad BIANCH. *Epist.* II. §. 36. Inter Aves Struthiocamelus (*dissect. des anim.* p. 178. & TRANS. PHIL. n. 386.) Pavo (*Act. Hafn.* II. p. 289.) Gallina montana (MOTTE *Abridg.* V. p. 388.) Grus (BARTHOL. *Epist.* XII. Cent. IV.) Columba (*Act. HAFN. Ann.* I. Obs. XCVI. &c. Inter pisces Phocaena RAI apud LOWTH. II. 284. Ex quibus, quae pauca ex multis sunt, apparet Bilem ex hepate solo, abaque folliculi subsidio, parari posse. Sed & hominibus defuisse visa est vesicula, cum minime Bile destituerentur. *Hist. de l'Acad. des sc.* 1701. p. 69. 1705. p. 67. Quo etiam referri potest observatio TACCONI, sive POZZII. in BIANCH. *hist. hepat.* II. p. 962. & in MORG. *Epist. Anat.* II. Exstant animalia, quae & folliculum, & hepaticos ductus habent, sed neutiquam conjunctos, ita ut neque ex Hepate in Vesiculam fellis, neque ex Vesicula in Hepar Bilis meare possit. Et in piscibus quidem frequens est, Alofa, Perca, Lucio, Anguilla, Hippoglossio, Xiphia, apud BLASIUM & in Testudine apud PARISINOS *Diff. de Anim.* p. 195. 196. In-

Dd 5 ter

det BOHNIIUS (16\*), tum demum hepaticam bilem in vesiculam regurgitare, quando communis ductus obstructus est. Verum eam ipsam obstructionem existimo multo magis impedire, ne bilis choledochi ductus subeat cysticum; turgabit enim hepaticus, & angulum cum cystico ductu interceptum magis minuet, atque conprimet cysticum. FELDM. vet.]

*Blandior*] Quandoque dulcis, saltem aquosa, pene pellucida, ut parum habeat flavi coloris. Ut amaram crederent Auctores, ex eo

ter Aves huc spectant Tarda (PARISIN. p. 152.) & Ciconia (EPH. NAT. CUR. Dec. II. Ann. VI.). An hujus fabricae in Cane exempla? videtur ex icone PECHLINI T. III. f. I. licet animalis nomen non addat. Denuo ergo adparet, & hepatis suam propriamque bilem esse, & Vesiculae.

[16\*] Sententia quidem BOHNII est, sed rationes aliae, vide *Progymnasim.* XVII.

[17] Ad not. 8. Altera, & vetusta, est opinio GALENI (*de usu part.* L. V. c. III. *de facult. nat.* L. III. c. V.) bilem omnem in Hepate generari, non autem in Duodenum fluere, sed in Folliculum, ab eo demum in Intestinum fluxuram. LAURENTIUS etiam propriam Valvulam ad eam rem commentus est *Histor. Anatom.* L. VI. c. XX. Eamque COLE *de secret. anim.* c. XLV. & longe durius LISTER. *de humor.* c. XXXVI. p. 369. & ex eo BIANCHUS c. XLIX. XLX. propugnauerunt. Errorem epidemicum refutavit FALLOPIUS

*Obs.*

eo factum est, quod gustaverint mistam in exitu ductus choledochi bilem expressam ex communi osculo. Ea vero amarorem omnino habet, sed a cystica.

*Fugi fluore*] *Mauritius van* REVENHORST aperuit abdomen canis, incidit Duodenum, adprehendit ductum Choledochum, eique caute adplicavit calamum, calamo adpendit lagenam, stillantem continuo collegit [18] bilem, dilutiorem, vix amaram, qualis etiam in hepate vivi aut recen-

*Observ. Anat. p. 745. ed. LUGD. BAT. & ex considerata fabrica docuit, omnino ex Hepate ad Duodenum fluere bilem: quod jam olfecerat VESALIUS. Hanc sententiam confirmavit GLISSON. c. XVII. XX. & BOHN. Namque ab Hepate via expedita in Duodenum, difficilis in folliculum not. 14. 2. Ductus Choledochus duplicem diametrum cystici habet, plus ergo vehit liquoris, nempe eum qui ab Hepate adfluit, cum Bile cystica. 3. Experimenta Anatomica, TECKOPH, MALPIGHII &c. Ut satis constet, quod Bilis ab Hepate ad Duodenum naturali ductu feratur, sed possit a Choledochi pori ostio ad Vesiculam regurgitare, quoties impedimentum adest majus, quam resistentia anguli, quem Hepaticus cum Cystico facit. Sed major fit, flatu replente Duodenum, comprimente ostium Choledochi, motu Peristaltico, & constrictione spasmodica, visa PECQUETO. p. 74. „*

[18] *De circul. Bilis p. 32. prima & secunda hora ad semunciam, deinde paulatim minori*

center mortui animalis invenitur, a Cystica Bile maxime diversa, inprimis in sue [19], cujus Hepar & tres ductus bilarii cum

ri copia. Drachmas duas KEIL. in mollo, (*de secret. anim. p. 72.*) Longe majorem copiam, qui uncias tres brevi tempore collegit, TECKOPIUS. Sed ea ipsa quantitas, magnopere recedit ab ea, quam ex computatione demonstrat FORELL. *de mot. anim. II. c. X. p. 224. Prop. CXLVIII.* & quae librarum est triginta & quatuor. In qua computatione observamus I.<sup>o</sup> si diameter pori Hepatici, & diameter Cystici, sint singulus = 1, summam luminum esse 2, non, ut ponit, 4. Deinde II. iisdem positis, obtinetur, non pondus bilis per ductum bilarium effluentis, verum sanguinis per ramum, cujus sectio sit  $\frac{1}{450}$ . sectionis venae Por-

tarum, & magnae exstant rationes, cur existimemus bilem multo, quam sanguinem, tardius ex Vena Portarum parari. BIANCHUS ex aliis & precariis positionibus, aliam, & nimis exiguam portionem bilis habet, c. XXI. Sed facile adparet, nos ignaros velocitatis sanguinis mesenterici, ignaros retardationis, ignaros adjumentorum, neque diametris satis veris usos, nihil habere, quod absque metu certissimi erroris pronunciemus in numeris.

[19] Quando vesicula deficit, quod non raro fieri observavit HARTMANNUS, bilem hepaticam, flavam, vix amaram, & gratam esse EPH. NAT. CUR. Dec. II. Ann. VII. *Obs. XXII.*



rum humanis maxime conveniunt. Quam blanda sit ea bilis, cognoscitur ex ipso sapore hepatis, quod in omni Pisce, Ave, Quadrupede, gratum esu, blandumque est, cum ab exigua portione [20] Bilis cysticae summam amaritiem conciperet. Copia bilis hepaticae longissime superat eam, quae ex Vesicula advenit. Quod adparet, si consideremus, Hepar esse viscus omnium viscerum amplissimum (21), constare meris vasis absque adipe & musculo, ita laxis, ut aqua ex vena Portarum in venam Cavam facillime transeat, porro sanguinis maximam vim in Hepar conveyi, qui nempe per arteriam Mesentericam utramque & Coeliacam ex Aorta profluxit. Sed de eo etiam experimento constat. Ita REVENHORSTIUS intra bihorium unciam semis, vel drachmas tres collegit (22), quae ratione

[20] Guttae sex unciam aquae notabili amaritie tingunt HEINTKE EPH. NAT. CUR. Dec. II. Ann. VI. Obs. CXXV.

[21] Librarum trium, drachmarum sex in sana femina cujus pondus librarum 108. GLISSON. Anat. Hep. c. VII. p. 80.

[22] Canis hepar est pars vigesima quarta totius. In homine vero trigesima quinta. Caeteris paribus ergo, si tres in hora drachmae cani secedunt, in homine triplo ponderosiore secedent sex, & intra viginti quatuor horas unciae sedecim.

[23] *Circumductorum, in Text.*] Et respirationis. Iter facile est, rami principes ductus Hepatici pene transversi, ipse porus leniter descendens.

ratione intra viginti quatuor horas unciae ad minimum sex prodeunt in cane, & longe majus pondus bilis in homine, cui toties amplius est Hepar.

*Spumofus*] Ille est qui tritu per motum Peristalticum, fotu in loco tepido, & humido, detentus ad angustias Duodeni, fere ad initia putredinis transiens, quandoque per jejunia in ventriculum regurgitat (24), halitum amaricie inficit, & bilis nomine evomitur.

### §. XCIX.

*Acescentibus*] Nihil in corpore humano (1) citius & pejus putrescit [2], quam Bilis, neque unquam observata est acida [3] facta.

[24] Conf. experimentum SCHUYLIJ apud de GRAAF *de succ. Pancr.* C. IV.

[1] *Cystica*] Cum qua nempe ea, quae sequuntur experimenta omnia capta sunt, & qua sola utuntur opifices.

[2] BAGLIV. *oper omn.* p. 439. & digesta dat sal alcali copiosius HENNINGER *de Bile Argent.* 1705. Mirari ergo licet, si bilis balsamum sit sanguinem conservans, ne putrescat, quod post HELMONTIUM *sextupl. digest.* §. 34. toties repetitum est a GLISSONO, BACKIO &c. cum ipsa bilis putredini propior sit, quam sanguis.

[3] Nullum experimentum invenio, praeter piscem Galeum: nam in eo PARISINI bilem acidam reppererunt (*Mem. pour servir. a l' hist. des anim.* p. 54.) Inspidam utique

facta. Sed sponte sua in loco tepido, mox rancescit, detestabile olet, & post longum tempus ambræ odorem contrahit [4]. In febribus ardentibus acerrima bilis est, & faecum odor cadaverosus. Inde etiam fit, ut ea acida alimenta, quibus solis utuntur multa animalia, in ventriculo non desinant acida esse, acidam vero naturam deponant in Duodeno (5), & falsa fiant, aut dulcia. Inde in ipsis teneris infantibus, qui solo lacte aluntur & in podagricis, non acidæ tamen faeces egeruntur, sed flavæ, biliosæ (6): & si quidem acidum vi sua aliquando exluperat, tunc ipsa Bilis victa inersque fatiscit, & destruitur ea  
pars

utique, etiam in folliculo, per morbos,  
GLISSON. *de hep.* p. 371. BIANCHI  
*histor. hepat.* p. 942.

[4] Est observatio AUCTORIS. Ambra grisea dicitur esse coagulum vesicæ urinariæ ceti dentati DUDLEY *Phil. Transf.* 385. 387.

[5] Observatum HELMONTII l. c. §. 3.

[6] Dulces, quas canes appetant, acidorum non studiosi, HELMONTIUS. Quare, si meconium porum choledochum obstruxerit in recens natis, deponuntur faeces albæ, caseosæ, acidum spirantes, quod malum tollitur Rheo, aperiente vias bilarias SENNERT. *de Infantum curat.* c. XXII. &c. Et albæ faeces ictericorum HIPPOCRATES. *Conc.* I. XXXVIII. LXX. Conf. BORRICH. apud BARTHOLIN. *Cent.* III. *Epist.* XCVII. REVENHORST. *de mor. bil.* p. 40.

pars coctionis ciborum, quae in intestinis perficitur. In vitulorum ventriculis omnia acidissima reperiuntur, cum nihil acidi in intestinis adsit. In experimentis etiam adparet, Bilem cum acidis (7) junctam, coagulari, vel praecipitari, mutare certe naturam suam.

*Saponacea*] Nempe oleum reddit cum aqua miscibile, ita ut a corporibus, quibus adhaesit, sola aqua abstergi possit. Sed ea vis est *Saponis* (9), corporis nempe ex oleo &

[7] Cum plerisque spiritibus acidis mineralibus, & cum mercurio sublimato, bilis coagulatur & colorem varie mutat BOHN. *circ. anat.* Pr. X. p. 139. Progr. XVII. fin. BAGLIV. l. c. VERHEY. *anat. corp. hum.* L. II. Tr. I. c. XIX. p. 90. SCHEUCHZER. & DEIDIER. *experim. sur la bile des pestifer.* p. 23. HUBER *diff. de bile* p. 18. 19. Ab Alcalinis vero salibus, etiam solvitur, nisi quod bubula bilis ab oleo tartari per deliquium coaguletur, forte ab acido quod in herbivoris adest copiosius. Reliqua certe alcalia, & volatilia inprimis, bilis dotes proprias, saporem, colorem, fluiditatem augent, manifesto adfinitatis indicio. Vide experimenta modo excitata. conf. inprimis BAGLIVIVM.

[8] *Aliaque, in Text.*] Bilis cum aqua mista pene eadem patitur a salibus admistis, quae bilis ipsa pati solet HEINTCKE *Eph. Nat. Cur.* Dec. II. A. VI.

[9] Qui alius est ex oleo expresso, & sale fixo factus,



& sale alcalino conpositi, ut olea & Terebinthinam balsama, gummirefinas, & alia resinosa; quae aquam repellunt, resolvat in eam tenuitatem, quae aquae sit miscibilis. Eadem certe efficacia fel bubulum de vestibus laneis (10) maculas pingues eluit; Lanae recentes oesypo rancidoque oleo ita conspurcatae, ut respuant colores tinctorum, solent ab artificibus lixivio urinoso, aut bilioso (quod longe pulchrius succedit) praeparari, ut bibulae fiant, venenumque recipiant. Fila sericea (11), quando educuntur ex capsulis glutinosis, quae in ore bombycum sunt, ita visco obliniuntur, ut nunquam colores recipiant, nisi prius eorum pinguitudo lixivio ex aqua & felle bubulo detergatur. Pigmenta, durissima gummata juniperi, & laccae (12), glutina

factus, vulgaris, vel ex oleo stillatio & sale fixo, ut sapo STARKEYANUS; alius ex sale alcalino volatili & ex oleo adtenuatissimo, alcohole, factus, nempe OFFA. HELMONTIANA BOERHAAVE *Elem. Chem.* II. *Proc.* CXXII. & ad hunc quidem propius bilis accedit, si ex sale ammoniacali volatili, & ex oleo humano conflatum dicas saponem.

[10] Conf. HOMBERG. *Memoir. de l' Acad. des scienc.* 1709. p. 469.

[11] Glutine aquam respuente, parato in vasculis intestinorum similibus Bombycum MALPIGH. *de Bomb.* p. 24. 25. T. V. f. 2.

[12] In Bile Myrrham, Bdellium, Resinam, & Gum.

na quaelibet, facillime aqua diluuntur, & fulcipiuntur madido penicillo, si cum Bile terantur supra lapidem porphyriten. Quare, deficiente bile, in Intestinus continuo gluten, vel mucus oritur, si vero abundet, aut iusto fiat acrior, tum vero erodit intestina & deglubit, quod in febribus accidit.

*Alcalina*] Post HELMONTIUM (14) SYLVIVS (15), post SYLVIVM omnis scho-

Gummata solvi &c. GESNER. *Histor. Anim. Quadrup. (de Taur.)* In pictura subtiliori calculus e vesica fellea bubula loco Gummi Guttae POMET. *Diction. des Drog.* II. p. 32.

[13] *Conteritur, in Text.*] Non misceri cum oleo & cum aqua nisi tritu, cum utraque sit ponderosior BOHN. *Progymn.* XVII. p. 246. HOFMAN. *Med. system.* Vol. I. p. 185. Sed facile miscetur levi agitatione. Mobilissimam vero esse, & tenuium partium, vel sola demonstrat transfusio per poros vesiculae, qua late tingit vicina viscera, & integris cochlearibus aliquando colligi potest TULP. *observ.* 27. L. II.

[14] Systema HELMONTII est, bilis duas partes esse, aliam praecipuam, balsamum sanguinis, esse ex principibus causis sanguificationis, aliam excrementitiam ad Duodenum ablegari, & acidum ventriculi cremorem in salsum mutare, De alcalina natura bilis brevis neque perspicuus fuit. V. *sextupl. digest.*

[15] Salem lixivum copiosum, retorridum, spiritum-

schola Batava (16) adfirmavit,, Bilis eam naturam esse, quae sit proxima sali volatili alcalino, cum oleo volatili conjuncto,, & chymum, qui acido fermento ventriculi, & acido succo Pancreatico inpraegnatus est, effervesce cum bile, tuncque portionem terream faeculentam, facta praecipitatione, per intestina discedere,, cum reliqua chymi portio, in naturam vitalis alcali mutata, in vasa Lactea irrumpat,, Verum de tota ea Hypothesi omnino nihil invenimus, quod naturae consentaneum sit. Bilis in corpore humano nunquam est alcalina & in calore balnei,, nec faetet urinosum,, &, si quem odorem habet, aromaticum, & gratum habet,, neque cum acidis effervesce (17) excepto solo oleo vitrioli, quod cum ipsa nempe aqua ebullit, sed turbatur & coagulatur variis modis, pro diversa acidorum indole (& si verum est,

ritumque oleosum ei tribuit DISS. II. VIII. & X. *Tr. de Ictero* p. 592. &c.

[16] SCHUYL. de GRAAF &c. vid. de GRAAF *de succ. Pancreat.* c. V.

[17] Et si videatur effervesce cum fortissimis acidis, quod visum est VERHEYENO, & HOMBERGIO *Memoir. de l' Acad. des sc.* 1700. videtur eadem pati, quae aqua ipsa, incalescens ab oleo vitrioli BOERH. *Elem. Chem.* II. p. 501. Neque cum acidis abit in salem medium, ut solent acida, sed in muriaticum, piscium salitorum similem saporem BAGLIVI. &c.

est, quod egregius Chemicus objicit BOERHAAVIO, bilem cum alumine effervesce, ea certe observatio etiam contra adversarios facit, cum alumen non sit verus sal acidus, neque cum eo alcalia confligant), neque oritur ex igne, quae communis est (18) origo salium alcalinorum, neque ex alio alcalino liquore, cum sanguis ipse a lixiva natura longe remotus sit (19), neque acris est acrimonia alcalina, quam si haberet, eroderet utique & exureret vasa sua, neque syrupum violarum viridi colore tingit (20). Non negamus utique, bilem putrefactione sola in acerrimum alcali abire (21) quod HELMONTIANUS olim Chemicus obposuit BOERHAAVIO. Verum quis sanae mentis homo indolem corporum aestimet (22) ex ea indole, quam ea

COR-

(18) NEUMAN. *Phil. Trans.* 392.

(19) *Elem. Chem.* II. PROC. CXIV. &c.

(20) Tingit utique, sed id potest referri ad colorem bilis flavum, conjunctum cum coeruleo.

(21) Uti albumen ovi, serum sanguinis, urina.

[22] Nam & poma citri corrupta dant alcali volatile NEUMAN. *Phil. Tr.* 392. p. 437. quae ex propria indole acidissima sunt, & Acetosa, valido igne exusta, salem fixum lixivum. Debent vero huc revocari, quae BOYLEUS, BOERHAAVIUS & NEUMANNUS contra analyses Chemicas dixerunt. Eae enim, non partes latentes corporis puras exhibent, sed mutatas addito igne, validissimo menstruorum.

Verum,



corpora corrupta & putrefacta induunt? Bilis certe calore aquae ebullientis nullum falem volatilem exhibet, multo minus datura in calore duplo minori hominis sani. Et ea ratione hordeo facultatem inebriandi tribueremus, quia ex eodem hordeo, post varia artis tormenta, & cerevicia, & alcohol inebrians parari potest. Et si dicas, quod saepe dictum est, bilem non apertum quidem, sed occultum esse alcali, tum vero id dicis, bilis esse aliquid, quod non est. Numquam enim alcalinam in corpore aliquo naturam discere possumus, nisi ab origine, quae ex putrefactione est, vel ex igne, deinde a phaenomenis, jam recensitis.

*Acida*] HIPPOCRATICI in hac ipsa academia (23) aliqui, in oppositum vitium delapsi, Bilem acidam esse docuerunt. Certe cum longe minori veritatis specie, cum  
Bi-

Verum, si quam maxime adesset in bile verum alcali, obrutum interim oleo, & aqua plurima, ut non possit phaenomena alcalinorum salium producere, quod effugium est Chemicorum, recte inferimus, ex iis quae concedunt, neque reliquos effectus alcalini salis praestituram Bilem, quae eos non praestat, qui oculos primi ferunt.

[23] Bilis acidam vetus est phrasis GALENI de atra bile, conf. SENNERT. *inst. med.* L. II. P. II. c. VI. Videtur BOERHAAVIUS respicere ad aliquos SYLVII adversarios, qui in contrarium errorem abiuerint, & bilem etiam sanam fecerint acidam; sed de iis nihil reperio.

Bilis, quascunque demum mutationes patiat, nulla arte possit acida (24) reddi. Quod vero objiciunt, „ puerorum faeces aeruginosas acidum spirare ab admista bile aeruginosa (25), id quidem contra sententiam propriam dicunt. Tum demum nempe faeces acidum spirant, quando bilis deficit, aut post diuturnam cum acido luctam, victa succubuit. Ex quo experimento non magis demonstrant bilem acidam esse, quam oleum tartari per deliquium evicerint acidam naturam habere, quia ex eo oleo, cum olei vitrioli nimia quantitate composito, tartarus vitriolatus confici potest, cujus indoles acidi plus habet, quam alcalini.

*Sed*] AUCTORI haec exhibuit chemica Analysis (26). Cystica bilis bovilla, primum

[24] Phaenomena vide ad *not.* 7. Est equidem in Bile, uti in sanguine & urina, acidi aliqua particula, salis nempe fixi VERHEYENUS (L. II. Tr. I. c. XIX.) fere unam tercentesimam, vigesimam septimam ex Bile eduxit; VIEUSSENIUS vero *Epist. de Bile lacteam* ex bile aquam, olei puto indicium, sibi & VERHEYENO visam, pro acidi indicio habet, non satis, opinor, firmo ratiocinio.

[25] Quare restituuntur haec vitia iis, quae acido adversantur, amaris, & absorbentibus. SYLV. *Prax. Med. App. Tract. I. cap. III.* p. 599. 600. & restituta bile, flavus color faecibus redit, BAGLIV. p. 429.

[26] SYLVII secta promittit copiosum salem volatilem alcalinum, & non parum salis li-

num admoto leni calore, exhalavit Lymphae vix foetidae vel acris, quod efficeret totius ponderis tres quartas partes; reliqua fuit in fundo vasis massa glutinosa, splendens

xivi (not. 12.) Verum experimenta recedunt. BOERHAAVIUS habet aquae

$\frac{3}{4}$  Olei  $\frac{1}{8}$ , salis fixi fere  $\frac{1}{96}$  aut

ultra. DRELINCOURTIUS in *επιμετρ.* ad

*Tr. de Lien.* p. 805. Aquae  $\frac{5}{6}$  Olei &

salis volatilis  $\frac{1}{24}$ , salis fixi  $\frac{1}{192}$ . PECH-

LINUS in *Metam Apoll. & Aescul.* p. 109. ex unciiis XXIV. aquae uncias XXII.

VERHEYEN. aquae, sed oleo inpraegnatae

$\frac{4}{5}$  in qua olei latebat pene  $\frac{1}{11}$ .

salis volatilis minimum, olei em-

pyreumatici  $\frac{10}{327}$  fere  $= \frac{1}{33}$  salis fixi

impuri  $\frac{2}{327} = \frac{1}{163}$  Terrae  $\frac{2}{109}$ .

L. II. Tr. I c. XIX p. 88. 89. In COLLECTANEIS LEYDENSIBUS pondera non habentur, sed spiritus inflammabilis, sales volatiles satis copiose, sulfur, salis fixi paulum, & terra, c. XIC. p. 131. 132. post putrefactionem vero volatiles sales & spiritus. BAGLIVVS affatim etiam salis

dens, ex aureo viridis, amara, quae neque cum acido, neque cum alcalino sale effervesceat, & diu absque putredine adservari potest. Hoc gluten retortae commissum, calore graduum 300. multum dat olei, & calore denuo aucto salis volatilis veri exiguam particulam, atque in fundo multum terrae remanebit. Nam ex duodecim unciis bilis, novem unciae aquae prodierunt, olei duae cum dimidia, salis una, aut altera Drachma. Eadem fere est in sapone vulgari ratio (27) salis fixi ad oleum, ad tres nempe olei uncias additur uncia una lixivi, quae continet salis fixi scrupulos quinque, ut olei ad salem sit ratio, quae 1920. ad 100. In bile humana vero, aqua ad oleum est, uti decem ad duo, ad salem uti 72 ad 1, vel paulo minus: plus nempe aquae in bile est, ut

volatilis, & salis fixi habet. Sed ex priorum observationum consensu, videtur utique „ aquae longe maximam portionem esse „ oleum fere sextam partem aquae attingere „ salem volatilem, in recente bile, aquae vigesimam, olei empyreumatici vigesimam quartam „ salem fixum

I  
123.

[27] Sapo multo est acrior Bile. In sapone lixivi & olei aequales sunt portiones, DALE *Pharmacol.* p. 140. Quae ratio est tripla ejus, quae in bile est. Longe major est ratio BOERHAAVII, *Elem. Chem.* II. Pr. LXXXIII. aequales nempe portiones olei, & olei tartari per deliquium.



ut sapo fieret non solidus, scissilis & denuo diluendus aqua, sed fluidus omnino, aquae peregrinae non indigus. Haec in recente bile vera sunt: Putrefacta vero magnam vim dedit salis alcali volatilis, quod idem verum est in omnibus partibus corporis humani, postquam computruerunt (28).

Com-

[28] *Elem. Chem.* II. Pr. CXV. &c.

[29] *Oleo, in Text.*] Namque praeter priora, residuum ab exhalatione & destillatione inflammabile est, BAGLIV. l. c. p. 428, HOFMAN, *Mede syst.* I. p. 182., & calculorum vesicae felleae plurimi flammam concipiunt absque residuo MORGAGN. *Advers. Anat.* III. p. 59. 60. & HOMBERGIUS verum solidumque adipem ex Bile obtinuit, *Memoir. de l'Acad. des sc.* 1709. p. 469. seqq. Quo pertinet observatio HARTMANNI, qui vesiculæ loco in suis globum pinguedinis vidit. EPH. NAT. CUR. Dec. II. Ann. VII. Obs. XXIII. Sed & origo bilis ex oleo omenti liquefacto huc spectat INST. MED. CCCXXXII.

[30] *Sale, in Text.*] Exigua ejus in Bile portio est, & alius ex natura salis humani, ammoniacoadfinis, in eo diversus, quod sola destillatione abeat in alcalinum *Elem. Chem.* II. p. 312. 357. alius fixus, terra mistus, (not. 24.). Neutrum microscopia detegunt LEUWENHOECK *Arcan. natur. detect.* I. p. 103. Non ab eo bilis amarities, sed ab oleo trito, digesto, rancido, amarescente. Quare bilis animalium ferocium amarissima, ut Leonis; in corpore vero humano quietem agente saepe insulsa & aquea. GLISSON. l. c.

*Combustibilis*] Bilis recens exstinguit prunam cadentem; exsiccata, postquam aqua exhalando dissipata (32) est, flammam capit & deflagrat. Non ergo in corpore humano agit, ut sulfur, verum ut sapo, oleum nempe in aqua dissolutum. Quae vero vomitu rejiciuntur, quando ventriculus ingesta pingua non concoxit, ea ardent quidem, sed aquae supernatant, & a bile diversissima sunt.

*Circumduktorum*] Nempe urina sola acrimoniam habet, quae bili conferri mereatur, reliqui (33) humores longe mitiores sunt. Sed urina verissimum excrementum est, quod in proprium receptaculum repositum, nunquam admiscetur humoribus utilibus.

*Mi-*

[31] *Spiritibus, in Text.*] Oleo adeo adtenuato, ut instar aquae fluat, & cum aqua, vide experimentum VIEUSSENI & VERHEYENI 22. Sed & plurimus aër adest in Bile. Calculus vesiculae felleae generat aërem, quantum sufficit ad replendum spacium 648ies majus calculo; cum ex Calculo vesicae urinariae natus tantum 645ies majus spacium occupet, HALES *veget. static.* p. 190.

[32] Itaque non resina est, quod placuit HOFMANNO: ea enim „ fit acido quod oleum figit (HOFM. *Observ. Chem.* I. p. 61.) neque solvitur ab acidis. Sed calculus vesicae felleae a spiritu nitri dissolvitur HALES *l.c.*

[33] Praeter cerumen, quod veram bilem esse  
LISTER.

*Miscetur*] Intime miscetur cum cibo, postquam soluta est Pancreatico liquore. Accedit enim calor, tritus, & mora in Duodeno. Quare in Duodeno massa tota cibi fluida, similis & spumosa reperitur. Non vero posset efficaciam exserere, nisi misceretur.

*Resolvere*] Pinguia & quae per acidum concreverunt: neque absque bile fieri posset, ut olea subirent vasa lactea.

*Abstergere*] Homines summa temeritate deglutiunt tenacissima quaevis, olea, resinas, terebinthinas, balsama, glutina, ut certe mirari liceat, quod non frequentissime haec viscida cum Duodeno concrecant, & volvulos pariant inmedicabiles. Sed rarissimae sunt horum malorum observationes, si ullae sint. Obstat nempe Bilis, quae saponacea vi olea & resinas [34] aquae reddit miscibiles, abluit, quae adglutinata [35] sunt, concreta resolvit,

LISTER. *de humor.* XXXVI. p. 359. sed ejus exigua est copia, & ad unam sedem fixa.

[34] Huc exemplum pilularum, quae Terebinthinam recipiunt, & expedite omnino odorem violaceum in urinam transmittunt, ut adpareat eas absque mora dissolvi. Huc etiam vires medicae Bilis, ad albuginem, coecitatem ab humoribus crassis &c. expertae FORESTO L. II. *Obs.* IX. conf. MANITII *Hermam* p. 786. & in Chinesisum medicina P. DUHALDE de efficacis bilis Elephantinae.

[35] Abstergere ea quae tunicae villosae adhaerent,

vit, omnibus induit aqueam indolem, ut possint per vasa Lactea trajici. Quae efficacia pictoribus nota est, qui ad resolvenda pigmenta grumosa, maxime felle bubulo utuntur, aqua diluto. Eadem opera, dum cavetur ne stagnent olea, obtinetur, ut non rancecant, quod certe, nisi bilis adesset, fieret perpetuo, cum certissima erosione Intestinorum & Ventriculi. Sola bilis facit, ut pingua possimus subigere, & eo plura toleramus, quo fortior nobis bilis fuerit, praesentes passuri noxas, si bilem habuerimus debiliorem. Tantum abest ab eo, ut pingua bilem generent.

*Stimulare*] Faecibus alvinis mista [36]  
In-

rent, pituitam dividere, excretionem stimulare, pro vero noveque officio bilis proponit BIANCHI, quae & olim a GALENO *de usu part.* L. III. c. IV. VL. V. c. III. & ab omnibus scriptoribus dicta fuerunt.

[36] Olim GALENUS, sed uberius GLISSONIUS, & nuperrime STUARTUS, cum post vulnus vesicae felleae, neque alvum respondere, neque famem ullam subnasci neque somnum succedere videret, cita morte sequente, ipsum motum Peristalticum Intestinorum Bili adscripsit, & cum a recente Chylo somnus nascatur, somni alternam necessitatem. *Phil. Trans.* 414. Sed contrahuntur, & excernunt intestina crassa, ubi Bilis acrimoniam deposuit. Intestina contrahuntur, motu peristaltico, etiam in iis animalibus, quibus nulla bilis est LEUWENHOECK. *Cont. Epist.* p. 105. Pediculis, acaris, &c.



Intestina ad egestionem stimulat [37], & si rerurgitet, famem excitat in Ventriculo. Si corrupta admittance acidi desinat agere, utique obstructions nascuntur, farciuntur intestina, alvus cessat &c. Si abundaverit, facit Diarrhoeas, quales myrrha facit, & Aloe, quae bilis sunt simillimae.

*Dividere*] Vitulus pastus lacte vaccino, id in ventriculo coagulatum habet, tum ex propria lactis indole, tum ex fermento lactis praecedentis. Ibi pars serosa secedit, reliquum fit caseus viscidus, qui per secundum, tertium, & quartum Ventriculum omni liquida parte perpetuo emulgetur, ut rancescens fere, & tenax caseosa massa sola ad Duodenum perveniat, est vero lactis coagulati ea natura, ut tandem pene lapidescat, quod in crustis caseorum videmus. Sed in Duodeno (38) adfunditur Bilis, & tota materia, quae adeo tenax fuit, fluida per anum exit. Vir nobilissimus ad podagram superandam utebatur solo lacte pro perpetuo cibo. Post aliquantum temporis questus est idem, se ad mortis usque viciniam angi, tandemque evomuit maximas turundas casei, ab oesophago in rotunditatem ficti. Vidit BOERHAAVIUS ea mala fieri ex defectu bilis, dedit saponem venetum cum bile permix-

[37] Ex bilis copioso adfluxu diarrhoeae MALPIGH. *posthum.* p. 27.

[38] Semicoagulata effluit HELMONT. *sextupl. digest.* §. 35. In cuniculo vidi, Ventriculum plenum lacte in massam grumofam coacto, intestina nihil nisi fluidum mucum continentia.

mistum, & protinus lac absque noxa toleravit. Iidem homines podagrici, si bilem habeant debiliorem, solent diuturnas patifscitantes alvi, curari vero vel bile ipsa, vel aloë, myrrha, aut aliis bilis quasi succedaneis.

*Chylo*] Nam & tenacia dividit, & motum peristalticum stimulat, & parietes intestinorum detergit, sic ostia vasorum lacteorum liberat.

*Appetitum*] Nihil magis stimulat appetitum, quam amara, myrrhata, aloetica, absinthiata, helenium & ea quae supplere valent Bilis (39) defectum & debilitatem. Imo vero in homine sano bilis videtur ex praecipuis causis famis esse. Novimus ventriculo repleto famem nullam percipi, etiam si sola aqua plenus sit: Quamprimum ventriculus vacuus est, esurimus, si valetudine fuerimus integra. Nempe ventriculus exinanitus flaccidus est, neque resistit irrepentibili, quae in ventriculo irritationem facit, ex qua fames oritur. Confirmatur exemplis hominum, & animalium voracissimorum, in quibus ductus choledochus in ventriculum apertus visus est. *not. 40.*

*Fer-*

[39] Quare in animalibus famelicis bilis vesicula magna, in Casuario (apud PARISI-  
NOS) in Leone (WOLFSTRIGEL in  
EPH. NAT. CUR. Dec. I. Ann. II. Obs. VI.  
& apud du HAMEL Hist. Acad. Reg. sc.  
p. 265.) Et machinae Bilem retardantes,  
ut fiat acrior, sunt in eodem genere, di-  
verticulum ante Duodenum in Catopar-  
do

*Fermenti]* Non sensu stricto, nisi fermentum voces, corpus ea dote praeditum, ut ea corpora, quibus admiscetur, efficaci potentia in suam propriam indolem mutet. Namque haec definitio aptissime Bili convenit. Quod etiam ex eo deduci potest, quod liquor sit maxime humanus, ut qui non fecernatur ex arteria aliqua in continuum ductum excretorium; sed ex eo sanguine, qui longe plures actiones corporis humani passus sit, quam ullus alius sanguis, expertus actionem arteriarum & venarum Mesenterii, Ventriculi, Lienis, Omenti, reditum per venas ad Hepar, iter alterum per novum genus arteriarum, venam nempe Portarum, alterum iter per venas hepatis, per excretorios ejus folliculos, ductusque &c. Adeoque bilis non est excrementum, sed princeps instrumentum coctionis ciborum. Quamprimum bilis languet, nata est causa morbi alicujus Chronici: Chylus enim non potest legitime praeparari, inde hydrops, cachexia leucophlegmatia &c. Error enim in primis viis commissus non reparatur in reliquis.

*Insertione]* In voracissimo animale Struthiocamelo (40) ductus bilarius in ventriculum

do ACT. PETROPOL. I. p. 346. septum in vesicula, in eodem, & utrumque in Leone (WOLFSTRIGEL.), sphincter validus in exitu Vesiculae PEYER. EPH. NAT. CUR. Dec. 11. Ann. I. p. 203.

[40] Locus est, sed perobscurus GALENI *Administr.*

culum inseritur, demonstrante DÜVERNEYO.


*Cysti-*

*ministr. Anat. L. VI. c. XII. ubi videtur describere insertionem ductus Choledochi in Ventriculum: quam tamen longe disertius negat de usu part. L. V. c. IV. Ab ipso tamen GALENO mansit haec insertio in oribus hominum, atque a CAR. STEPHANO L. III. c. X. p. 191. & NICOLAO MASSA [Isag. Anat. c. XIV.] repetita est. VESALIUS semel omnino vidit L. V. C. IV. & C. VIII. ib. & semel CABROLIUS Obs. Anat. XVII. cum observata in eo corpore perpetua nausea, & vomitione: cui simillima est historia in Ferdinando III. Imperatore, apud FANTONVM Diff. Anatom. p. 92. Sed & PAWIUS ductum cysticum in ventriculum apertum vidit in homine Observ. anat. XV. verum nihil addidit observationum. Hoc in hominibus. In animalibus frequens est insertio ductus bilarii in pylorum. In piscibus fere universis, deinde in hystrice DÜVERNEY Memoir. de l' Acad. des scienc. 1692. p. 30. & in Struthiocamelo, id. ib. & Mem. pour. serv. a l' hist. des anim. p. 178. vel proxime saltem pylorum apud VALISNERIUM. Quae fabricae non debent pro singularibus haberi, cum, in jejuno homine, constanter bilis in ventriculum effluat MORGAGN. Advers. Anat. III. p. 55. Alia, & mirabilis insertio est ductus Choledochi in colon intestinum dicta PAWIO observ. ad BARTHOL. histor. n. XVI.*



*Cystica*] Quae vel omnis, vel majori ex parte, fuit hepatica (41), neque ad veliculam potest pervenire, nisi tanta ad duodenum resistantia sit, ut facilius per ductum Cysticum in folliculum remeet. Fit autem acrior, tincta saturatius & amarior, in loco clauso, accedente calore, & quiete (42) (quibus solis omnia in corpore humano magis in alcali vergere incipiunt) reformatione in venulas minimas.

*Hepatica*] Cujus longe major est copia, quam cysticae, ita ut paucae ejus guttae diluendo fiant in lixivium, quo magis ad interiora se penetrare, in cibos agere, iisque se permiscere possit.



## DE ACTIONE LYMPHAE PANCREATICAЕ.

### §. C.

*Lamella*] In homine, nam in minimis animalibus, locustis v. c. & piscibus, fere universum abdomen replet. Situm vero in homine optime delineat VESALIUS. Post eum ASELLIUS (\*) prope saccum chyliiferum in brutis animalibus reperit cumulum

[41] XCVIII. not. 8. & seqq.

[42] CCCXLVIII.

(\*) CXVII. not. 3.

mulum congestarum glandularum; eas Pancreas vocavit, male omnino, cum in homine verum Pancreas minime pertingat ad Mesenterium. Unde factum, ut glandularum mesentericarum agmen curiosiores anatomici *Pancreas Afellii* vocent, ut distinguatur a vero, & VIRSUNGIANO Pancreate, quod in posteriori lamina omenti est.

*Pendula*] Situm optime depinxit VESALIUS, ideoque EVSTACHIUS, qui omnes suas tabulas ad reprehendendum VESALIVM fecerat, situm quidem Pancreatis neglexit, figuram vero ferri equini (\*\*) verius expressit. Nectitur vero Colo intestino & fundo Ventriculi, adeoque in respiratione fursum & deorsum movetur.

*Con-*

(\*\*) T. X. f. 3.

[1] *Sub postico, in Text.*] Pancreatis major sedes ponitur pone superiorem sedem Ventriculi, EUST. T. X. f. III. ab ipso Liene, cui ope omenti nectitur, transversim, ut media sedes sit maxime anterior, ad usque descendens a Ventriculo Duodenum [MONRO Edimb. Eff.], ubi ante Duodenum aliquantum educitur, WINSL. IV. 320. EUST. l. c. & de GRAAF in Ic. 1. haftenus continuo crassius, quo dexterius est. Ex ea vero sede, qua admovetur Duodeno, dilatatur juxta Duodenum in productionem aliquot aliquando unciarum, quam *parvum Pancreas* vocat. WINSL. 324. vidit autem EVSTACHIUS, & depinxit, viderat etiam WHARTONUS

*Conglomerata*] (2) Efficitur plurimis lobulis glandulosis, quorum quivis in acinos resolu-

NUS *Adenogr.* c. 13. BLAS. *Obs. Anat.* P. IV. *Obs.* XIV. Castore &c. & in homine, & longe magis in cane BLAS. l. c. HIGHMOR. . IV. f. i. Tegitur in universum Ventriculo, a quo proprium fulcum inpressum habet, & cellulosa fabrica mesocoli una cum Duodeno obducitur, ut Mesocolon & supra & intra se habeat, WINSL. 320. In homine mediocre, maximum omnium in hystrice. PARISIN. p. 125.

[2] Ex acinis duriusculis, qui ope tunicae cellulosa laxioris uniuntur, WINSL. IV. 321. in qua aliquando adipem reperio. Fabrica pene quae glandulae Parotidis. An ex meris vasculis? ita RUYSCHIUS *Thef.* IV. no. XCLV. VIEUSSENIUS *nov. vas. System.* p. 218. Sed iste quidem, cum excretorios canales orientes vidisse velit, vidit omnino meras cellulosas fibras. An ex vesiculis? Cum acinosum sit, & in piscibus ejus loco sacculi coeci reperiantur, ex vera glandulosa fabrica fercnentes liquorem. PERRAULT *Mecan. des anim.* III. c. III. p. 438. 439. PEYER. *Eph. Nat. Cur. Dec.* II. *Ann.* I. p. 202. HOFMAN. *ib. cent.* IX. X. p. 449. app. Unum est in Lu io BLAS. *Anat. anim.* p. 282. nonaginta sex in Asello id. p. 262. quadringenta in Salmone GREW. *comp. anat. of the guts* T. XXXI. & quadringentis plura in pisce *Liet* PERRAULT. l. c. T. XII. f. 4.

resolvitur: Ex acinorum quolibet provenit emissarium, quod cum aliis & aliis conjunctum ultimo efficit ductu VIRSUNGIANUM. Ex eo ductu lymphæ Pancreatis tanto effluit uberius, quanto validius inter Diaphragma, & plenum atque resistentem ventriculum exprimitur.

*Pancreas*] Ita dictum ab antiquis, quod sit tota caro *παν κρεας* (3), nempe totum absque osse aut tendine edule, vel quod rubicundius sit plerisque aliis in corpore humano glandulis. Posset vocari jure optimo *Glandula salivaris maxima conglomerata Abdominis*, convenit enim cum WHARTONIANA glandula capitis, figura, fabrica, vasis, natura ductus excretorii, indole ejus Lymphæ, quam utraque glandula secernit. Longitudo est fere sex unciarum (4), latitudo duarum, pondus quarta librae pars.

### *Ductum*]

- [3] Nomen apud GALENUM frequens est de usu part. L. V. c. 11. HIPPOCRATES non habet, licet rem ipsam non ignoraverit AUCTOR l. *περὶ αἰείων*. §. I. Sed & in *Εισαγωγὴν ἀνατομικὴν* LAUREMBERGII reperitur. C. XIII. p. 13. namque & ARISTOTELI cognitum fuit.
- [4] Haec omnia varia reperio apud diversos Auctores. HEISTERVS trium unciarum pondo facit, WHARTONUS quinque, existimaverim etiam majus esse. Longitudo major quam sex unciarum, eadem pene quae ventriculi, ut justo brevius depinxerit EUST. l. c.



*Ductum*] Per eum pancreas, probe prius  
 elotum, ad ultima puncta usque reple-  
 ri potest.

[5] *Coeliacis, in Text.*] *Arteriae* Pancreatis plu-  
 sculae, incerto numero, proveniunt ex  
 Arteria splenica, sub Pancreate ad Lienem  
 pergente. EUST. T. XXVI. f. II. IV.  
 VESAL. L. V. f. IV. Sed & alias habet,  
 in parte quae Duodeno adjacet, a Duo-  
 dena WINSL. III. 186. & a Gastro-Epi-  
 ploica WINSL. IV. 325. III. 192. & a  
 Mesenterica superiori id. III. 197. primos  
 omnino ejus ramos.

*Venae* simili origine, ex Vena splenica,  
 per proprium sulcum Pancreatis pergente  
 supra Arteriam, VESAL. p. 262. M.  
 RUYSCHIUS *Epist.* IV. T. IV. f. 2. EE.  
 tum ex Duodena, GALEN. de *Ven. diff.*  
 c. 13. Pylorica, & Gastroepiploica dextra  
 WINSL. III. 245.

*Nervi* a Plexu semilunari abdominis, a  
 Mesenterico plexu, ab hepaticis WINSL.  
 III. 406. a splenicis WINSL. I. c. 408.  
 &c. Haec vasa substantiam Pancreatis per-  
 repunt, in cellulosa fabrica, & suum qui-  
 libet acinus fasciculum habet.

*Lymphatica* vasa non infrequentia sunt,  
 visa MARCHETTO *Anat.* p. 40. ad he-  
 par euntia: & PECQUETO contra  
 RIOL. p. 116. Debet autem cura adhi-  
 beri, ne confundantur cum vasis lacteis,  
 circa centrum mesenterii dispersis, quae  
 passim ab ASELLIO, VESLINGIO &  
 veteribus tribuuntur Pancreati. conf. van  
 HORNE de *ductu Chylif.* p. 278. edit.  
 LIPS.

potest. Ductus Pancreaticus per cellulosam RYVSCHII membranam decurrit in ambitu exteriori Duodeni intestini, deinde perforat musculosam, & aperitur in cavo intestino. Ea obliquitas facit, ut nullus ex intestinis in pancreas liquor fluere possit, uti aliquibus visum fuit. VIRSVNGVS inventor hujus ductus post publicam demonstrationem, sub ejusdem diei finem, ob invidiam pulchri inventi a sicariis occisus est (5\*), neque prosequi potuit novum phaenomenon, prosecutus est autem ex primis FRANCISCVS SYLVIVS.

## §. CI.

*Inspida*] Observaverunt BRUNNER (1) &

[5\*] Hanc traditionem, injuriam certe in candidissimum virum JOHANNEM VESLINGIUM, ex Actis Publicis refutat MORGAGNUS *Epist. Anat.* I. §. 85.

[1] *Exper. circa Paner.* III. p. 19. 20. turbidum, albicantem, falsum. Quibus experimentis simillima sunt PECHLIN. *de purgant.* p. 510. & in *metamorph. Apoll. & Aescul.* p. 112. 113. BOHN. l. c. *Progymnasm.* X. p. 146. VERHEYEN L. II. p. 75. MORGAGN. *Advers. Anat.* III. p. 35. LAMY *disc. Anatomiques.* NEEDHAM. *de form. foet.* c. IV. & in piscibus, quorum succum pancreaticum ad multa cochlearia collegerat, SWAMMERDAMI. vid. *Praefat. ad Bibl. Natur.* Sed & ipse GRAAFIUS, Sylvianae sententiae propugna-

& SWALWE (2) contra alios ejus aevi medicos. SYLVIVS nempe acidum esse pronuntiaverat, seductus ab amore propriae hypotheseos. Verum sapor Pancreatis adeo dulcis est & blandus, ut ab Italis referatur inter cupedines celebres, quae cum thymo, omnium gratissimae ex vitulo habentur, & vocetur *bocca saporita* (2†). Et si quidem aliquando falsus sapor in homine appareat (3), oritur is omnino a sale marino, quo copiose nutrimur: eum enim quotidie ad semunciam adsumimus, neque unquam [4] mutatur in naturam nostram, nam ex urina, per integros sex annos aequè perfectus omni dote sal marinus educitur [5].

*Copiosa]*

pugnator, saepius falsum, quandoque insipidum vidit, de *succ. Pancreat.* c. IV. p. 407.

[2] Nugatorem cur citat PRAECEPTOR? qui nihil solidi experimenti habet, & agnoscit spiritum acidum sub volatili latentem *Pancre. Pancrene* p. 121.

[2†] CARP. *Isagog.* p. 12. 6.

[3] Quare non a sale humano, qui affinis sali ammoniaco in sanguine & omnibus humoribus nostris abundat?

(4) In sanguine & lente crystallina hominis salis marini cubos vidit LEEUWENHOECK. *Arcan. natur. detect.* in *Epistola*, earum, quae exstant, prima, p. 8.

(5) In destillatione Phosphori ex urina putrefacta manet sal marinus in ea massa, quae fixa superest. *Elem. Chem.* II. *Proc.* XCV. &c.

*Copiosa*] Ita ut per experimenta GRAAFII (6), & NYCKII, intra octo horas ad drachmas duas, tres, & integram unciam, ergo intra viginti quatuor horas ad unciam unam, duas, tres, secernatur in cane, qui totus vix decem libras superat; cum interim aperto abdomine, remotis viribus musculorum abdomen comprimentium, squalentibus visceribus, dissipato emolliente halitu abdominis, constrictis a frigore vasis excretoriis, turbata tota animali oeconomia per cruciatus miserrimae bestiae, insigniter certe inminuatur secretionis ubertas. Quare si humani corporis insigne pondus cum canino [7] conferas; si Pancreatis rationem ad reliquas salivales [8] glandulas, (quibus certe omnibus in unam summam conjunctis, Pancreas amplius est,) fecer-

nentes

[6] Molosso cani aperuit abdomen, Duodenum pertudit, ductui Pancreatico, in cane libero, inseruit lagenulam, difficillimo experimento, & quod raro etiam inventori successit. Stillaverunt intra octo horas drachmae duae, quatuor, & in molosso uncia integra, l. c. c. V. p. 416. SCHUYLI experimentum monstruosam habet quantitatem, uncias duas intra trihorium de GRAAF. ib. p. 421.

[7] Facile triplum.

[8] Ex WHARTONI observationibus Parotis est drachmarum quatuor cum semisse, maxillaris, duarum cum semisse, sublingualis unam vix superat, omnes ergo salivales sunt unciarum duarum, sed pancreas quincuncem pendet. id.



nentes tamen intra viginti quatuor horas, plenas uncias duodecim (9); si aestimes perpetuam Pancreatis agitationem ab incumbente septo transverso, ab innixo Ventriculo, a musculis abdominis, cum salivales glandulae [10], soli cuti subjectae, debilioribus respirationis atque deglutitionis musculis, neque perpetuo, neque adeo valide exprimantur: Deinde totum ab halitu universum abdomen emolliente; diametrum insignem ductus excretorii [11]; vim proximi Cordis in arterias Pancreaticas [12]: Ex iis certe omnibus concludemus, plus secerni in Pancreate, quam in salivalibus glandulis, & pondus succi intra viginti quatuor horas vix intra tres libras fore. In piscibus [13], & insectis [14] proportio Pancreatici liquoris ad alimenta multo major

[9] LXVIII. not. 4.

[10] Conf. LXV. not. 1. 12. LXVII. not. 1.

[11] Qui fere lineae diametrum habet. Digiti capacem in cachectica, PEYER. *Parerg. Anat.* p. 182. 183.

[12] Ratio haec inverti potest. Cor enim propius est salivalibus, si iter sanguinis respiciamus, & ductus rectior.

[13] Inmensa vis pancreatum (vid. not. 2. & conf. GESNER. *histor. anim.* L. III. de pisc. p. 364. & passim GREW. l. c.)

[14] An de cicadis PRAECEPTOR? quibus agmen Glandularum ad extremum Intestinum positum adest. MALPIGH. de *Bomb.* p. 26.

jor est, cum pisces existent, quorum Pancreas Hepate majus sit.

*Cordis*] A quo solo septo transverso & Pericardio distat. Huc etiam succussio ab Aorta pone Pancreas incedente, & a vicina arteria Coeliaca, & Mesenterica, & Splenica, revocari debent.

*Acida*] Mirabile videtur, quod ingeniosissimus SYLVIVS (16), Chemicus non vulgaris, & post eum tot egregii viri, Anatomices peritissimi, adseruerint res adeo falsas & adseruerunt adeo pertinaciter. Opinionem conceperant animo, huic plus tribuerunt quam aut oculo, aut veritati. Exstat chemica definitio acidi (17), nota fuit omnino SYLVIO. Verum ex tam multis proprietatibus acidi, ne una est, quam succus Pancreaticus ostendat. Namque I. Sapor non acidus est, in sano homine. Admixtus semicoctus cibus, vel morbosa aliqua muta-

[15] *Affiduo. in Text.*] Quare fere perpetuo vacuus reperitur (SYLV. *Diff. Med.* II. p. 14. DIEMERBROECK. *Anat. L. I. c. X. p. 43. 44.*) Pleno tamen flumine se exonerantem BOHN. l. c. *progymn.* X. p. 40.

[16] Doleo vices naturae humanae, quando errores manifestissimos, solo confirmati animi in veritatem renixu, video defendi, vid. SYLV. *Diff. Med.* X. §. XXXII. seqq. & DISS. VIII. ubi ex acidis faecibus, & bile aeruginosa, aciditatem succi pancreatici tuetur. Hanc sectam secuti sunt SCHUYLIUS, de GRAAF, HARDER (*prodr. Physiol.*) DIEMERBROECK, &c.

[17] Conf. LXXVI. not. 14.

ratio videtur effecisse, ut aliquando de acido aliquid habere visus sit. Neque potuit GRAAFIUS (18) sub oculis Patroni & Praeceptoris SYLVII, adeo omnem sinceritatem ejurare, ut renuerit fateri, succum saepius falsum, quandoque insipidum, saepissime acido-falsum, & nonnisi *quandoque* acidum sibi visum esse. Experimentum vero, quod excitat, in nauta Andegaveni (19), quem calentem secuit, & in pancreatico succo acidum saporem gustu percepit, minus videtur exquisito studio institutum, & aliquid de imperfecto chymo irreplisse. Sapit autem omnino falsum; & in brutis animalibus, non utentibus sale communi, insipidum, quod BRUNNERUS & ipsa res docet. Neque tamen negamus acescere posse in iis morbis, ubi praepotens acidum abundat. II. Nullo experimento unquam visum est efferbuisset cum ullo alcalino sale. III. Originem ducit ex sanguine, qui in proxima Arteria Coeliaca alcalescebat, ipso iudice SYLVIO, qui cum praeceptore HELMONTIO, oleosam, volatilem & alcalinam, indolem sanguinis agnosceret. Sed ex alcali oriri acidum, inaudita est Chemicis metamorphosis, neque in ullo experimento visa: ut plane fidem superet, tantam mutationem in brevissimis canalibus, brevissimo itinere, con-

[18] *De succ. Pancr. in oper.* p. 407. est autem dissertatio inauguralis GRAAFII.

[19] Sed etiam id evertit PECHLINUS, producto teste, contrariam sententiam, & confusam historiam totius experimenti enarrantes, *Metam. Apoll. & Aesc.* p. 112.

contingere potuisse. Respondebunt, succum Pancreaticum ex spiritibus (20) nerveis se-  
cerni, spiritus vero subacidae naturae esse.  
Ita SYLVIVS. Verum non liquet, quare  
spiritus animales, subtilitate sua omnem in-  
quisitionem nostram effugientes, potius di-  
camus acidum esse, quam vero omne aliud.  
Deinde subtilissimi liquoris eam copiam ex-  
cerni, quae generando succo Pancreatico  
sufficiat, neque id credibile videtur. Et de-  
nuo ipsi spiritus nervei, nati ex sanguine  
alcalescente, eadem difficultate potuerunt ac-  
cidam naturam esse adepti (21). IV. Suc-  
cus Pancreaticus non tingit rubro colore sy-  
rupum violarum, aut Heliotropii succum  
(22); neque lac coagulat &c. Si totum cum  
ductu & succo suo exemptum Pancreas in la-  
cte coquatur: neque tunc acescit reserva-  
tum, sed putrescit (23). Unum superest,  
quo

[20] Primum WHARTONUS l. c. c. XII. p. 73.  
deinde SYLVIVS *Diff. Med.* VIII. p. 40.  
*Prax. Med.* L. I. c. LIII. p. 319.

[21] Conf. INST. MED. CCLXXVII.

[22] Tingere adfirmat VIRIDETUS *de prim.*  
*coct.* L. II. c. 3. Sed post similem, falsam-  
que adfirmationem de saliva fidem, non  
admodum meretur. LXV.

[23] Coagulare SCHUYLIUS, DIEMERBROE-  
KIUS. Existimo eos liquamen ciborum  
acidum junxisse Pancreatico succo. Exci-  
tatum enim, & gustabile acidum requiri-  
tur ad lactis coagulationem, & succi Pan-  
creatici tantus acor, qui tingat specilla ar-  
gentea, visus VESLINGIO *epist. posth.* LVII.



quo SYLVIVS se tueatur, occultum in eo succo acidum latere. Sed nihil agit (24). Namque id acidum, quod vires non exferit, quae possint phaenomenis suis ejus naturam declarare, id acidum, longe certe minus valebit perficere efficacissimas effervescentias, quibus destinatur a SYLVIO. Et adparet utique, nullam fuisse rationem, quare SYLVIVS acidam naturam adfingeret succo Pancreatis, praeter necessitatem systematis, quod pugilem requirebat acidum, ut cum alcalescente bile confligeret.

*Alcalina*] Id quidem cum majori specie veritatis licuerit adfirmare, & placuit adversariis sectae SYLVIANAE. Verum & ea non exquisita vera est. Conf. XCIX. not. *alcalica*; eadem enim argumenta etiam hoc loco valent.

*Salivae*] Salivae similis (25) est limpida peluciditate, sapore, natura, organo secretorio & glandulis exiguis in unam majorem conglomeratis, quarum singulares ductus in unum majorem confluent: denique dudum observatum est, quando argentum vivum sali-

MAURITIO HOFMAN. in HORN p. 81. omnino manifesti morbi est effectus.

[24] Conf. contra Chemicos BOYLE *Chymist.* sept. p. 109. &c. PECHLIN. l. c. p. 114.

[25] Uti visum plerisque, BRUNNERO *de Lymph. Pancr.* c. IX. p. 120. SYLVIO *Diff. Med.* II. STAHLIO *Theor. Med.* p. 370. BIANCHO. *hist. hepat.* p. 92. 93. 94. similes glandulae, ductus, succus ipse spumofus, aqueus, subviscidus, finis in canalem alimentarium &c.

salivationem in ore movere incipit, eodem fere tempore in abdomine circa Pancreas dolores aliquos percipi, & saepe pro sputatione diarrhoeam sequi (25\*). Ea una diversitas videtur, quod Pancreas ohnoxium motibus alternis respirationis minus, vel quiescere, vel in effundendo succo ociari possit, quam glandulae salivales.

*Intestini*] Tota, quam late per Physiologiam, Pathologiam, & Praxin medicam patet, SYLVIANA lecta, innititur huic uni hypothese, effervescentiae Bilis alcalinae, cum succo Pancreatico acido. „ Quando vero LUDOVICUS LE VASSEUR (26), quo nomine ipse CAROLUS DRELINCOURTIUS (27) latere voluit, in libello *de Triumviratu humorum*, effervescentiam istam joculari stylo acriter inpetiit; & diversa via DEUSINGIUS (28) adversarium SYLVIIUM experimentis potius, quam ratiociniis jussit pugnare; prodiit adsertor SYLVIANAE sententiae FLORENTIUS SCHUYL (29), & in *libro singulari de Medicina ve-*  
te-

(25\*) *Astruc. de morb. Vener. p. 366. & seqq.*

[26] *De Sylviano humore triumvirali* Paris. 1668. 8. & alio scripto 1673.

[27] Collega SYLVII, acer HIPPOCRATICUS.

[28] Tituli scriptorum sunt *in sylvam Echo*, „ *Tres dissertationes Antisylvianae*, „ *Sylva caedua*, *Sylva jacens*, *de Chyli & faecum secretionem*, scriptae annis 1663. 1664. 1665.

[29] Professor Botanices LEYDENSIS, cujus exstat *Catal. plant. hort, Lugd. Batav.* 1668.

terum (30) novum experimentum proposuit „ non debere negari effervescentiam o-  
 „ mnem inter Bilem, succumque Pancre-  
 „ atis, etsi extra humanum corpus confusi  
 „ liquores, non videantur effervesce, ne-  
 „ que in cadavere, sed in vivo animale ex-  
 „ perimenta facienda. Ergo in cane vivo,  
 „ aperto dextro hypochondrio, ligandum  
 „ esse Duodenum intestinum, ad quatuor  
 „ digitos supra insertionem ductus Chole-  
 „ dochi, ligandum denuo digitis tantun-  
 „ dem infra eum ductum, tunc retruden-  
 „ dum intestinum in abdomen vivi anima-  
 „ lis, & misero concedendam quietem. Sed  
 „ eidem, post aliquot horarum intervallum,  
 „ aperiendum denuo abdomen, atque tunc  
 „ conspectum iri, particulam Intestini liga-  
 „ ti, turgidam, fervidam, tensam, quae  
 „ dissecta, spumam cum valido faetore eji-  
 „ ciat, & ita ad oculum manifestum fore „  
*utique effervesce Bilem cum succo Pancrea-*  
*tico.* Triumphabat secta SYLVIANA,  
 quasi hoc experimentum finem inposuisset  
 bello. Sed praestitisset considerasse, intra  
 duas constrictiones, cujusvis omnino inte-  
 stini (31), coërcitum elasticum aërem, mi-  
 stum

[30] Anno 1670. conf. de GRAAF p. 425.

[31] In cuniculo, quindecim unciarum distantia  
 a Pancreatico ductu inseritur Bilarius. In  
 eo animale ligavit Duodenum VERHEY-  
 ENUS, secuta sunt experimenti S. HVY-  
 LIANI pleraque phaenomena, cum nul-  
 la fieret utriusque liquoris commistio L.  
 II. Tr. I. c. 18. p. 80.

stum cibus, cohibito libero motu, dum interim copiose in loco calente generatur, se expandere vi valida, distendere constrictum Intestinum, spumas agere cum intertrita alimentorum materia, & lymphâ Intestinali, calere inflammatum Intestinum, rubere, & nasci omnia omnino phaenomena experimenti SCHUYLIANI, si quam maxime nullus in rerum natura adesset succus Pancreaticus, bilis nulla. Et succedere id experimentum in quacunque parte fistulae Intestinalis, neque persistere effervescentiam, si resectio, aut resolutio Intestini viam aëri liberam reddiderit. Denique ne quidem in universum de eventu experimenti satis constare, cum sexies tentatum, vix semel ex voto eveniat (32). Non erat itaque, cur insultarent SYLVIANI veritatis adsertoribus: Imo vero, in eodem vivo animale, si ligatura absit, nulla fiet effervescentiae apparitio, & resecto intestino, placide adparebit con- fundi bilis cum liquore Pancreatis, & ex bove recens exemta de folliculo Bilis, cum ejusdem animalis succo Pancreatico miscetur placidissime, uti aqua in aquam se absque renixu inmittit. Imo vero in iis animalibus (33), quorum Choledochus ductui Pancreaticus se inserit, adeo arcto loco, & clauto, con-

[32] Experimentum a veracissimo viro IOH. BOHNIO institutum, non successit *Pro- gymn.* X. p. 141.

[33] Ut in homine, cui adeo vicini ductus bilem vehens atque Pancreaticus, ut saepe omnino bilis Pancreaticum ductum visa fit



confusi liquores, non effervescunt. Neque infeliciter aut cibos coquunt, aut vitam degunt, ea animalia (34), quibus remotissima sede a Choledocho ductus inseritur Pancreaticus.

*Diluendo*] Succus Pancreaticus tenuis est, crassior chymus, viscidus succus Intestinalis, omnium crassissima cystica bilis, quae aliquando in fila potest duci. Verum sapo non agit, nisi aqua dilutus; ita neque bilis efficaciam suam exferet, nisi diluta. Id officii praestat succus Pancreaticus. Et haec ratio princeps est, quare longe plurimis animalibus (35) Pancreas in Duodenum Intestinum

sit subiisse BARTHOLIN. *Anat. renov.* L. I. c. XIII. MORGAGN. *Advers. Anat.* III. *anim.* 19. p. 35. Ita se habet in animalibus plussculis, Vulpe, Fele, Ove, Equo, Elephante, Fulica, &c. Quibus utique et ferbuissent hi succi, etiam prius, quam subiissent Intestinum.

[34] In hystrice distantia viginti unciarum *Mem. de l'Acad. des Scienc.* 1691. In Struthio-camelo trium pedum intervallo *Mem. pour. serv. a l'hist. des anim.* p. 178. In cuniculo unciarum quindecim, teste GRAAFIO. Fracta est utique utriusque liquoris vis prius quam misceantur, & vita atque coctio ciborum effervescencia ea non indiget.

[35] Respondet conjectura experimento. In iis enim animalibus, quibus ductus Pancreaticus longius remotus est a Bilario vesicula vel nulla est, vel exigua, non tanta

Gg

ergo

num se exoneret, aut eodem ostio cum Choledochō ductu, aut certe proximo. In avibus rapacibus (36), quae rarissime aut nunquam bibunt, videtur vice potus esse.

*Adaptant*] Dum bilem admiscet, abstergit intestinale gluten, particulas crassiores in eam tenuitatem dividit, qua possint adeo angusta oscula subire.

*Bilis*] Ita diluitur, ut magna quidem copia admisceatur alimento, nullum tamen amaricie indicium relinquat, vel in Chylo, vel in faecibus, ne in succo quidem ultimi Ileī, cum feces tamen flavo colore manifesto tingat. Nempe bilis hepatica ex propria indole tenuior est, & simul magna ratione superat quantitatem bilis cysticae. Deinde eandem cysticam bilem obruit lymphā Pancreatica, ea ratione, uti magna lactis vis, pauxillum absinthii, aut mercurii sublimati obfuscet. Neque tamen inde deducendum cum HELMONTIO (37), quod bilis faeces alvinas non tingat. Nam dum bilis valet,

faeces

ergo dilutionis necessitas. Nulla in Lepore, Cuniculo, Struthiocamelo, exigua in hystrice.

[36] Et haec conjectura experimento confirmatur. Nempe aves, quibus rostrum aduncum est, non bibunt ARIST. *hist. anim.* LVIII. c. III. p. 1017. Et iis avibus majus pancreas est, longe juxta tractum intestinerum productum. Vide PARISI-  
SINOS.

[37] Triplici experimento demonstrat HELMONTIUS, faeces non amaras esse, exemplo virginis,

faeces flavae sunt, & eo intensius flavae, quo bilis efficacior. Quam primum vero bilis deficit, quod in Ictero observamus, faeces albae secedunt. Et non videtur adeo a fide remotum (38) esse, quod parcissima copia meracae bilis (39), ab uberrimo confluxu succi Pancreatici, & Intestinalis, glutinis PEYERIANI, ipsorum demum alimentorum contraria indole, ita infringi possit; cum aliis experimentis constet, contrariae naturae liquores, uno momento, sola confusione, saporem, omnesque dotes mutare. Ita amarissimae muriae, quae fit Argento in aqua forti dissoluto, si admisceatur sal marinus, subito perit amarities, argentum in pulverem subtilissimum cogitur ad fundum vasis, & muria salissima redditur (40).

*Im-*

ginis, furiosi, & pueri, qui omnes propria excrementa devoraverunt, & quibus omnibus aquose dulcia visa sunt instar pomorum putridorum, *sextupl digest. §. 36. 37. p. 171. 172.* Neque desunt exempla PAPARELLII, & aliorum *σκατοφαγων*.

[38] Princeps causa videtur putredo, quae acidus, amarus, dulces, alios sapores, omnesque odores confundit, ut brassica putrida vix a stercore differat.

[39] Inde Animalia, quibus ductus Pancreaticus destruitur, fiunt magis famelica WOLF vom gebr. der Thier. und Pflanz. §. 74. & INST. MED. CII. not II. &c. Et Struthiocamelus, cui uterque ductus admodum distat, famis est perditissimae.

[40] *Elem. Chem. II. Proc. CLXXXVI.*



*Immutare*] Etiam id de natura salivae est. Vacca ex omni herba acida, amara, aromatica, idem lac dulce & blandum conficit. Femina ex omni cibo (nisi spirituosus fuerit, vel singulari aromatica vi excellat) idem lac praeparat, & puero exhibet. Ea mutatio debetur adfusioni humorum nostrorum, salivae oris, Pancreatis, Ventriculi, Bilis.

*Redire*] De tribus iis libris lymphae Pancreaticae, quae quotidie in Intestina confluant (*not.* 6.), ne Drachma per alvum exit, in statu secundum naturam, cum faeces ficcissimae sint sano homini. Supereft ergo, ut resorbeatur in venas [41] aliquas; & cum brevissimum sit iter [42], poterit centies intra paucissimas horas resorberi per venas, ad cor ferri, secerni ex arteria Coeliaca, & denuo lymphae Pancreaticae nomine in Duodenum effluere:

## §. CII.

*Duplex*] Non quaerimus adeo, an duplex sit bilis, nempe cystica ab hepatica diverfa [1],

[41] Vel Lacteas, quae lymphaticum humorem vehunt, in experimentis LISTERI, & MUSGRAVII. Vol. III. p. 102., vel Mesentericas INST. MED. CVI.

[42] Neque enim in omni parte idem tempus requiritur, pro absolvendo circulo sanguinis. In Corde uno minuto secundo perficitur, in Pulmone fere intra quintam partem minuti primi; neque hic moram per arterias longam fore existimabile est.



[1], sed longe aliam controversiam tangimus, quae recentioribus cum Veteribus intercedit. Fundamenta controversiae haec sunt. In sanguine educto ex secta vena, secedit serum a sanguine, in insulam placentae instar compacto. In sero vero flava est portio, quam Veteres dixerunt Bilem flavam. Deinde in summa placenta, ea in parte, quae aëri exponitur, rutila adest rubedo, quam magis peculiari nomine, sanguinem dixerunt. Pars vero infima, quae vasis solidum fundum contingit, nigrior, dicta est Bilis atra, & decolor tandem serum pituitae nomine distinctum est. Eos quatuor humores statuebant primigenios, & duplicem adeo, flavam atramque Bilem. Verum abusos esse nomine Bilis, nimis videtur manifestum. Serum enim sanguinis flavum est, quod globulos rubros habeat copiosa aqua mistos; Purpura sanguinis aëri exposita splendet, quia aëris contactu magis levigatur; & nigrescit eadem, si inversa vasis fundum contingat. Neutra vel minimum habet indicium bilis, neque est proportio aliqua liquidi peculiaris, & parci, ad partem sanguinis praecipuam & copiosissimam [2].

*Excrementum*] Veteres statuerunt chylum vi facultatis coëctricis elaboratum, per facultatem adtractricem venarum Mesaraicarum ad Hepar trahi, ibi a vi αἱματοποιητικῇ in sanguinem elaborari, & eadem opera  
Bi-

[1] Conf. XCVIII. not. II.

[2] INST. MED. CCXXVI. CCXXVII.

Bilem (3) tanquam sanguinis excrementum fecerni, inque choledochum ductum depelli,, Omnia haec admittere possumus, si facultatum vocibus sanum sensum adjungamus, nisi quod, neque Chylus omnis ad Hepar feratur, neque ibi mutetur in sanguinem. Non tamen negaverim, aliquam Bilis portionem, venis Mesaraicis resorbtam ad Hepar pervenire.

*Praestat*] Multa bona praestat corpori humano, imo vero tanta bona, ut a recta temperie Bilis magna pars bonae valetudinis pendeat, ea vitiata laboret. Ex primariis est instrumentis praeparandi Chyli. Ea deficiente, in ictero, cruditates, faeces albae (4), praedominium acidi in primis, ut vocant, viis. Ea stagnante, calculi hepatis, ductuum choledochorum, vesiculae felleae, chyli vitiata confectio (5). Ea nimis dissoluta, morbi dirissimi, dysenteriae (6), diarrhoeae variae, febres putridissimae, & atrocis indolis.

*Illud*]

- [3] AUCTOR. I. *περι νοσων* L. IV. §. VIII. p. 125. ARISTOTELES *de part. animalium*, L. IV. p. 1172. 1173. GALENUS *de usu part.* L. V. c. III.

- [4] Conf. XCI X. not. 6. & in eodem ictero, ex Bile in sanguinem retroacta, GALEN. *de usu part.* L. V. c. IV. dissolutio sanguinis in aquam, icterus niger. Hydrops.

- [5] REVENHORST *de mot. bilis* p. 140. alvus dura & dolores in Duodeno periodici &c. HOFMAN. *Med. system.* V. P. II. c. III.

- [6] Vetus est Theoria. Huc febres Bononienses

ma-

*Illud*] HELMONTIUS scripsit ante cognitum motum sanguinis (7) in circulum, & si aliquantum supervixit, in ea aetate & fama, systema semel exornatum mutare noluit, neque pene potuit. Cum vero, praeter circulum sanguinis, nihil sit, unde possit oriri in corpore humano calor; interim vero cibi, etiam frigidissimi, & mortui, in similem, vitalemque calorem incenduntur, & in iis, quod acidum fuit, in salsam volatilem naturam abeat, mutatione satis difficulter explicationem recipiente, quaesivit omnino vir *χημικωτάτος* causam adeo mirabilium apparitionum, neque invenit aliam, praeter *Fermentationem* sive miscelam principiorum contrariorum, ex qua calor & motus cum toto systemate communicari queat. Namque per experimenta noverat HELMONTIUS, ex frigidorum corporum effervescentia oriri calorem insignem, exemplo olei vitrioli, quod cum fixo tartari sale ingentem aestum concipit. Cumque praeterea apud FERNELIUM legeret „Pancreas

malignae, certo funestae, nisi accederet fluxa alvus, cum in cadaverum Ventriculo & Intestinis uberrima bilis reperiretur BORRELLUS apud MALPIGH. *posth.* p. 127. Neque tamen id perpetuum est. Bilem dulcem, & aquosam in homine extincto febris continua BIANCHI *hist. hepat.* II. p. 492. crassam & nigram, qualis redditur ab admistis acidis, in peste extinctis DEIDIER *Essais sur la bile des pestiferés*.

[7] Mortuus est anno 1644. primum scriptum HARVEY: prodiit anno 1628.



creas sedem esse chronicarum febrium,, & succum aliquem ibi parari, qui cibo adfundderetur, & praeterea,, bilem longe amarissimam videret accedere, facile factum est, ut persuaderetur (8),,, ex his liquoribus mistis fervorem aliquem in Duodeno oriri, qui toti machinae calorem & motum impertiret &c.

*Sylviano*] Facile ferebantur errores isti in HELMONTIO, vix merituri ullam excusationem in SYLVIO, gnaro utique anatomes, & de motu sanguinis in circulum probe edocto. Ea tamen fuit in eo imitandi HELMONTII cupido, ut non in Duodeno solum statueret effervesce cum succo Pancreatico Bilem; sed in corde dextro (9), iterato effervescentiam fieri, inter Chylum, Lympham & succum Pancreaticum, acidae naturae liquores, & alcalinum, bile volatili foetum, sanguinem: Et ab hac ipsa effervescentia oriri omnem in corde & universa machina vitalem motum. Requirit itaque ad vitae conservationem alcalini salis cum acido pugilatum. Ve-

[8] Fateor, nihil hujus hypotheseos me invenire in HELMONTIO,, dixit equidem bilem esse fksam & volatilem, & a Bile acidum cibum in similem naturam elevari, *sex-tupl. digest. §. 3. de Pancreatico succo*, & de Pancreate omnino ne quidem dilucide cogitavit. Calorem vero in sanguine oriri a sulfure & sale volatili sanguinis in corde contricatis (*in sole Tabernacul. p. 621. 622.*)

[9] Conf. INST. MED. CLXXVII.



Verum fufe hætenus demonſtratum eſt,, Bilem non eſſe alcalinam (XCIX. *not.* 12. 20.) ſuccum Pancreatis non acidum (CI. 16. 24.) & præterea dicetur ad hunc ipſum §. CII. , abſque ſucco Pancreatis omnino animal vivere poſſe, uti vivunt, quæ vel ſolo aceſcente lacte §. L. vel ſola alcaleſcente carne nutriuntur. Quibus omnibus, de natura liquidorum confluentium dictis facile adparet, ſubruï omnia, quæ de eorum efferveſcentia adeo confidenter dicta fuerunt.

*Inteſtina]* Dictum eſt, quod SYLVIVS tribuerit motum ſanguinis inteſtinum conſiſtuit inter acidum & alcali, acidum nempe liquorem ductus Thoracici, ex ſucco Pancreatico, Chylo & Lympha commiſtis, atque alcalinam cum ſanguine bilem, qui contrarii liquores jam ab ipſo duodeno conſigere incipiant (10); nullas inducias fa-cturi in ipſo corde dextro. Verum ſi quam maxime in Duodeno efferveſcerent, non intelligitur, qua ratione ea pugna poſſit per tot anguſtias, & anfractus, perennis eſſe, cum præterea diluentis, & innocuæ, & inſipidæ Lymphae adeo magna vis adfundatur: neque adparet tantas ei fore vires, ut adeo validum motum excitare poſſet, qualis eſt ſanguinis ex corde projecti. Mirari certe licet & ſani & acuti ingenii homi-

(10) Et repetito conſigant in corde dextro Diss. MED. X. p. 55. 56. conf. INST. MED. CLXXVII.

homines potuisse systema serio proponere, ex quo adeo absurdae consequentiae uberime deduci possunt.

*Bile]* Ut bilem diluat, chylo misceat, adjuvet efficaciam ejus saponaceam. Nempe lana sordida sapone repurgatur facillime, si cum aqua calida concussus resolvatur; lentius, si cum frigida misceatur; omnino non repurgatur, si sapo solidus, absque diluente humore admoveatur.

*Tuto caret]* Omnino id videntur innuere experimenta BRUNNERIANA (11); Nempe ingeniosus homo canes omnino multos pancreate spoliavit, qui superstites fuerunt, & satis commode vixisse visi sunt. In iis animalibus videtur omnino defectus liquoris Pancreatici suppletus fuisse secretionem tanto uberiore liquoris gastrici, & Duodenalis (12). Deinde, non demonstratum est, canes absque omni incommodo fuisse victuros, si superfuissent diutius (13), uti supersunt quibus

(11) Qui, dum regnabat SYLVIANA secta, difficillima administratione anatomica eam coepit evertere. Namque alias pancreatis ipsius majorem partem destruxit, *Exper. I. II. IV.* Alias ductum Pancreaticum, aut ligavit, aut resecauit, *Exper. III. V. VI. VII. VIII.* Animalia superfuerunt omnia, neque minus famelica, aut segnioris coctionis.

(12) Quod ipse BRUNNERUS contendit in scripto suo *de Gland. Duoden.*

(13) Objectio est VERHEYENI. L. II. *Traçt. I. c. VI.* nempe nullus canum ultra tres menses

quibus glandulae, etiam Mesentericae, strumofae sunt, sed morbidi, & causarii. Omnino vero & utilem esse, & pene necessarium liquorem pancreatis, demonstrat canalis, quo vehitur, regeneratio (14), observata BRUNNERO. Neque potest liquor ideo vocari inutilis, quod defectus ejus non praesentissimis damnis canem affecerit. Quis Lienem supervacaneum esse adfirmet; sed eo animal carere potest. Imo vero inutilem (15) esse vel vilissimam particulam cor-

menes superfuit. Constat autem, scirrhus maximorum viscerum, etiam diutius absque destructione reliquarum functionum tolerari posse.

(14) Et bis omnino. Et in priori Experimento, VI. p. 52. portiones dissecti ductus se comprehenderunt, & ita in unum coa-luerunt, ut etiam liquido via per renatum tubum pateret. In altero, novus omnino ductus se in Choledochum porum aperuit. Sed is prius jam adfuisse videtur (XCVI. not. 8.), auctus post destructionem ductus majoris, etiam alibi visus BRUNNERO *Exper. VII. conf. PEYER. Observ. Anat. p. 68.*

(15) Defendit impiam sententiam LAMY; adfert exempla partium corporis humani, quarum utilitas ignoratur, & quibus absque noxa caremus, pilorum, pericardii &c. (*discours anatom.*) De pericardio falsae sunt observationes, conf. INST. MED. CLXXXII. de pilis, utilitates aliquae notae sunt, aliae, quod subtiliores, possunt latere;



corporis humani, id quidem refragatur divinae sapientiae ENTIS SUPREMI, quod ita fabrefecit corpora humana, ut exemplar essent perfectionis inter terrestria corpora supremæ. Exsistunt non paucae historias, uti pulmonum (16) alter, ren, lien (17), brachium, femur, a corpore remota, vitam tamen reliquerunt, non ideo inutilia. Sed id certe evincit BRUNNUS, quod voluit evincere, nempe: Pancreas non adeo necessario requiri ad vitam, atque SYLVIO quidem placuit. Id non evicit, animal, cui Pancreas refecaretur, aequè tuto & commode vivere, atque victurum erat, si ea parte privatum non fuisset.


## PRO-

tere; De universa quaestione videtur omnino, hominem in suo genere ad archetypum propriae gentis, diligentissime & perfectissime fabrefactum esse, si vel maximæ dentur aliae perfectiones, aliorum generum, quibus careat.

(16) MALPIGH. *de Lien.* c. VI. p. 302. &c.

(17) Vidi pulmones in hydrope pectoris adeo compressos, & innatos Pleurae, ut nullos adeste incauto videretur, certe tribus lineis vix crassiores; Renes consumptos, ut coriaceus faccus pure plenus reliquus esset, Hepar vomice exelum &c. Confer CCLXXXIX.





## PROPVLSIO CHYLI IN VASA LACTEA:

### §. CIII.

*Rectis*] Fibrarum longitudinalium eae (1) quae sunt in ea sede, cui nequitur Mesenterium, non adnectuntur tunicae communi, ut quae ibi loci nulla est, & suppletur cellulosa fabrica. Quare cum firmamento destituantur, non agunt. Eae vero longitudinales fibrae, quae in obposita convexitate intestinorum ponuntur, & a mesenterio sunt (2) remotissimae, adnatae tunicae.

[1] Si quidem (per XCIII. not. 8.) frequentiores & robustiores sunt fibrae longitudinales, in ea parte, quae mesenterium non recipit, eae contractae, ad carneas transversas, quibus interfertae firmantur, utique arcum suum quaelibet, & omnes, totum Intestinum in arcum incurvatum extendunt. Quod dum fit, protruditur intra cavitatem intestini semi-cylindrus averfa a mesenterio, & ejus villosa tunica propellitur versus semicylindrum fixam mesenterio, & ante villosam fugiens cibus, adnatat liberae orae, quae mesenterio respondet.

[2] *Proximi, in Text.*] Videbatur PRAECEPTOR ora vasorum lacteorum ponere in ea sola sede intestini, quae mesenterium recipit; sed

nicae externae, ad eam firmatae se contrahunt, & intestini arcus, dum in rectum extendunt, in rugas contrahunt, si quidem faciunt breviorē. Dumque simul agunt fibrae circulares, aboletur tota cavitās intestinorum, adductis ad mutuos contactus valvulis, & chylus adigitur in vasa lactea, uti ex presso undique corio guttatim erumpit argentum vivum. Possunt etiam adjuvari fibrae intestinorum ab efficacia Peritonaei, quod a musculis abdominalibus propulsum introrsum intestina comprimit, magis ubi libera sunt & peritoneo obversa, minus, ubi ad Mesenterium firmantur, adeoque chylum versus laxatam partem intestini pellit. [FELDM *vet.* explicationem resorptionis Chyli per Diagramma illustrat, quo demonstrat duas curvaturas intestini cum mesenterii centro facere triangulum, in quo vasorum lacteorum prima itamina versus centrum Mesenterii convergunt, adeoque in transitu ex intestinis propius se contingunt, quam in cavitāte, stringuntur adeo, quo magis intestini curvatura Mesenterica curvata est. Eadem vasa lactea, si in rectum extendatur intestinum a fibris longitudinalibus, rectiori facta curvatura mesenterica laxantur & liberantur].

*Ora]* Praeter vasa lactea, hiant etiam intra intestina orificia vasorum Mesentericorum,

sed omnino in omni ambitu Intestini adsunt, uti quidem in brutis animalibus mihi visum est. *not.* 4. Sed in alio codice mentem declarat.

cōrum, pori nempe ad lentem satis conspicui, qui ceram RVYSCHIANAM admittunt (3). Hiant autem vasa lactea crebriora quidem in parte obversa mesenterio, aliqua tamen etiam in lateribus, ut saepe vidis. Ita vero sunt disposita, ut nihil ab intestino admittant, & solo tempore coctionis ciborum plena reperiantur in animalibus vivis. Eo etiam tempore aliquis ex Asclepiadea familia vasa lactea vidit, cujus rei monumentum exstat apud GALENUM. ASELLIVS etiam, dum viva animalia ad motus vitales perspiciendos aperuit, aliquot a pastu horis, ea vasa vidit, & cum constanter inveniret, descripsit. Sed ignoratio ductus chyli ferri, & praeconcepta animo opinio

[3] Conf. CVI. Sed oscula lacteorum nemini nota esse, alibi dictum XCI. *not. 9.* Nisi quod, per varias conjecturas, GASSENDUS chylum per ductum Choledochum resorberi voluerit; MARCHETTUS *comp. anat.* p. 40. & BAK. *de corde* per pancreaticum ductum; per glandulas PEYERI MURALTUS (*Commerc. epist.* post Paverg. H. PEYER.) quo refero sententiam SANTORINI *c. IX.* p. 171. per poros proprios DUVERNEY *Aët. Petrop.* Vol. I. p. 267. & per ipsos poros inconspicuos membranarum GLISSON. *de Intestin.* c. XXI. LEEUWENHOECK *Arcan. Nat.* Vol. II. p. 57. Nos, si conjecturae locus est, patulis & productis villis lactea hiant existimamus, quod analogia venarum suadet. & ipsa mechanice. Vide in hanc sententiam XCI. *not. 9.*



nio fecit, ut ad hepar terminari crediderit. Color etiam Indicus, dilutus urina recente, infusus in vivi animalis intestinum, inter duo vincula contrectando potest in lactea adigi [3\*].

*Vasa*

[3\*] Conf. *not.* 29. ad XCV.

[4] *Lacteorum, in Text.*] Inventores sunt inter antiquos ERASISTRATUS, qui in lactentibus hoedis pro arteriis vacuis habuit (GALEN. *an sanguis in Ven. contin.* Vol. I. c. V. p. 121. *Administr. Anat.* VII. c. ult. p. 197.) Et HEROPHILUS, qui in glandulis vidit terminari (GALEN. *de usu part.* L. IV. c. XIX. p. 282.) Inter recentiores, in brutis animalibus primus descripsit CASPAR ASELIUS, (in posthumo opere *de Vas. lact.*) anno 1622. In homine primus omnium vidit TULPIUS (*Bartholin. Epist.* II. Cent. I.) HIGHMORI enim amicus, qui 1637. ea demonstraverit in homine (*disquisit anatom.* p. 38.) non innotuit. Deinde anno 1639. & HIGHMORUS, & FOLIUS (*de nova sanguinis via* p. 161.) Illustris etiam PERESCIUS in homine vidit, PECQUET. *Exper. nov. Anat.* p. 18. Ab eo tempore VESLINGIUS saepius in homine vidit, & pinxit (*Epist. Posth.* p. 61. 64. 66. 67. 69. & *Syntagm. Anat.* T. VIII. post. t. 1.) Sed ad BARTHOLINI tempora varicum Lymphaticis vasis confusa sunt, ut ASELIUS c. XIX. HIGHMORUS. L. I. P. II. c. VII. & plerique alii Hepati inferi docuerint, alii ad Uterum (*la COUVERVE* apud BARTHOL. Cent. II. *Epist.* LXIV.



*Vasa*] Verae venae sunt, si quidem venas dicimus ea vasa, quae liquores ad cor reducunt.

## §. CIV.

LXIV. p. 609. & EVERHARDUS) alii ad alias partes deduxerunt. Diu a BARTHOLO NO nihil eorum historiae accessit solidi. MOLINETTUS apud RHODIUM *Mant. Obs.* 31. in homine ea vidit. NUCKIUS, etiam ex homine exiguum iconem dedit *Adenogr.* f. IX; aliam HEISTERUS *Compend. Anat.* T. II. f. 8. suam BIDLOO sive EVERTSE *de organ. chyl.* f. 1. 3. pulchriorem denique DUVERNOY *Act. Petropolit.* I. Cum rariores sint opportunitates, ego semel in homine vidi, ut fere ita se haberent, ad glandulas usque. Oriuntur vasa Lactea ex utraque parte Intestini, tum ea quae mesenterio non cohaeret, tum ea, quae Mesenterium recipit (MORGAGN. *Adv.* II. *Anim. L.*) ex ipsa villosa tunica (DRELINCOURT. *Canicid.* XIII. WINSLOW. IV. 214. PAULI & BRUNNER l. c. SANTORIN. *Observ.* IX. p. 171.) ambulant per nerveam, sive cellulosa[m] secundam [BIDLOO apud EVERTSE *de Org. chyli* T. I. f. 3.,] perforant musculosa[m] tunicam, efficiunt duos ordines [EULER. *de Mesent.* §. XII. XIII. WINSLOW. 215. DRELINC. *Canic.* p. 698. DUVERN. p. 271.] trunculorum, omnino uti vasa solent [XCII. *not.* 4.] quorum una series ab anteriore, altera a posteriore convexitate Intestinorum provenit, hactenus absque valvulis [PAULI *anat.* BILS. *anat.*] & Hh *perforant* perfo-

§. CIV.

*Peristaltico*] Quo motu deficiente etiam  
Chyli

perforata musculari tunica, repunt in cellulosa fabrica, donec duo vasorum ordines ad Glandulas Mesenterii convenient, DUVERNOY p. 274. variis in itinere factis infulis & plexibus [conf. CXIII. CXVI.] jam valvulosa facta RYSSCH. de Valvul. Lymphat. postscr. C. II. p. 9. 10. II.

[5] *Jejuno, in Text.*] Omnes, ab ipso HIPPOCRATE [sive AVCTORE περι αρχων η σαρκων XII] docuerunt maximam alibilis succi resorbtionem perfici in Intestino jejuno. Alii addiderunt vasa lactea Ventriculi, [vid. LXXXVII. not. 32.] quae satis manifesto sunt lymphatica, etiam VESLINGIO visa, l. c. p. 61. In Duodeno vide XCVII. not. 10. In crassis Intestinis aliqua etiam, & in cane mihi certo visa, & J. H. PAVLI anat. Bilf. anat. & NEEDHAMO, chylo plena, si canis hora sesquiquinta a pastu secetur, de form. foet. c. I. in equo HEISTERO EPH. NAT. Cvr. Cent. VI. Obs. XXVI. in homine WINSLOW. IV. 218. Conf. BOHN. l. c. p. 160. FOLIUM de nova sang. via. WHARTON. Adenogr. c. VIII. WALAEVM de mot. chyl. p. LXVIII. apud SPIGEL. HIGHMOR. L. I. P. II. p. 28. Diversa est sententia SANTORINI l. c. p. 170. & LEPROTTI Comm. Bonon. p. 123. seqq. DRELINCOURTII Canic. XI. 9. BRUNNERI de Gland. Duod. p. 61. qui nulla concedunt crassis intestinis: Verum negativae conclusiones innumera experimenta requirunt.

Chyli motio & resorbtio deficiunt, expeditissimae, quamdiu is motus superest. Nam in vivo cane, si quidem Lactea Vasa conspicua sint, brevis morae experimentum est, & uno ictu oculi citius evanescunt omnia (2). Huc etiam pertinet observatio, quod in strangulatis vasa lactea diu conspicua maneant (3).

*Effervescentis*] SYLVII (4) haec est opinio, falsae hypotheseos falsum corollarium. Namque eo temporis momento, quo effervescentia peragitur, intumescit intestinum, parietes in ampliores circulos expanduntur, delentur

[1] *Orbicularibus, in Text.*] Si nempe earum firmior sedes sit in Mesenterio, contracti versus eam partem orbiculi carnei, pel-  
lent chylum contra lactea vasa, & offerrent. Quod utcumque verum est, non omnino, neque enim inferuntur Mesenterio XCIII. not. 2.

[2] Expulso chylo in receptaculum, unde fit, ut ea vasa quae album liquorem vehebant, nunc ferant pellucidum MUSGRAVE  
*Phil Trans.* n. 166.

[3] In experimentis PEIRESCII, TULPII, & nostro. Nempe chylus, qui diffuit per libera itinera, sistitur ligato Thoracico ductu & congeritur.

[4] Non invenio. Diserte docet motu peristaltico intra lactea vasa adigi DISS. MED. II. §. 25. Sed repugnat LOWER. & non recipi vult, nisi quiescente intestino, p. 222. quod etiam convenit sententiae CIII. not. 1.

delentur juga, villi penduli breviores fiunt retracti, & stringuntur, nulla ergo fit chyli resorbtio plenissimo Intestino. Imo vero declaratum est, qua ratione, penitus certe contraria, perficiatur resorbtio, dum intestinum angustius est, in parte libera contractis longitudinalibus fibris (CIII.) deinde ad sedem Mesenterii se constringentibus orbicularibus, chylum ad lactea vasa propellentibus. Neque flatus in ligata intestina valide adactus unquam in lactea vasa erumpit, manifesto indicio, ea non repleri ab aliqua causa interna, quae intestina extendat, verum a pressione aliqua intestini: Cui adeo non repugnat experimentum in Anglia factum (XCV. 29.), ut etiam faveat. Pressione enim, & contrectatione varia intestinorum liquor coeruleus in varia lactea adigitur. Deinde demonstratum est alibi (LXXXIII. not. 1.) intestinorum conditionem maxime naturalem esse, ut contracta sint.

### §. CV.

*Saliva*] Uncias duodecim salivae secerni intra horas 24. excitavimus ex NUCKIO (LXVIII. not. 4.) Verum longe uberior est ea saliva, quae vasis lacteis resorbetur. Namque ea omnis, quae expuitur, in experimento NUCKIANO, nisi extra corpus effusa periisset, accessura erat resorbtio liquori, secreta fuisset iterato & saepius intra unum diem (LXVIII. l. c.) Plures ergo  
librae



librae salivae quotidie videntur subire lactea vasa (1). *not. 18.*

*Oesophagi*] (2) Utriusque copiam haud exiguam adesse, adparet ex magnitudine organi, laxitate vasorum excretoriorum, hiantium libere in cavitatem inanem &c. licet pondus utique definiri non possit.

*Hepatica*] Hujus eximia quantitas [3] facile aestimatur. Hepar viscus est vastissimum; vasa ejus laxissima, ut aqua per Venam Portarum impulsam, expedite [4] in venam Cavam, & in ductum Choledochum exeat; & amplissima, si perpendamus ingentem diametrum venae Portarum; ductus excretorius ex capacissimis. Quod si nunc conferas secretionem, quae fit in renibus, ubi haud minus tribus libris urinae quotidie secernitur, viscere adeo magna ratione minore (5), duriore; adparebit, haud paucas hepaticae bilis libras quotidie secerni.

*Intestini*

[1] Quare Salivae & Lymphæ Pancreatis tribuit BIANCHUS, quod nunquam coalescant vasa lactea P. I. c. XVI. §. 12. p. 93.

[2] INST. MED. LXXIII.

[3] INST. MED. XCVIII. *not. 18.*

[4] Non invenio apud RUYSCHIIUM, & diserte negat MALPIGH. C. II. *de hepate*. An huc revocari debent vasa Intestinorum, quae ex Cava vena deduxit RUYSCH? vid. XCII. *not. 6.*

[5] Non tanta videtur pro Hepate ratio, atque visum PRAECEPTORI. Nam arteriarum sanguis admodum magna ratione velocius movetur, quam qui in venis est, & ma-

Hh 3 *not. 18.* gna

*Intestinali*] Longe maxima vero est secretio, quae fit ex arteriis Mesentericis. Eae enim & amplissimae sunt, & laxissime ceram RUYSCHIANAM in tubum intestinale dimittunt. Eae arteriae faciunt aliquando Diarrhoeas, quando ob prostratum appetitum, vix quidquam deglutitur. R. EDUS (5\*) in experimentis Florentiae factis aperuit animalia fame enecta, vidit intestina madida, & lymphatica vasa plena, ab hoc ipso nempe resorbto liquore.

*Nervorum*] Non ideo exigua haec est accessio, quod oculis non potest usurpari. In homine robusto, aëre frigidissimo (6), ut aquam congelaret, strictis vasis cutis, pergit perspirare subtilissimum fluidum tanta ubertate, ut intra viginti quatuor horas quinque octavas partes efficiat ejus, quod de corpore in excrementa abit. Hoc SANCTORIVS evicit, & fida experientia. Sed in Intestinis, ubi perpetuus calor adest, nervi innumeri, secretorium organum sexaginta palmorum longitudine, secretio subtilissimi liquidi (7), magna ratione debet superare.

*Con-*

gna est sectio arteriarum Renalium, & iter expeditissimum, ductus demum excretorius facile amplior.

[5\*] Non invenio. Ubi experimenta sua enarrat, id solum observat, „nitidissima esse viscera animalium fame enectorum de *anim. intra anim.* p. 140. Sed confer. not. 24. 25. &c. ad LXXXVlll.

[6] INST. MED. CCCCXXXlll. sub fin.

[7] INST. MED. LXXVII. not. 22. CCLXXXII  
CCLXXXIII.

*Conspicuas*] Recensiti hactenus humores perpetuo adfluunt, nihil de eis per alvum secedit in naturali corporis humani conditione; superest ut resorbeatur. Sed una via adest vasorum lacteorum & Mesentericae venae, omnino ergo haec vasa subeunt liquores, qui ad Intestina effunduntur, & soli ea perfluunt, quamdiu jejunamus, feruntur ad sanguinem, & Cor, & iterum ad Intestina. Debilis est objectio, non conspicua esse vasa Lactea, fit enim id ab exilitate tubuli cujusvis seorsim spectati, & liquoris, quem vehit, natura diaphana. Vasa Lymphatica, multis vicibus majora, ipse Thoracicus ductus, raro subeunt conspectum, neque fere nisi ligata, quos tamen canales nemo sanae mentis neget suis perflui liquoribus.

### §. CVI.

*Absorbentibus*] Facile evincitur, viam ab  
In-

[1] *Annon, in Text.*] Celebris est quaestio: Antiquitas omnis per venas adtrahi succum nutritium dixit, HIPPOCRATES *περί αρχων και σαρκων*, GALENUS *de usu part.* IV. c. XLX. XX. & omnes uno ore. Cum vero viderent, contrario ductu, ex hypothesis sua, debere in iisdem venis, sanguinem quidem fluere ab hepate ad Intestina, Chylum vero ex Intestinis ad Hepar, variis machinis ruentem sententiam fulcire sunt adnisi, & valvulas in ostiis venarum mesentericarum vidisse voluit, si diis placet, COLUMBUS *de re Anat.*

Intestinis ad venas Mesentericas liberam  
esse

L. VI. p. 165. Et postquam ASELLIVS novam chylo viam per vasa lactea ostenderat, etiam tunc lactus invento sanguinis motu, HARVEIVS noluit recedere a Venis Mesentericis, jam muneri suo paribus, & sanguinem cum chylo simili ductu vehentibus. BOGDAN. apud BARTHOLIN. *Centur. II. Epist. LXVI. LXVII.* Et FALCOBVRGIUS, cum vasa lactea chylo plena demonstrata videret, negavit tamen vasa lactea esse HORST. in *epist. p. 60.* Deinde partita munera Lactearum & rubrarum venarum defenderunt HYGIVS THALASSIVS SANGERMANNUS, WILLISIVS, SWAMMERDAMIVS, HORNIVS, BRUNNERVS, PEYERVS, BORELLVS, HARTMANNVS, STAHLIVS, REVENHORST, FANTONVS, RVYSCHIVS, BRENDELIVS, collega noster ingeniosissimus, & alii. Neque tamen eo minus BOHNIVS, BERGERVS, & BIANCHVS & non pauci recentiorum contrariam sententiam sunt tuiti. Sed experimenta facile resistunt ratiociniis.

[2] Crassior certe, ut recte AVZOV, qui larvatus latet nomine HYGINI THALASSII SANGERMANI, in *Epist. post PECQVET. p. 209.* ut quae & ab Intestinis in venas, & a Venis in Intestina aërem transmittat, quod in lacteis venis nemini mortalium visum est.

(3) *Biliofa, in Text.] Urget in primis REVENHORSTIVS de motu bilis in circ. p. 36.*



esse (4), quandoquidem & aqua, & ceracea materies, infusae venis Mesentericis, facile penetrant in cavam fistulam Intestinorum, atque universam crustam villosam perpluam reddunt; & per eam plus quam probabile est resorberi tenuissimam (2) & aquosam partem eorum, quae in Intestinis contineban-

44. cui singulari studio, sed nisi fallor, curiose magis quam vere, respondet BRANCHVS *histor. hepat.* l. c. XVI. conf. Cl. not. 6.

[4] Experimentum facile est, XCl. not. 1. neque in homine unquam me fefellit impulsæ aqua, sed & in cane evidentissime successit BRUNNERO *de Gland. Duod.* p. 61. qui villos hiantes & integros, & bifidos, emittentes atramentum, fidissimus testis vidit; in avibus PEYER. *Parerg. Anat. Exerc.* I. p. 32. & DUVERNEY apud DVHAMEL. *Hist. acad. Reg. L.* II. Sect. IV. c. III. p. 169. in homine HARTMANNVS & WAGNER. *EPH. NAT. CUR. Cent.* I. II. *Observ.* CLXXI. p. 366. & ALBINVS *Anat. Intest. ten.* sub fin. Quod experimentum in solis avibus successerat PEYERO, & non successit LOWERO p. 221. 222. Verum contraria ratione MERYVS experimento cognovit, in quadrupede aliquando spiritum Vini ex intestinis in venas Mesentericas penetrasse FANTONUS *Dissert. anat.* p. 124. & ex crassis quidem intestinis, in *hist. acad. reg. scient.* 1717. & olea aetherea eandem viam ivisse I. M. HOFMAN. in van HORNE p. 105.

bantur. Oscula vero earum venularum non conspicua esse non mirum est, cum etiam vasorum lacteorum orificia nullo microscopio conspici possint.

*Amplitudo*] Venae (5) Intestinorum multis vicibus superant arterias socias. Sed arteriae magnam vim liquidi tenuissimi deponunt in intestinorum cavitatem (XCI. 3. &c.) minus ergo liquidi revehant venae, quam

[5] Argumento hoc BORELLUS usus est *de mot. anim.* CXCVII. CXCVIII. CXCLIX. & REVENHORSTIUS. Nempe ponit BORELLUS Arteriam Splenicam esse Mesentericae aut aequalem, aut vix quarta parte minorem. Interim venam Splenicam vix quartam partem efficere venae Portarum; esse itaque sanguinis in vena Portarum quadruplum ejus, qui fluit per Splenicam: & cum arteria Mesenterica non plus advexerit sanguinis, accessionem utique factam esse aliunde, nempe ab Intestinis. Reposuerunt BOHN. in *Progymn.* XI. & BIANCHI, id a lentore sanguinis fieri, qui si ter tardius fluat, vas velit ter amplius. Sed experimentum falsum est. Nam Splenica Arteria adeo non aequalis est Mesentericae, ut lumen non habeat quartae parti ejus aequale, cum etiam truncus splenicae, Coeliaca, sit Mesenterica minor. Deinde & Mesocolica Arteria, & Duodenalis accedunt Mesentericae, ut certe, si Splenica vena sit aequalis uni quartae parti venae Portarum, omnino & Arteria Splenica quartae parti arteriarum Intestinalium sit aequalis. Quare adparet, nihil omnino ex dia-

quam advexerunt arteriae, deberent minores esse; nisi aliquid insignis accessionis in venis fieret,

diametris vasorum sequi. Dicam, quid res esse videatur. Ut vis aliqua sit in argumento, deberet major esse ratio Venae Portarum Mesentericae, cum Mesocolica, si seorsim inferatur Splenicae, ad Arteriam Mesentericam, Mesocolicam, & Duodenam; quam est ratio venae Cavae ad Aortam arteriam, Jugularis ad Carotidem, &c. Verum id experimentis meis non respondet, ab aliis non est tentatum. Et KEILIVS equidem videtur aliquid dicere *Tentam. de secret. anim.* p. 69. quando Aortam dicit esse ad Venam Cavam, ut 324. ad 447. uti fere 5. ad 7. Ramum vero Venae Portarum ad ramum socium Arteriae Mesentericae uti 9. ad 25. Sed ea ratio meis experimentis evidentissime repugnat, neque majorem rationem invenio, quam 23. & 24. ad 30. 13. ad 19. 9. ad 13. 11. ad 15. quae dat 529. ad 900. aut 25. ad 36. aut 169. ad 309. aut 81. ad 169. aut 121. ad 225. longe infra KEILIANAM, & fere eandem, quae 3. ad 5. non remota a ratione Arteriae Aortae ad Venam Cavam, quam in eodem corpore invenimus 84. ad 123., rationem vero Iliacae Arteriae ad venam, 62. ad 86. Imo vero majores invenio rationes subclaviae venae ad arteriam, nempe uti 14. ad 9. sive 196. ad 81. maximam Jugularis ad Carotidem, uti 21. ad 14. sive 441. ad 196. Ut omnino nihil ex his rationibus deduci possit, & si quid possit concludi, etiam contra hypothesis concluderetur,

fieret, quae amplitudinem venarum requirat non tantum non minorem, sed omnino majorem sectione arteriarum.

*Fabrica*] Omnes rami incurvantur in fornicatos arcus, ex quorum convexitate recti ad Intestina rami producuntur. Quae fabrica, cum in venis Intestinorum solis reperiatur, indicare videtur, aliquid in iis venis fieri, quod non in aliis venis peragitur (6). Venae vero aliae, a Cava accedentes, diversa fabrica factae sunt, rectae, & recta lineaeductae in fines penicillorum similes. Quenam causa hujus diversitatis?

*Natura*] Communis venarum est natura, humores recipere & ad cor deferre; five eos humores ab arteriis accipiant, five ex aliqua corporis humani cavitate resorbeant, five ex ipso aëre externo hauriant *INST. MED. CCCCXXI*. Primum genus est venarum rubrarum; alterius ductus excretorii ex cavis folliculis glandulosis, venae bibulae omentum, ventriculorum cerebri, oris, ventriculi, Intestinorum, de quibus nunc sermo est. Huc vero referri debere venae portarum ramos, facile deducitur ab eo experimento, quo ceram impulsam in cavum Intestinorum tubum emittunt *not. 4*. Quare si quidem patent in intestinorum cavitatem, & si quidem ve-

[6] Neque hoc valet ad demonstrandum. Nam & arteriae simillimos arcus faciunt, & manifestum est, arcuum esse rationem ad similem figuram intestinorum, quibus commodissime vasa accedunt per radios ex concentricis circulis advenientes.



venae sunt, necessario ex eo intestinorum cavo aliquid resorbunt ad sanguinem & Cor ipsum deferunt. Neque est, cur neget aliquis posse liquida, quibus innatant pendulae venae, ab iis resorberi; Nam & cutis, ut callosa sit in plantis pedum, mercurium vivum cum adipe intritum, ita efficaciter resorbet, ut haec prima & antiquissima sit sanandi venerei morbi methodus, & exempla suppetant, quod ipse resorbatus mercurius in globulos collectus, repertus sit in diploë cariosi cranii (7), post atroces & diuturnas cephalaeas. Et communis venarum rubrarum natura est recipere liquida tenuiora, cum vasa Lymphatica omnia in venas inferantur, atque ideo venis rubris ligatis intumescant, & facilius demonstrentur. Vasa vero lymphatica liquorem suum habent, ex parte non minima, ex variis corporis humani cavitatibus. Nam in pericardio, peritoneo &c. liquidum resorberi necessario concluditur, cum alioquin perpetuo adfluxu faceret hydropem. NUCKIUS in abdomen molossi infudit duas aquae libras: Post aliquod tempus resectum est animal, & nihil adparuit effusae aquae. Nihil ergo insoliti, aut alieni a venarum natura est, si ex intestinis vasa tenuiorem aquosum liquorem vehentia in venas rubras se exonerent.

*Arteriam*] Vena portarum ex sinu (8)  
 suo

[7] BOERN. *de morb. Vener.* p. 61. 63. edit.  
 LOND.

[8] INST. MED. CCCL. ubi de natura hujus  
 ca.

suo arteriae simillimo, tamquam corde aliquo secundario, sanguinem abdominalem omnem in hepaticas venas propellit, ex quibus bilis quidem in proprios ductus bilarios, sanguis vero in venae Cavae radices transit. Et videtur omnino probabile, uti ad cor illud magnum pectoris, omnes ex universo corpore humano humores confluunt, ita ad cor istud abdominale omnes abdominis humores ex aequo confluere. Sed in primis, uti ad sanguinem, prius quam per pulmonum angustias transeat, convehitur omnis lymphæ & tenuior liquor corporis humani, ita ex analogia, ad sanguinem venae Portarum, prius quam subeat similes hepatis angustias, videtur convehi debere humorem aliquem tenuem (8\*).

*Indoles*] Sanguis venarum (9) Mesentericarum ex flavo fuscus est, vix concrevit in

capsulae fufius dicitur, quae certissime non est musculosa.

[8\*] Confer. CCLX.

[9] Primus BILSIUS sanguinem venarum Mesentericarum chylo cinereo mistum esse, experimento confirmavit, *Epist.* p. 21. Deinde SWAMMERDAMIUS strias chyli, in iisdem venis, in vivo animale ligatis, adlegat. *not. ad Prodrom.* HORN. p. 28. 29. Verum hanc chyli in venis conspicuam apparitionem expertus negavit STENONIS apud BARTHOL. *Centur.* III. *Epist.* LVI. p. 228., deinde BOHNIUS l. c. *Progymn.*

in placentam, & dilutissimus adparet, in aliis venis niger, & protinus quando in aërem emissus est, densatus in laridi speciem. Sanguis demum arteriosus saturate rubet, splendens, citissime coagulatus. Quare adparet, si nihil accideret sanguini venarum mesentericarum, & si nihil praeter arteriosum sanguinem reciperent, eum, ex communi venosi sanguinis, indole, & atrum futurum, & lentum, & facile condensabilem in albam placentam. Quod cum non sit, & is idem sanguis etiam dilutior adpareat, debuit ei utique praeter arteriosum cruorem aliquid accessisse tenuioris liquoris.

*Humorum*] Sunt qui aquarum Spadantarum uno mane ad duodecim libras hauriunt neque tamen vel unica guttula per anum exit, & omnis ea aquae vis excitato motu musculari per urinam ejicitur. Sed omnis ea aquae vis ad hepar fertur, unde fit, ut non alia via potentius morbos hepatis & melancholiam expugnemus. Ex iisdem venis, cum valvulis destituantur, & libere pateant in ca-

XII. p. 155. Sed ipsum sanguinem venarum mesentericarum diversa indole esse, & non coagulari, ut solet reliquarum venarum sanguis, primus HELMONTIUS *Sexupl. digest.* §. 38. & obscure rubrum esse BILSIUS, atque chylum eximi posse, qui tritus instar Lymphae splendescat, ibid. Verum etiam hanc observationem & STENONIS, & MALPIGHIUS *de hepate* c. VI. & BOHNIUS refutant, atque BOHNIUS sanguinem venae Portarum non difficilius coagulari, quam ex vena Jugulari sanguis.



cavitatem intestinorum, purulentae (9\*) diarrhoeae saepe fiunt, atque ipsum corruptum, hepar egeritur, ut coriaceus tantum saccus superstes fiat. Si nunc addas inmensam vim liquorum humanorum (10), quos recipiunt intestina, & receptos non per anum, sed per venas resorbentes dimittunt, apparebit utique eximia vis liquoris, qui per sola lactea vasa vix videtur moveri posse.

[Oviparis] Aves & ovipara (11) animalia reliqua, cum destinarentur ferendae inediae

[9\*] Ex ulcere Jecoris pus per alvum TULP. *Obs.* 27. L. II. Ex ulcere brachii RHOD. *Obs.* 89. L. II. &c.

[10] Salivae unciae duodecim LXVIII. *not.* 4. Lympha gastrica, pro portione vasorum, fere quadruplo uberior; saliva pancreatica librarum trium; bilis hepaticae librae aliquot CIV. *not.* hepatica Liquidi arteriosi Intestinalis librae 36. XCV. *not.* bilis cysticae, mucī BRUNNERIANI, PEYERIANI & Oesophagici liquoris, unciae aliquot; & in universum, librae certissime non intra quadraginta.

[11] Non aves solae vasis lacteis carent, sed & pisces, exceptis viviparis cetaceis, ut Phoca SEGER. *Eph. nat. cur.* Dec. I. *Ann.* IX. X. *Obs.* XCVIII. p. 251. KÜLMUS ib. Vol. I. 1727. p. 20. nam quod in Orbe pisce vidisse voluit BARTHOLINUS *Anat. renov.* p. 609. id nulla observatione confirmatur. Inter quadrupeda, vidi observationes ex Cervo, Equo, Erinaceo, Fele, Leaena, Cane, Cuniculo, &c. Soli Elephanto, qui ductum Thoracicum habet, de-



diae diuturniori, & periculum adesset, ne vasa Lactea, si diutius inania sint, coalescerent omnino (12), eae aves destituuntur vasis lacteis, & chylum omnem recipiunt per venas Mesentericas, adeo laxas, ut flatus Intestinis impulsus (13), quae in altero fine vinculo adstricta sunt, per eas ipsas venas erum-

denegantur a DUVERNOY *Act. Petrop.* Vol. I. Avibus solus adtribuit MARCHETT. apud BIANCHUM, *hist. hepat.* p. 910. Sed eae sunt observationis circumstantiae, ut vix mereatur fidem. Denegat equidem PEYER. *Merycolog.* p. 91. LISTER. *de humor.* p. 228.

[12] Maxime cum aves omnes parum bibant, rapaces vero nunquam. Alias rationes habent PEYER & LISTER. Ille, quod sanguinem tenuem habeant, dilutionis non indigum. Iste, quod ductus Thoracicus in volatu facile laedi potuisset. An forte sola exiguitas eas obscuravit?

[13] Not. 4. hujus. Accedit alia, haud obscura ratio, desumpta a morbis & senili statu Mesenterii. Vasa Lactea omnia adire glandulas Mesentericas, pervulgatum est (INST. MED. CXVII.) Sed eae glandulae aliquando scirrho infarctae transmittendis liquoribus inutiles fiunt, non eo minus vita superstite COITER. *Observ. anat.* p. 121. VIEUSSENS *nov. vasor. system.* p. 37-40. &c. Et in homine etiam sano, uti reliquae glandulae conglobati generis, maximae in junioribus, per aetatem diminuuntur, & in senibus pene nullae fiunt RUYSCH. *Advers. Anat.* II. VII. p. 18. *Advers.* III.

erumpat. Atqui non permittit analogia naturae, ut is mechanismus, qui in maxima parte creaturarum animatarum obtinet, ex sola classe Quadrupedum penitus excludatur.

### §. CVII.

*Phaenomena*] Tota nempe chylopoiesis, quae est functio corporis humani, per cujus efficaciam cibus & potus rediguntur in liquorem lacteum, dulcem, spissum, qui lactea vasa subeat. Causae hujus mutationis sunt partim in ipsis alimentis, partim in corporis humani & solidis & liquidis partibus, quas hactenus enumeravimus.

*Postulata*] Ita vocamus,, veritates adeo evidentes, ut probatione non indigeant, & tuto adsumi possint, quo ex iis alia obscura & incognita deducantur. Debent autem in medicina non minus evidentia esse, quam ea, quae ex ipsis explicantur phaenomena. Alia omnino rejici debent. Differunt autem ab hypothesebus, quod *hypotheses* sint adsumtio alicujus propositionis, cujus veritas argumen-

Vll. p. 23. Verum appetunt senes, nutriuntur, plusculis annis supervivunt delectis glandulis. Et, si satis certa est observatio, ductus Thoracici ulcus diu toleratum est, neque mors ab inedia secuta. Conf. *Diff. propr. & ACT. BEROLIN. Dec. I. Vol III. Hist. de l' Acad. des scienc. 1700. Obs. 15. 1710. Obs. 7. E. N. C. Dec. II. a. VI. Obs. 209. BASS. Dec. II. Obs. 7.*

[1] *Calor, in Text.*] Conf. LXXVI. LXXXVI & contra eam sententiam elegans scriptum HELMONTII *Calor. efficac. non diger.*

gumentis evinci non potest; *postulatum* vero adsumptio propositionis certae & evidētis, sed quae non demonstrata est, interim tamen eundem adiensum meretur, quem demonstratio postulat. Causa vero idem est, quod effectus alio modo consideratus. Idem dum fit in natura, idem omnino & causa est & effectus, prout ens, ad quod refertur, idem prius vel posterius cognoverit ut causa quidem in cognitione nostra posterior sit, prior effectus In ENTIS OMNISCII cogitatione, quae praesens & futurum absque temporis intervallo sibi repraesentat; causa ab effectu nihil verae diversitatis habet.

*Experimentis*] Ita vocamus observationes per sensus mutationum physicarum, omni tempore eodem modo adparentium. Iis ipsis omnis ratiocinii veritas innititur. De corpore novimus aliqua phaenomena per experientiam, v. g. extensionem in tres, neque plures dimensiones: iis phaenomenis superstruimus doctrinam physicam. Si plus fuerit in ratiocinio, quam in phaenomenis, tum vero protinus falli poterimus.

*Acor*] Vegetabilia omnia, quae in usus humanos recipiuntur, dant exusta alcalinum sale, fixum. Eadem vegetabilia, elaborata vi vitae sani hominis, fixi salis ne quidem granulum exhibent, volatilem uberissime. Hanc transmutationem Chemico certe admirabilem cum HELMONTIUS (2)

vi-

[2] Sententia HELMONTII haec est „ad cibum



videret, & nosset difficultatem, quae est in natura volatili fixo sali concilianda; cum compararet exemplum *salis purgantis* SENNERTI (3), ubi fixum alcali, admisto spiritu volatili acido, elevatur in falsum volatile; cum deinde alioquin persuasus esset, existere in ventriculo acidum fermentum,, facile inductus est, ut crederet,, quod cibus, ex sua indole fixus, reddatur volatilis, ope admisti in ventriculo fermenti volatilis acidi,, Verum is omnis acor alibi ad nauseam refulatus est. Acidum enim in corpore humano nullum exstat, nisi ab adsumtis,, & absque omni acido vivunt ii populi, qui nonnisi carnes & pisces in cibum recipiunt, neque quidquam differt, num acidis utamur vel non utamur, & potest chylus nihilo deterius cum acido, atque sine acido perfici.

*Faber*] Voce *Archaei*, quae propria significatione *antiquum* sonat, vel *eum qui a principio fuit*, sed pro *principe* solet usurpari, abusus est olim (4) BASILIUS VALENTINUS, deinde Chemici vocaverunt

in Ventriculum adspirare liene acidum vitale, quod non causa sit digestionis, sed organum, per quod Vita agit,, cremorem eum acidum ferri ad Duodenum, ibique adspirare fermentum fellis, quod omne illud acidum mutet in volatile falsum, *Sextupl. digest. ab init.*

[3] *Elem. Chem.* II. Proc. LXXVI.

[4] Vetus est opinio Daemoniorum, quae certis corporis humani partibus dirigendis praefecta sint, & apud AEGYPTIOS recepta. SCHULZ. *histor. medic. Period.* I. c. III.



*den Natur - Knaben*, id principium, quod quamlibet vegetationem in suam speciem determinet: Sed PARACELsus ipse Archaeum admisit, & expresse magis HELMONTIUS, ut exprimeret ens aliquod, quod nec mens esset cogitans, neque corpus crassius atque vulgare, sed aliquid medium, quod omnes functiones corporis sani dirigat, morbos sanet, in morbis aliquando erret, imo deliret &c. Causa hypotheseos fingendae

§. 20. p. 29. HIPPOCRATIS *Natura*, crifum causa & sanationis, non absque aliqua intelligentia fuisse videtur. Deinde, si quis fuit mortalis BASILII VALENTINI nomine, constituit *den Natur Knaben*, & PARACELsus id ipsum artificium, quo cibus coquitur, & excrementa eliminantur, credidit ARCHAEO magno *de Pestil. Tr. I. c. V.*), & alibi septem praecipua viscera spiritui proprio, ab anima distincto, dedit habitanda (*de vir. membr. L. I. c. I.*) Idem CROLLIO *Astrum* fuit, & HELMONTIO celebris ARCHAeus, nempe principium, quod omne vegetans in naturam suam formet (*Arch. Fab.*) habitans in hominis ventriculo, inque dextro ejus ostio (*Fus duumvir.*) &c. Neque differt Praeses *systematis nervosi* WEFFERI *de cicut. aquat. p. 100.*, neque Archaeus GLISSON. *de ventric. & Intest.* neque tertium principium RIVINI, neque demum officio distat, si differat natura, anima STAHLII, prima omnis motus in corpore humano origo, princeps fabricatrix corporis quod inhabitat &c.

ea est, quod visum sit illis Philosophis, corpus humanum, adeo mirabili & ad mechanicas rationes exasciato, artificio fabrefactum esse, ut nunquam adeo multae, & adeo inter se catenae modo connexae functiones feliciter possent peragi, nisi aliqua Intelligentia Rectrix omnia gubernaret. Sed noluerunt hoc ministerium imputare animae immortalis, quod videretur ex ea positione sequi, ut conscii essemus eorum, quae intra nos geruntur, imo vero imperare possemus functionibus etiam iis, quas vitales dicimus. Non videtur opus esse seria aliqua refutatione. Vix credam HELMONTIUM usque adeo insaniisse, ut omnia vera esse crederet, quae de ARCHAEO scripsit. Et videtur, quoties dicit, ARCHAEUM cibos desiderare, seligere, coquere, expellere &c. nihil aliud in mente habuisse, nisi ut diceret cibos desiderari, seligi, coqui, expelli, a potentia aliqua incognita. Quid enim interest, num fatearis, Te ignorare causam actionis alicujus, num potius ponas ejus causam in Ente fictitio, obscuro, cujus neque existentiam, neque naturam, neque adfectiones, neque operandi modum perspicias. Sed nos quidem multas causas functionum mechanicas cognoscimus, & praeterea scimus in universum, quod vita, sanitas, & omnes functiones vitae humanae pendeant ab innumerabilibus causis Physicis, in unum corpus ita a MENTE PRIMA adunatis, ut corpus se ipsum conservare, & restituere possit; neque magis indigeat motore aliquo subalterno, quam quidem horologium, postquam semel

mo:

motum accepit, novo motus principio indiget, per totum illud tempus, ad quod circumferendo indici sufficiunt conpositae in unam machinam diversissimae rotae. Confer. XXVII, XXVIII.

*Fermentationes*] Chemici ad explicandam separationem liquidi alibilis ab inutili liquido, uli sunt similitudine ab operationibus Chemicis translata. Nempe si argenti unciam unam solvas adfusa (7) aqua forti, nascetur, ad sensum, homogenea aqua, limpida, amarissima. In eam si projicias spiritum salis, (8) orietur lucta, & argentum separatum fundum petit, in calcis species redactum, facta est, ut vocant,

*Praecipitatio*] Eadem pene ratione existimaverunt, & in primis VERHEYENIUS, solvi in ventriculo cibos ope menstrui acidi, solutioni adfundi alcalinam bilem, fieri effervescentiam, aufugere id, quod subtilius est, in venas, jam in saliam volatilem naturam elaboratum, reliquum (9), quod crassum, ponderosum & inutile est, fieri in faeces, &c. Verum haec omnia ruunt, postquam effervescentiam nullam omnino existere evictum est.

*Peri-*

[5] *Bilis, in Text.*] Conf. LXXXIX. not. 12. ad 20. &c.

[6] *Pancreaticae, in Text*] CI. not. *intestini*.

[7] BQERH. *Elem. Chem.* II. Proc. CLXXX.

[8] *ib.* p. 472. Proc CLXXXVI.

[9] Paulo mollius de GRAAF *de succ. Pancreat.* P. 432. 436. *ep. omn.*



*Peripateticae*] (10) Otiosi homines, qui omnia, & Medicinam etiam ex schola explicabant nihil experti, interrogati, quomodo fiat ciborum coctio, respondebant commode, fieri eam mutationem a facultate adtractrice, retentrice, coctrice, expultrice, & assimilatrice. Quinam stolidiores? an Chemici, qui experimenta adferebant ad singulas explicationes, sed ab experimentis male concludebant? an Peripatetici, qui neque experimenta adferebant, neque falsi aliquid proponebant, sed verba mera dabant pro rebus. Possent certe ferri eae voces, nisi in iis quiesceremus, & explicata existimaremus phaenomena, quae tantum nominata essent.

*Fermentationes*] Veteres Chemici *fermentum* dicebant id, quod efficit admistione  
(11)

[10] ARISTOTELES nutritionis opus adscripsit animae vegetabili (*de Anim. L. II. c. IV.* comminutionem ciborum pro causa disponente coctionis alimentorum habuit, calorem pro causa efficiente (*de part. animal. L. II. c. III. p. 1121.*). Sed GALENUS haec omnia longe subtilius divisit. Ventriculo adscripsit facultatem adtrahendi cibos, retinendi, ut & ipse fruatur, dimittendi quod coctum sit, & id quidem solum (*de facult. anim. L. III. pass. c. VI. VII.*) & interim, dum retinentur, coquere ope caloris (*c. VII. ib. & de usu part. L. IV. c. VIII.*) Concoctum cibum in Intestinis adsimilari, & aliquid alibilis succi in arterias rapi, longe vero magis in venas *c. XIII.* & porro ad hepar.



(11) sua ut id, cui admistum est, in suam indolem convertat. Granum Tritici, factum in beatis agris Lixensibus, dat centum grana: eorum granorum quodlibet simili feracitate centum grana reddit, ut unum in de-

[11] Priores eam causam ARCHAEUM dixerunt, vid BOERH. *de cognosc. certo in phys.* p. 26. seq. Sed HELMONTIUS inprimis, praeter elementum materiale, aliud posuit *elementum formale*, quod neque substantia esset, neque accidens, interim vero semina produceret ex materia (*Caus. & init. natur.* §. 23-24.). Verum sub hoc universali fermento alia subesse fermenta, subordinata, mortalia, quae atomos suo novo characterē impraegnent, sintque *fracedo disponens ad alteritatem*, & contineant principium generandi rem ex re (*Imago semin. impraegn. mass. semin.* §. 23. 8. 12.). Et fermentum hujus generis peculiare inesse cuiusvis bruto & homini, quod efficiat transmutationem liquidi in naturam suam. (*Sextupl. digest. ab init.*) Quale in corde residens, cruorem convertat in sanguinem (*Blas. human.* §. 22.); ex liene adspirans in ventriculum acidum vitale addat cibis (*calor. effic. non dig.* §. 30.), non acidum ipsum, sed singulare, organo acido utens (*Sextupl. dig.* §. 12.). Haec fermenta ad motum cordis explicandum a CARTESIO (*de hom.* p. 5.) & VIEUSSENIO (*du coeur* p. 72. 73.) translata sunt, & exeunte seculo praeterito dederunt unam ex hypothesebus, quibus secretionem animaleam explicare adlaboratum est.

decies millena auctum fit, omnia nutritia farinosa, triticea grana. Sed in iisdem aruis proveniunt stirpes acerrimae Tithymali, Euphorbia, Sinapi. Est ergo aliquid in Tritico, quod faciat, ut idem succus nutritius in Triticum fiat, qui, si id aliquid abesset, in diversissimam naturam abiret, in Triticum quidem nunquam abiturus. Sed quantulum est id feminale principium! Totum Tritici granum, unius in medicina grani pondus definit. Sed de eo pondere rejice Cotyledones, rejice involucria seminis, cellulas farinae, originem funiculi umbilicalis, manebit grani adeo exigui pars exigua, non major certe arenula. Et in eo tamen corpusculo, arenae grano non majore, latet ea vis, quae succum terrae in decem millia stirpium Tritici transmutat; alienum nempe succum, in suam propriamque indolem. Eam vim *Fermentum* vocaverunt Chemici. Merentur utique veniam, cum ignari fuerunt mechanicae fabricae corporis humani, per quam omne fere rerum genus potest in naturam nostram converti, & novum hominem producere. Ex farina & aqua quis credat nasciturum hominem? sed farina & aqua aluntur pueri, accedit aliquid eorum ponderi, & corpori; & ex ea ipsa farina potest vi vitae humanae fabrefieri semen masculinum, quod, receptum in uterum, novus homo fiat. Eo certe sensu potest excusari nomen, alioquin minus conveniens ideae, quam jubetur exprimere. Verum si fermentum voces cum recentioribus Chemiae scriptoribus id, quod in corpore

pore aliquo motum excitat intestinum, per quem mutetur ejus corporis natura; vel si fermenti nomine designes lactam salium contrariorum: tum vero errores parit spurium vocabulum, & eliminari meretur.

*Damnoſae*] Non admodum curarem de his fabellis, & perinde eſſet, num iis aures noſtræ mulcerentur, ſi quidem ſubſiſterent in Cathedris docentium. Verum admoventur ad ipſam artis medicæ exercitationem, & dum eam dirigunt, noxiæ fiunt (12). Ex ea hypotheſi, quæ Ventriculi fermentum acidum facit, effectum eſt, ut acidum pro præcipuo digeſtionis præſidio haberetur.

Cum

[12] Ex Hypotheſi, quod Pleuritis fiat ab acido ſanguinem coagulante, factum eſt ut HELMONTIUS Pleuritidem hoſtibus acidi, & ſudorem moventibus medicamentis conatus ſit expugnare, ſibi ipſi funeſtus Medicus. vid. *Praef. filii* ad opera ejus. Febres ad ſucci pancreatici vitia retulit SYLVIUS, expugnavit ſale volatili oleoſo ex ammoniaci ſalis ſpiritu & aromatibus: *Prax. p. 238.* Variolas ab acido deduxit (*Prax. Med. App. Tract. I. C. IX.*) oppugnavit alcalinis, abſorbentibus, ſudorificis. Aphthas ex eodem acido naſci adſeruit, l. c. c. V. & antacida atque adſtringentia oppoſuit &c.

[13] *Solis tenuibus, in Text.*] Experimentum non reſpondet. Nam inteſtina craſſa, & machinas motus periltaltici habent, & motum ipſum, ut faeces alvi, reſecto abdomine, egeri potuerint WEPFER. *de cicut. laquat. p. 253.*



Cum febres ab acido derivarentur, curatae sunt salibus volatilibus oleosis & lixivis. Inde factum est, ut elegantulae opiniones Praeceptorum, in discipulos propagatae, imperium vitae & necis in miseros homines natae sint.

*Motus peristalticus*] Prorsum & retrorsum cibos agens. Nempe absque ea agitatione alterna cibus omnis brevi via ad anum effugeret, neque quidquam in vasa lactea transiret. Motus vero peristalticus mobilibus claustris ita intestina intercipit, ut crassiora quidem ad finem propellantur, retineantur vero liquidiora. Mirabile certe artificium, & absque exemplo.

*Deliquio*] Si unico temporis momento quieverit cor validissimi hominis, mortuus est, cadit, friget, rigescunt extremitates, & omnes partes corporis in propiores contactus accedunt, atque ita liquida omnia ex conicorum vasorum angustis finibus congeruntur ad cor. Atque adeo per lactea etiam vasa superstes motus peristalticus (15) chylum pergit ad venam subclaviam urgere: irritatum vero cor protinus redit ad solitas contractiones, & si machina inviolata fuerit, poterit homo reviviscere (16). In syncope simplici, sola

[15] De experimento constat XCIII. not. 6. XCV. not. 14. Causa, me quidem, latet. Confer similem PRAECEPTORIS ingenuam ignorantiam de causa motus in corde CLXXXVII.

[16] Experimentum exstat xcv. not. 15.



adsperſio aquae frigidae (16\*) ſopitam vitam ſuſcitāt. In peſte ſaepe factum eſt, ut homines pro mortuis expoſiti, frigore (16\*\*), conquaſſatione, audito campanarum pulſu ad vitam redierint. Id imitatus per anatomen PEYERUS cordis motum ſubpreſſum revocare docuit, flatu per venas adacto.



## FAECIS INTESTINALIS MATERIA ET EXPULSIO.

### §. CVIII.

*Faecis*] Spurcum negotium, ſed neceſſarium aggredimur, abſque quo vita non diu firmo ſtat talo. ALEXANDER Macedo (\*), fortunae filius, cum ab adulatoribus DIIS adnumeraretur, ſe hominem eſſe confeſſus eſt,

[16\*] Fumø tabaci per anum intruſo ſuffocatos ſuſcitant ACADIENSES ſylvicolae DIERVILLE *voy. d' Acad.* p. 190.

[16\*\*] Illuſtre in juvene varioloſo exemplum habet SYDENHAM *Variol. regular.* A. 1667. 68. 69. p. m. 195.

[17] *Syſtoles, in Text.*] Alternus utique motus adeſt, & eadem Inteſtini particula modo quieſcit, dum, quae proxima adjacet movetur, modo movetur, quieſcente vicina. Sed rhythmum, & certa intervalla non obſervo.

(\*) PLUTARCH. *in vit.*

est, quod & somno egeret, & concubina; potuerat addidisse, quod communi necessitate alvum deponere cogeretur.

*Crassiores*] Quae viribus coctionis, etiam diutius continuatis, non potuerunt dissolvi in corpuscula adeo parva, ut poris possent suscipi, ad exemplum fursuris crassioris, qui de seminibus farinosis cum aqua emulsis & omni succulenta parte orbatis, iners & terreus remanet.

*Valvulis*] Rugis illis eminentibus tunicæ villosae. *XCI. not. 12.*

*Pingui*] Per omnem fistulam tenuium Intestinorum glandulae habentur in agmina collectae, PEYERIANAE (1), secernentes mucum gelatinosum, ex aqueo pinguem, quem colligunt in cavis ampullis, ut trans-euntibus faecibus copiosiores adfundant. Id pingue si deficiat, in hominibus macilentis & hypochondriacis, oriuntur dolores varii, & haemorrhoidum motus, ad quae mala nihil aptius blandissimo oleoso clystere (2). Sed visae sunt etiam faeces crassiores, coeuntes, & induratae abiisse in globos (3), qui totum tubum intestinale offercirent, & adnascentes, iter faecum interciperent.

*Exsuccae*] Faeces hujus indolis residuae fiunt ab omni alimento, ab ipso fluidissimo lacte, & ab alimento, quod omni lacte est subtilius, humore illo fluidissimo, quo foetus

[1] *XCI. not. 12.*

[2] *Ex semine lini.*

[3] *BONNET. sepulchr. anat. L. III. f. XIII. Obs VII. VIII.*

tus in utero materno alitur. Namque intestina crassa foetus, ejusque vermiformis appendix, sub tempora partus plenissima sunt faecibus illis papaverini succi similibus quas vocant meconium (4). Quae vero in tenuibus Intestinis exhaustae sunt, eae, postquam in crassa devolutae sunt, negliguntur inutiles. Crassis enim intestinis neque villosa (5) tunica, neque arteriosi humoris adhalantis (6) dilutio contigit. Et faeces alvinae sani hominis, quando de corpore egeruntur, ita sunt levissimae, ut aquae supernatent (7).

*Pelluntur*] Difficile videri potest explicare, qua ratione per tantam intestinorum longitudinem faeces propelli possint, & adeo multas a valvulis remoras superare, cum motus peristalticus nihilo magis deorsum, quam sursum eas moveat. Certum enim est, si retrogradus motus validior sit in fine intestinorum, omnia retropelli, atque visi sunt clysteres ad ventriculum ipsum rediisse

[4] INST. MED. DCLXXXII.

[5] Aliquos habent villos, sed breves, xci. not. i. & quorum nonnisi sectiones vidit RUYSCHIIUS, atque descripsit, nomine pororum Thes. I. Ass. II. N. IV. Th. V. no. Cl. Epist. XI. f. V.

[6] Experimentum non suppetit. Sed minime dubito, multas ob rationes, adesse omnino & hic exhalantes arterias, quo refero poros RUYSCHIANOS minores l.c. f. 5. &c.

[7] INST. MED. CXII. not. II.

rediisse (7\*). Responderi potest,, intestina eo validius agere, quo pleniora sunt, uti vicissim debiliter operantur, quando inania,, deinde faeces non simul & subito colligi sed lentim congregari.

[Coeci] Secuti veteres (9) vocamus Caecum

[7\*] g. BARTHOLIN. *hist. anat.* 68. Cent. IV.

[8] *Perpendiculariter, in Text.*] Ileum admove-  
tur imo globo coeci, & pene parallelum  
coeco adscendit, sicque oblique sinistrae  
fedi coli inseritur, ita ut angulus deorsum  
fere perpetuo acutus fiat. Conf. icones  
TULPII. HEISTERI *de Valv. Cel.*  
XXXVI. BIDLOO T. XXXIX. f. I.  
MORGAGNI *Advers.* III. no. XVI. Ita  
se habet in recente subiecto, prius quam  
manus anatomici accesserit, (CVIII. *not.*  
4.): separatis vero BIANCHIANA admini-  
stratione cellulosis membranulis, Ileum ad  
rectum angulum, transversum, perpendi-  
culari Colo inseritur, quales sunt figurae  
VESALII, EUSTACHII T. X. f. IV. V.  
descriptio vero WINSLOWI IV. 163. &  
BIANCHI, apud MANGET *Theatr. A-*  
*nat. Vol. I. Tab. fig.* ita tamen ut haec  
praeterea dextro parieti Coli contra plero-  
rumque experimenti fidem inseratur. Ra-  
rissimum certe est, si ea ratione se habeat,  
vidi tamen, sed semel omnino.

[9] GALEN. *de usu part.* L. IV. c. 18. & *ed.*  
1539. p. 416. RUFUS *de part. hom.* p.  
38. 62. *edit.* CLINCH. licet GALENUS  
appendices avium cum coeco humano  
conjungat, & situm non bene indicet.  
Eam appellationem mutavit VESALIUS,

&



cum Intestinum, ultimum illum, & maximum globum Coli Intestini (10), adeo amplum, ut aliquando vix binis spithamis possit comprehendi, in quo stercora ex Ileo delapsa colliguntur. Neque existimamus, ita vocandam esse cum recentioribus anatomicis appendiculam illam vermiformem quae crassis Intestinis accenseri non potest. Id autem coecum intestinum est sedes flatuum in Hypochondriacis & gravidis mulieribus, qui nascuntur ex putrescente, faeculenta materia, turgida aëre intestino (11), ejusque aëris, dum putrescit, magnam vim exspirante. Nam faeces, quae ex Ileo in coecum venerunt, non protinus iter suum continuant, sed aliquamdiu morantur, deinde adscendunt. Is vero aër, divagatus per omne colon, dolores efficit, quos innocenti Lienī, aut integro ventriculo saepe inputamus. Et in hominibus sedentariam vitam agentibus, dura scybala sensim in idem coecum Intestinum adeo copiosa congeruntur, ut tristissimo fato PRAECEPTOR viderit periisse hominem illustrem, cui, suppressanti naturae molimina, faecum alvi-

& Coeci nomen appendiculae tribuit L. IV. c. V. Recentiorum plurimi sequuntur GALENUM, ut WINSLOWUS IV. p. 38. HEISTERUS &c.

[10] Qui infra insertionem intestini Ilei descendit, innixus summis Ilibus, sub dextro Rene.

[11] Conf. HALES *Veget. stat. exp.* LXXX.

alvinarum globi tanta ubertate collecti erant in coecum saccum Intestini, ut humano capite in resecto cadavere non minor visus sit [12]. Resorbetur enim, quicquid in scybalis adfuit liquidius, reliquiae siccae instar glutinis adhaerescunt valvulis coli, quod in mulieribus gravidis ipso tactu saepe percepit PRAECEPTOR. Et in literatis, aut artificibus, qui a cibo inflexo corpore sedent, frequens malum est.

### §. CIX.

*Intestinuli*] Quod (1) est processus gracilis tenuis, & longus ex Coli vel fundo,  
vel

(12) BONNET. *Sepulch.* L. III. f. XIII. *Obs.* VII.

(1) Coeci nomine coepit venire SYLVII temporibus, vide ejus *var. dissect.* post *Isaegen* p. 71. Et VESALIUS id nomen, ereptum sacco Coli, appendiculae confirmavit L. V. c. V. Est autem, in homine quidem, appendicula gracilis, digiti minimi vix capax, in foetu non major quidem absolute, verum pro portione Coli RUYSCH. *Thes.* I. *Arc.* II. B. RIOLAN. L. II. c. XLV. plerumque ex fundo ultimi globi Coli WINSL. IV. 139. vel ex sinistro pariete Coli sub insertione Ilei (EUST. T. X. f. IV. VESAL. l. c. MORG. &c.)educta, cum una alterave inflexione plerumque sursum (SANTORIN. *Observ. Anat.* C. IX. §. 9. & MORG. l. c.) in Intestinum Colon aperta patulo & ampliori ostio (SANTOR. l. c.) & in  
id

vel latere ortus, in ea sede tamen, quae averſa eſt ab ingreſſu Inteltini Ilei. Is longus ſaccuſ totus folliculis glanduloſis repletus eſt, qui mucum cibis adfundunt. In foetu major eſt, ibique auget (2) id ſpaci-  
cium,

id ipſum effundens mucum copioſum, paratum a glandulis ſolitariis (PEYER. *Parerg. Anat.* lc. III. G. RUYSCH. *Adverſ.* III. T. III f. 4.) quas habet copioſiſſimas. In foetu, ſimilius fabricae car-  
nivororum animalium, eſt manifeſtus ſi-  
nis inteltini Coli, paulatim in con-  
i ſpeciem extenuatum, & in cylindricam tan-  
dem caudam eductum RUYSCH. *Ad-  
verſ. Anat.* I. n. 2. *Theſ.* VIII. 50. HEI-  
STER. *Compend. Anat.* fig. 29: 30. In  
adulto colon majus eſt, appendicula vix  
increvit, & ex latere coli ſiniſtro educi-  
tur. In Equo, glire, mure alpino *mar-  
mota* SCHEUCHZER. *Phil. Trans.* 397.  
lepore (WEPFER. ap. PEYER. *Parerg. I.*)  
cuniculo & avium genere perampla eſt  
[GREW. *compar. Anat. of the guts*, T.  
24. 25. 27. 28.] in ſimia nulla, [BLAS.  
T. XXIX. f. XII.] unde ignorata GALE-  
NO. Habet proprium quoddam Meſen-  
terium, (SPIGEL. L. VIII. c. V.) & vaſa,  
ab Ileo-colica cum vaſis dextris Coli  
(XCII. not. 5.) communicantia.

- [2] DIEMERBROECK. L. I. c. VIII. p. 38.  
SPIGEL. *de foet.* c. XVIII. In adulto,  
modo vacuum eſt, uti viſum MORGAGNO *Adverſ. Anat.* III. An. XIV. modo  
recipit faeces alvinas, ut SANTORINO  
l. c.

cium, quod recipit faeces alvinas, cum in ea aetate crassa intestina omnia repleantur papaverculo, tenuia vero nihil admittant excrementorum. Quando vero neque ibi faeces commode possunt contineri, ut quae nimia copia adgestae sint, tunc vero distento & lacerato Intestino oritur dolor, & nixus varii, quibus promovetur partus naturalis (3).

*Valvula*] Quam & VAROLIUS (4) & BAUHINUS descripserunt, omnium tamen optime

[3] INST. MED. DCLXXXV.

[4] Si quidem fides habenda est JOHANNI POSTHIO, non alius fuerit inventor. Is enim Monspelii eam vidit (p. 504. post COLUMBUM) ubi studiis incubuit praecceptore RONDELETIO, (p. 497.) cujus mors cadit in annum 1566. Quare circa id tempus primum debuit eam valvulam vidisse, cum non videatur plurimis annis vixisse MONSPELII. Deinde CONSTANTIVS VAROLIUS eam videtur observasse: scriptum enim, in quo habetur L. I. *Anat.* c. III. p. 70. posthumum reliquit BONCOMPAGNIO, cum mortuus esset a. 1570. Tertius CASPARUS BAUHINUS a. 1579. vidit, & primus sibi fuisse adseruit. *Theatr. Anat.* L. I. c. XVII. p. 63. SALOMON ALBERTUS qui anno 1584. eam obiter descripsit, PICCOLHOMINEUS, & reliqui, & omnium maxime TULPIUS, recentiores sunt. Natura vero valvulae post tot lites, haec verissima visa est. Ileum Intesti-



optime NICOLAUS TULPIUS. Est nempe ipsum Intestinum Ileon insertum Colo, uti intra Pylorum innascitur Duodenum, non

testinum cum oblique se adponat Colo, atque ei adglutinetur (CVIII. not. 8.) totum in Colon se inserit. Et parte quidem posteriori cum Colo ita continuatur, ut saccum quemdam ejus caveae addat, & in anteriora in exiguam productionem educatur, similem inferiori productioni, sed minorem, ut aliquando pene nulla sit (HEISTER. l. c. T. II. f. I. lit. F.)

In parte vero anteriori Ileum se inmittit (VAROL. l. c. p. 70. BAUHNUS l. c. MORGAGN. l. c. *Anim.* XI. p. 19. SCHELHAMMER. *Progr.* 1695. n. XXII. p. 8.) oblique inter recedentes retrorsum membranas Coli, Carneam, Nerveam, & Villosam, ita ut omnes, praeter extimam, tunicae Ilei (conf. MORG. l. c. p. 20. WINSL. IV. 158. 159. 160. 161.) a membranis iisdem Coli, sive incipientis caeci, includantur mediae, atque protuberent intra ipsam coli caveam in parabolae speciem, [semicirculum TULPIUS *Observ. Med.* III. XXI. p. 213. & T. X. f. I. II. conf. HEIST. T. II. f. I. G.] cujus vertex imus est, sursumque curva expanditur, quod parabolicum velum valvulae officio fungitur, atque adscendenti ex imo colo faeci viam in Ileum perfecte obcludit, ut ad Hepar libere pergere possit, in tenue vero Intestinum relabi nequeat, cui repressam valvulam obducit.

non vero continuatum, ad angulum in homine perpetuo rectum, secus ac in brutis animalibus, fluctuans intra caveam Coli, ibique bifariam sectum, ipsam constituit valvulam Coli, & in ipso osculo firmatur anulo musculari. Ejus utilitas est, ut permittat

conf. FABRIC. ab AQUAPENDENTE *de Intestin.* dum iter ab Ileo in Colon intestinum liberrimum conservatur. Utraque portio interior, major, & superior eademque minor angusto limbo continuantur, ut inaequalem anulum juncturae efficiant.

Haec eadem valvula ex utroque angulo mae, qua Ileum in colon patet, rugam educit, aliquoties visam dexterius absque compare, quas rugas fuse describit MORGAGNIUS *Advers. Anat.* III. f. 2. g. g. & *Anim.* XIII. deinde HEISTERUS *Diff. de valv. Col.* T. I. f. 1. 2. 11. &c. Eae rugae & villosam & musculosam fabricam [MORG. I. p. 23.] Coli recipiunt. Haec sunt *retinacula* TULPII l. c. p. 213. & MORGAGNI. Et haec quidem fabrica in recente Intestino ita se habet, quando culter Anatomici non accessit. Si vero repurgandi nomine, Anatomicus solvat cellulosa fabricam, quae Colon cum Ileo conjungit, recedent paulatim Ilei tunicae ex iis, quibus continebantur, Coli tunicis, & Ilei quidem ingressus ad angulos rectos fit, atque, si quidem mediocriter remota sint cellulosa vincula, loco Valvulae oritur anulus FALCOBURGII apud BARTHOLINUM *Anat.* P.

mittat transitum cibi, & faecum alvinarum ex Ileo intestino in Colon ; easdem reddituras, quacunque de causa, ex Colo intestino in Ileum, coërceat (5), & complicata iter obstruat,

p. 92. PAWII ad HILDANUM civem meum *Epist.* LXXXVII. XIC. HIGHMORI *disquisit. Anat.* L. I. P. II. p. 39. DIEMERBROECKII *Anat.* L. I. c. VIII. RUYSCHII *Thef.* VI. LXX. *Thef.* M. x. CCXVI. BIANCHI in *propr. diff.* apud MANGET. *Theatr. Anat.* I. p. 300. & *Tab. extraord.* II. f. 3. Si vero quam sollicitissime solvatur Intestinorum cohaesio, omnis omnino valvulae, aut anuli idea abolitur, & Ileum Colo Intestino omnino continuatur, quales praeparationes non paucas ostendere possum, & olim vidi apud Illustrem ALBINUM. Verum eae administrationes, uti ad uberiores cognitionem fabricae faciunt, ita mutant naturae finem, novamque fabricam producant. Tres vero valvulas ARCHANGELI PICCOLHOMINEI *Praelect.* XI. p. 86. non intelligo, qui neque duas numerari velim.

[5] Quod constanter, & per experimenta, defendunt VAROLIUS, ALBERTUS, PICCOLHOMINEVS, HILDANUS *Epist.* LXXXVIII. LITRE *hist. de l' Acad. des scienc.* 1717. FANTONUS *diff. Anatom.* p. 104. & plerumque verum esse in cadaveribus video. conf. LEPROTTUM *Comm. Acad. Bonon.* p. 351. Nam post KERKRINGIUM in *spicil. obs.* XXXI. non ignoro, haud paucos anatomicos de exquisita valvulae in claudendo Ileo efficacia dubitasse.

obstruat, constrictione musculari coarctet, caveatque exquisitè, ne aliqua earum portio redeat in tenuia. Ex hydraulicis enim facile explicatur, nitentem quidem faecem per intervallum duarum valvularum, eas aperire, atque ad latera colli adplicare; eandem a colo adventantem, & contra ileon tendentem, offendere ante se membranam fluctuantem, & adplicare osculo intestini ilei. Aliquando, per summam violentiam convulsionum, laceratur aut resolvitur paralytica, tumque faeces alvinæ per os egeruntur: quem spurcum & horrendum morbum ab ipsa re dixerunt *miserere mei* (6). Infra hanc insertionem est magnus coeci intestini saccus, in quem delabuntur faeces alvinæ & accumuluntur.

*Perpendicularis*] Hic adscensus, in corpore erecto & complicato, sedentis eruditi, una cum flexione ad hepar, faecem moratur & retinet. Inde exhalat e putrescente excremento elasticus aër, fiunt flatu, ructus, symptomata hypochondriaca, adeo familiaria, & molesta literatis hominibus.

*Lymphatica*] Quae in cellulas aliquas sive appendices implantatas intestino crasso Asini, vidit hiare MALPIGHIUS (7), resorbuntur

[6] Rarissimas esse veras historias regurgitantium clysterum MORG. *Adv. Anat.* III. *Anim.* IX. & insanabiles, atque ad recidivam maxime proclives, ubi faeces revomuntur id. ib.

[7] Ad glandulas nempe Mesocoli de *Gland. conglob.* p. 5.



turbidam, & lutulentam Lympham. In homine (8) non facile conspiciuntur, sed adesse vel ex eo argumento demonstramus, quod visi sint homines, qui solis clysteribus (9) diu vitam sustinuerunt; deinde ex pul-

[8] In brutis NEEDHAM *de form. foet.* p. 9. 10. WEPFER. *respons. ad PAULI* p. 106. GLISSON. *de Ventr. & Intest.* c. XI. 19. &c. & prima omnino, quae visa sunt hominibus, Lymphatica vasa, in Recto Intestino adparuerunt RVDBEKIO. *conf. de Vas. serof.* c. VI. p. 296. apud HEMSTERHUSIUM. NUCK. *Adenagr.* c. IX. p. 130. & PAULI *respons. ad dub. anat.* p. 106. In homine unum & maximum Vas Lymphaticum ex colo Lympham revehens SCHELHAMMER EPH. NAT. CUR. Dec. III. Ann. III. Obs. XCII. Resorptionem in venas mesentericas crassorum Intestinorum experimento demonstravit MERY. Confer quae de lacteis crassorum Intestinorum dicta sunt, CIII. not. 5.

[9] MORGAGN. *Advers Anat.* III. anim. XVII. GARENGEOT. *Oper. de Chirurg.* I. p. 190. pluresque historias apud STALPART VAN der WIEL *obs.* XXV. Cent. I. & pulchrum experimentum clysteris inebriantis vide apud SANTORINUM p. 125. *conf.* HOMBERG *Histoir. de l'Acad. des scienc.* 1700. Obs. 3. RHOD. *Obs. med.* 38. Centur. I. Adde clysteres febri-fugos, expertissimi WERLHOFFII *Obs. de febr.* p. 78. Dubitant tamen alii, & princeps TVLPIVS *obs.* 42. L. I.

pulcherrima utilitate clysterum ex melle nitro & aqua, in morbis calidissimis, quam certe non intelligimus, si nulla a cavitate intestinorum in sanguinem via esset. Iidemque clysteres non redduntur, & re-forbitionem manifesto demonstrant, quae fit per vasa Lymphatica. Ea Lympha, non putrida quidem sed subputrida, utilitates suas in sanguine habet.

*Tale*] Faex alvina in Intestino Ileo non faetet, etiam quando sicca est, & surfuracea. Quam primum eadem superavit Coli valvulam, oritur putridus & stercoreus faecor (10). Nempe mora ibi contingit faecibus, & putredo, quam sponte sua concipiunt adfusi humores humani, ex propria indole alcalinam naturam induentes, qui, in loco calido & humido, necessitate certissima putrescunt. Cum vero haec mutatio admodum subito cibus contingat, existimavit HELMONTIUS (11) deberi eam stercoreo fermento, residenti in vermiformi appendicula, & ex efficacia sua cibi inutiles reliquias in stercus transformanti. Verum sufficient utique eae causae quas adduximus, atque in appendice illa nihil nisi mucus habitat (12), ex plurimis glandulis simplicibus

[10] In praeparatione Valvulae coli difficillime eluendus.

[11] *Sextupl. digest.* §. 81.

[12] *Not. I.* & WEPFER. apud PEYER. *de Gland. Intest.* p. 10. Imo vero rubedinem in tinctura Heliotropii, oriri ab adfuso humore

bus adfusus. Neque subito is factor oritur, neque tantus est in Colo, quantus in Recto Intestino est, sed eo putidior, quo ano propius accessit excrementum (13).

*Valvulae*] Ab ipsa Caeci appendicula, per omnem longitudinem Intestini Coli porriguntur tria (14) valida ligamenta, quae toti-

humore hujus appendicis; VIRIDETUS libro saepe cit. ll. c. IV. quod valde ad-versatur putredini, sed manifeste paradoxum est.

[13] Et in adulto demum factor accedit faecibus, cum pro portione corporis appendicula foetui & infanti major sit.

[14] JACOBUS SYLVIUS tria ligamenta primus in puerpera vidit; *varior. corp. dissect.* p. 71. & utcumque indicavit EUSTACHIUS T. X. f. IV. V. 76. 13. &c. Reliquis ejus aevi anatomicis fere duo numerata sunt, magno consensu, vid. VESALIUM p. 501. ed. 1543. VALVERDAM L. III. p. 183. COLUMBUM *de re Anat.* L. XI. c. V. p. 229, RIOLANUM *Anthopr.* L. II. c. XIV. &c. Deinde seculo XVII. unicum numeratum est a BARTHOLINO, MARCHETTO p. 32. p. 92. FANTONO l. c. p. 107. & aliis compendiorum scriptoribus. Et primus tria restituit RUYSCH. *Catal. varior. Theca C. Repos.* III. n. I. p. 149. & uberius MORGAGNUS *Anim. Advers.* III. *Anim.* XV. & f. III. „ totidem fasciculos fibrarum firmarum, qui inter medios tumentes globos Coli intestini, depressiores incedunt, orti a Vermiformi appendice (MORGAGN. l. c.) ejusque fibris longitudinalibus. Duae  
tae-

totidem musculorum loco sunt, & in ipsum intestinum Rectum finiuntur (15). Ea ad minimum textuplo breviora sunt Intestino Colo, quare resecta colon dimittunt in liberam inmanem amplitudinem, atque relinquunt tenuissimum; crassities enim omnis est a ligamentis. Eorum officium est, intestinum Rectum elevare, Colon vero ad suam originem adducere, & ita retrahere in brevius, ut rugas agat (16), atque in ejus cavea juga (17) nascantur, non ex villosa

taeniae satis evidentes sunt, nisi quod altera in parte transversa Coli tegatur Omento; tertia Mesocoli adhaesione tegitur WINSL. IV. 147. Conf. in cuniculo AMSTELAEDAMENSES p. 15. f. 6. In ea sede ubi Omentum nullum est, Colo sinistro, atque flexu semilunari visa est taenia deesse: Quae observatio VESALII auctoritatem salvam facit.

[15] ex not. 3.

[16] Quare resectis his ligamentis evanescunt cellulae Coli. RUYSCH. *Thef. G. Repos.* II. n. III. MARCHETTE l. c.

[17] *Valvulas conniventes* dixit KERKRING. *spicil. observ.* XXXIX. licet multis vetustioribus dictae fuerint, ut FABRICIO, GLISSONIO, MARCHETTO l. c. Nempe ex majori cylindro, deprimitur intestinum Colon per tres longitudinales fibrarum fasciculos, in cylindrum minorem, cujus tangentes sunt ligamenta, & in tres semicirculares saccos, qui reliquiae sunt cylindri majoris. Quod de cylindro majori in minutum est, detrahentibus ligamentis, id in Coli caveam edu-



fabrica, uti in tenuibus intestinis fit, ea enim hic nulla (18) est, sed ex ipsa nervea, quadruplicata fere, ut resectis ligamentis, intestinum Colon pene quadruplo fiat longius (19), non aequè tamen aptum remorandis faecibus. Artificium admirabile hic subest; neque enim decebat intestinum fecisse longissimum, neque amplissimum: Verum neque expeditam viam esse oportebat, ne turpi necessitate egerendi (20) perpetuo mentis officia turbarentur. Ergo mediocre

ducitur, rugasque facit variae latitudinis, ordine alterno, & triplici Ruysch. *Mast. rar.* l. I. c. c. profundiores, quam in tenuibus, (licet omnino nullas viderim & exiguas) altiores inter Mesocolicum, & Liberum ligamentum, & ibi exterius magis conspicuas, alibi minores. Omnes & breves, & inplexae, & ramosae, & a figuris scriptorum omnino alienae. Hae lunulae intercipiunt iter cibi, & moram injiciunt. Conf. BIDLOO T. XXXIX. f. 5.

[18] Utique adest brevior WINSL. IV. 145. 146. & XCI. *not.* 1. Et omnes tunicas descendere ad efficiendas cellulas, idem WINSL. l. c. 150.

[19] Et amplius, & longius discedentibus globis atque se repellentibus; quod adparet flatu fortius adducto, crepantibus valvulis, aut iis ipsis dissectis.

[20] In animalibus carnivoris colon simplex, & faex liquida, & voracitas eximia. Vide GREW in viverra, fele, cane T. XXIII. Casuario T. XXVII. in Leacna PARISINOS, in urso eodem. In herbivoris cellulae aut simi-

factum est Intestinum, sed interfectum mobilibus valvulis, ut & dilatari possit ad ubertatem excrementorum, & ad exiguas faeces denuo contrahi. In intestino recto nullae sunt; in cuniculis, leporibus, avibus, equis, maximae, ut scybala in globosas particulas dividendo figurent. Sed etiam aliud earum valvularum commodum est. Quando enim adscendunt faeces, & pondere suo, quod facile fit, incipiunt relabi, tum vero valvulae retinent faeces, ne descendant longius, aut premant eos globos scybalorum, qui sequuntur adscendendo (20\*).

*Inflexus*] intestini coli multiplex & mirabilis est curvatura, diversa a fabrica brutorum, & optime descripta a VESALIO. Namque ab ipsa origine, quae est in dextra sede Ilium, adscendit (21) ad Hepar & Duodenum

similes humanis, ut in equo T. XXV. aut minutiores, in cuniculo, id. T. XXIV. & AMSTELAEDAMENSES, ove, capra, Dromedario (PARISINI. p. 64. edit. BATAV.) Quibus exemplis sententia PRAECEPTORIS confirmatur.

[20\*] Hanc valvularum efficaciam uberius illustratam vide apud conjunctissimum Collegam SEGNERUM *diff. de valvul. Col.*

[21] Recta sursum & retrorsum, atque ibi vesicula fellea Colo intidet, coloremque flavum communicat, & cum ea vesicula, atque cum rene, & Duodeno, variis ligamenti conjungitur WINSLOW. IV 153. Nodus ibi habetur apud EUSTACH. T. X. f. V. plerumque nullus est. Vid. VESAL. L. V. f. VIII.

denum usque, ibi inflexum ad angulum rectum transversum (22) sub Ventriculo fertur ad Lienem usque, ubi denuo flexum (23) saccum facit, qui altera est flatuum in hypochondriacis, & faecum alvinarum in gravidis sedes, ita ad angulum rectum descendit ad Ilium sinistrum, atque rursus adscendens (24), cum obliqua directione ad dexteriora, ultimo inflexum, jam rectum, & simplex, nomine mutato os sacrum petit. Bis ergo adscendunt faeces alvinae, ad perpendiculum, bis descendunt, angulos superant quatuor, rectos duos, acutos totidem. Et in illo flexu, quo sinisterius transversum Colon

f. VIII. EUST. l. c. f. IV. Bass. *Obs.* 2. Dec. II.

[22] Plerumque, uti olim VESAL. p. 500. & l. c. & EUSTACHIUS utrinque, & alii. Sed dudum MORGAGNUS observavit, „ faepe longe a Ventriculo, & sub ipso umbilico, „ eam partem visam esse aliquando in „ pelvim descendisse, ut ad Lienem adfurgeret ADVERS, ANAT. III. §. II Et ego ab hepate ad Ilia descendisse vidi, & denuo ad Ventriculum adfurrexisse.

[23] Ibi frequenter nodus adest, conf. VESAL l. c. & in descriptione EUSTACHIUS, in utraque figura, &c. Deinde descendit ante Renem Intestinum Colon, eique adnectitur, usque ad Iliacum musculum.

[24] VESAL. V. R. S. T. l. c. EUSTACH. in utraque icone pro duabus varietatibus. Hunc inflexum, maximam remoram clysterum, Sromanum vocant Galli. WINSLOW l. c. 154.



lon ad Lienem descendere incipit (25), habitant illi Eruditorum dolores, quos innocentia Lieni solent tribuere, cum alvinae faeces, mora ipsa ex flexu adgestae, & flatus retenti intestinum distendunt. Sed & amabilis sexus, quando gravidus uterus (26) universum fere abdomen occupat, eadem incommoda patitur. Quae ad Lienem non referenda esse, vel ex eo patet, quod medeamur iis incommodis ducta alvo, debili nimirum medicamento ad mala, quae Lienem afficiunt.

*Putrefaciendis*] Omnes partes animalium & plantarum (28) in aëre calido, in loco clauso, congeltae putrescunt, & in olidum stercus degenerant. Sed in intestinis eadem causae adsunt, & iidem debent expectari even-

[25] Cum imprimis ibi nodus adsit, moraturus insigniter & flatus & faeces. Annon & ibi is dolor, qui currenti a pastu molestus est, & ad Lienem refertur? nam & in dextro latere percipitur in simili plica, & acutus est, qualem Intestina patiuntur.

[26] BIDLOO T. LIV.

[27] *Longitudo, in Text.*] Novem pedum GLISSON. *de ventr. & intest.* c. XI. 17.

[28] Etiam acidissimarum BOERH. *Elem. Chem.* II. LXXXVIII.

[29] *Fibrae, in Text.*] Quae ejusdem omnino sunt naturae cum fibris intestinorum tenuium dictis XCIII. plures transversae, ut solent WINSLOW. IV. 137, pauciores longitudinales, & externae membranae haerentes, in universum tamen robustiores,



ventus; & prae reliquis, confusis in sterco humoribus. Bilis praecipue in alcalinam naturam & putredinem prona est. Ideoque sterco humanum destillatum dat salem alcalinum volatilem, etiam si solis acidis homo pastus fuerit. Idem longè uberrime phosphorum edit.

*Contractionis*] Motus iste (30) differt a Peristaltico motu, qui intestina tenuia, perpetua,

res, & rubicundiores quam tenuibus. Vidi Colon intestinum saepissime contractum in diametrum Ilei, manifestum argumentum roboris.

[30] Nescio quo experimento usus sit PRAECEPTOR: nam in cane quidem manifesto motus Peristalticus in Recto quod nomen Colo canino solent tribuere fursum & deorsum facta agitatione visus est WEPFERO *de Cicut. Aquat.* p. 199. & facile ipsa rei natura, organorum robur, actionisque necessitas confirmant, non minus peristaltico motu crassa intestina agitari, quam quidem solent tenuia.

[31] *Pinguedine, in Text.*] *Adpendices omenti similes* Intestini Coli, descriptae olim a VESALIO p. 501. ed. 1543. omnibus ab eo anatomicis, & ipsi FABRICIO, GLISSONIO aliisque dictae sunt; postquam autem ex hominum memoria fere perierant, renovatae a RUYSCHIO *Mus. rar.* 158. & f. V. Sunt solidi pene globi pinguedinis, ex membrana externa Coli Intestini ubique penduli, quorum unguine intestinum universum lubricatur. Depinxit etiam BIDLOO T. XXXIX. f. 6,

petua, sed alterna agitatione coarctat. In crassis vero Intestinis motus muscularis est, non nisi praesentia, & ubertate acrium, & distendentium faecum excitandus, & inducias faciens, quam diu faecibus intestina non irritantur.

*Glandularum*] Quae solitariae (32), sed longe majores, ex amplis stigmatibus mucum in Intestini caveam effundunt.

*Necessitatem*] Nervi acutissime sentientes dati sunt Intestino ultimo; iis faex dura & congesta intolerabilis est adeo, ut oriatur mirus ille, & certissime cogens nixus ad e-  
ge-

[32] Quas in crasso intestino vulpis depinxit olim GREWIUS *compar. anat. of the guts* T. 23. deinde fusius WEPFERUS apud PEYERVM *de gland. Intestin.* p. 10. & ipse PEYERVS *conf. l. c. Ic. III.* RVY-SCHIVS earundem, quas *spurias* dixit, icones dedit T. XII. *Epist. XI. f. I. & V.* Sed veros esse folliculos, in quos effusa materia ceracea, non penetrat in intestina, verum maculas ceraceas efficiat, ex ipsis intestinis RUYSCHIANA manu paratis demonstrat BOERHAAVIUS *de fabr. glandul.* p. 37. Verum GALEACIUS ultimo loco fabricam earum paulum diverso modo tradidit, easque non simplices folliculos esse, sed communes lacunas, in quas plures folliculi mucum congerant, scripto & icone expressit COMM. ACAD. BONON. ad p. 370. *ic. III.* Fundunt vero lubricum & viscidum liquorem, simillimum mucos fluidiori faucium, & per anum magna copia non sine periculo aliquando profluentem in Dysenteriiis incruentis.

gestionem, qui non dolor est, sed omnium musculorum quaedam convulsio, conspirans in eam efficaciam, qua hostem molestum propulsare possint, tanto certe cum conamine, ut scybala ante valvulas Intestini Recti constituta nullo mentis imperio possimus retinere. Simillimi certe sunt conatus doloribus parturientium, quae non prius veris tormentibus corripuntur, quam cum infantis caput in os uteri incumbens tenesmus violentissimum efficit, matresque non adeo dolores veros, sed intolerabiles conatus patiuntur. Tales nixus patiuntur utriusque Indiae incolae, quando acres humores ano infixi lacerant sensiles nervos, efficiuntque morbum quem *Perse* (33) vocant, ubi perpetuo tenesmo exerciti, continuo cacaturientes per vias desidunt, inutili conamine, donec miserrime pereant succedentibus artuum convulsionibus.

### §. CX.

*Longitudinales*] Ligamenta tria coli, ubi ad intestinum Rectum accedunt, dissiliunt, & fibras suas super totum intestinum Rectum dispergunt, unde nullae in eo valvulae

[33] *Den druyloop BONT. hist. natur. & Med. Ind. L. II. c. VI. quem vide.*

[1] *Perpendicularis, in Text.*] Ad ultimam lumborum vertebrae, descendens & rectior particula Coli, quae crus est sigmoidis flexionis dexterius, paulatim exuta natura Coli, cellulis & valvulis sensim decrescen-

Ll 2 tibis



lae sunt. Hae adeo validae Rectum Intestinum elevant, ut, si quidem elabatur, semper inversum propendeat.

*Spirales*] Longitudinales, & spirales (4)  
fibrae

tibus donec evanescant (VESAL. p. 501. ed. cit. RUYSCH. *Repos.* II. n. VI. p. 157.) fit Rectum, & circumdatum duplici plica semicirculari Peritonaei, (GARENGEOT T. VII. M. ex WINSLOW. IV. 206.) exit oblique ex Peritonaei cavea, ut facies posterior primo, deinde ad vesiculas seminales etiam anterior extra Peritoneum sit. Ita pelvim subit, uberrima cellulosa fabrica & molli adipe cinctum, fultum sacri ossis & coccygis anteriori cavaque facie, atque retrorsum inclinatum, ora elliptica, quae *anus* dicitur, terminatur ultimo (CXI. not. 3.). Ante se positam habet Vesicam, cui necitur solubili cellularum nexu, & in foeminis non separabilem Vaginam.

[2] *Valvulisve, in Text.*] Exceptis ultimis not. 6.

Quare Anatomici plerique canibus denegant Colon, quod crassum Intestinum planum, & leve sit, & humano Recto simile.

[3] *Longitudinales, in Text.*] Quae tenues in reliquo omni ambitu Intestinorum, validis-

simae sunt in Recto, & rubrae: VESAL. l. c. p. 501. Nempe ligamenta tria tendinea ad se invicem discedunt, dilatata, atque expansa super omne Intestinum, [COWP. *Myot.* 1724. T. XX. lit. D. EUST. l. c.] tubum carneum, rectis fibris compactum efficiunt, EUSTACH. T. X. f. IV. V.

[4] *Circulares* VESAL. L. V. fig. VIII. RUYSCH.

*Epist.*



fibrae mutua opera se adjuvant; Rectae Intestini fistulam super faeces adducunt: eadem retrahunt post egestionem intestinum, ne perpetuo ani prolapsu laboremus. Spirales flexae circa fistulam, faecum globo plenam, eum propellunt. Neque hic retrogradus motus videtur fieri (5), qualis in tenuibus Intestinis observatur.

*Valvulas*] Quas ad exitum ani modo simplices, modo magis conpositas descripsit MORGAGNUS (6).

### §. CXI.

*Laxatio*] Sphincter non laxatur (1) ex animae imperio: imo vero in universum

*Epist. XI. T. XII. f. 1. 2. COWPER. L. c. E.*

[5] Fit utique, ut ex clysteribus, qui retinentur, adparet, & manifesto distinguitur, quando faeces alvinas, ad egestionem alvi nitentes, imperio animae reprimimus.

[6] Tunica villosa Intestini Recti in plicas longitudinales collabitur, similes plicarum Oesophagi, inter quas, tamquam totidem columnas, aliquando transversae plicae membranae intercipiunt iter faecesque morantur MORGAGN. *advers. Anat.* III. & f. I. WINSLOW. IV. 177. Valvulas etiam Bidloo habet ad T. XLVII. f. V. & RUYSCH. *Thef.* IV. 79.

[1] Constringitur certe ex voluntate animae, laxatur modice sibi relictus, penitus ex nixu Levatorum & Diaphragmatis.

dubius sum, num in quemquam sphincterum voluntati aliquid liceat. Aperitur autem, quia pressus a faecibus innitentibus resolvitur paralyticus, ut destitutus nervorum influxu resistere nequeat; accedente validissima vi imminentis septi transversi, sub fornice suo propellentis viscera abdominis, quorum omnium momentum ultimo in sphincterem nititur. Et alvi egestio, inspirati aëris & retenti efficaciae, & validissimo descensui Diaphragmatis accepta referri debet, omnisque potentia faeces expellens deficit, quoties ordimur expirationem. Unde & foetus (2), cum non respiret, neque alvum egerit, & si faeces per uterum in partu ejicit, certissime pronunciamus, quod aërem hauserit, cito periturus, si ejus usura vel exiguo tempore destituatur. In eo ergo nixu, aër valide & diu inspiratus, servatus in pulmone, ideoque rarefactus, clausa glottide, vetita expiratione, nititur in descendens alioquin Diaphragma, id propellit deorsum, Ventriculum & Hepar, hinc intestina omnia in pelvim urget, in quam, nullis musculis firmatam, qui reliquum abdomen validi coercerent, omnis nixus terminatur, & propulsa faeces urinamque magna vi projicit.

*Sphinctere*] Disputatum est ab Anatomicis, quomodo fieri possit, ut sphincter faeces contineat, cum demonstraverit BER-

NOUL-

[2] Conf. DCLXXXV.

[3] Duplex Sphincter est ani, *Internus*, ex elliptico orbicularis, carneus, valens, ultimam oram Recti intestini terminans, transversarum

NOULLIUS musculum anularem nonnisi ad unam tertiam partem diametri contrahi posse. Verum sphincter ani non linea est absque latitudine, sed contractus latam mem-

farum fibrarum extrema continuatio. Hunc post GALENUM *de Musc. dissect.* c. XXX. pinxit BIDLOUS T. XXXXVll. f. V. C. D. & distinxit DOUGLASSIUS c. XXlll. & app. p. 10. WINSLOW. lV. 180. & ALBINUS L. lll. c. XCVI. & hujus quidem in claudendo intestino praecipua est potestas. Sed latior alius, [BIDLOO l. c. B.] cuncti adhaerens, & multa pinguedine intertextus, laxioribus fibris, ellipticus anum ambit, posterius coccygi, aut ligamento potius a Coccyge ad cutem cuncti innexus SANTORIN. p. 178. GALEN. *de admin. anat.* L. VI. c. XLV. WINSL. 187. ALBIN. lll. c. XCI. Anterior, postquam medium anum interceptit, triangulari productione inseritur acceleratoribus COWPER. T. XIX. n. 14. SANTOR. T. lll. f. V. S. aliisque fibris carneis juxta Transversum antrorsum incedentibus, Acceleratores urethrae ipsos generat. ALBINUS p. 322. COWP. 1694. c. 5. p. 38. Medium intestinum constringit, & arctat, urethram retrahit, prostatam comprimit, urinam & semen expellit.

[3\*] Adde, quod sphincter ani, uti sphincter oris & vaginae, non sint circuli carnei, sed duarum semiellipsium intricatio, quae in axes utroque fine se secant, adeoque etiam exigua in rectitudinem mutatione, magnam partem spatii intercepti delent.

membranam complicat in rugas, quae protuberando in cavum Intestini tubum facile totam cavitatem (4) delent.

*Levatores*] Solent anatomici Levatores ani ita describere, ut ex utroque ani latere orti, marginibus recti Intestini se adplicent. Verum diversa est omnino fabrica. Oriuntur enim anterieus ab osse pubis, posterius ab osse

- [4] Lati & tenues muscoli oriuntur posterius a ramo ossis Ischii, paulo supra tuber cui insidemus, in ea sede, ubi foramen magnum perficit. Hae fitrae fere transversae sunt. Deinde anterieus in ipsa pelvi supra foramen magnum [SANTOR. T. III. f. V. G.] Hae fibrae leniter descendunt. Porro ab ossibus Ischii & Ilium continuo sequendo ambitum foraminis ovalis ad originem Obturatoris interni, & ab ejus membrana [MORG. *Advers. Anat.* III. anim. 44.] Hae fere transversae [ALBIN. l. c.] Ultimo ab osse Ischii ejusque spina acuta, EUSTACH. T. XXXVII. atque fere a ligamento vicino. Hae valide descendunt [EUSTACH. T. XXXVI.] Earum fibrarum anteriores & Sphincteri intexuntur, & varie cum Prostata atque bulbo vesicae connectuntur. Supremae & posteriores in unum digastricum musculum confluent inter anum & coccygem. DOUGL. WINSL. &c. & aliqua parte Coccygi infiguntur ALBIN. p. 332. Omnes anum suspendunt, prolapsum reducant elevando, & subjectas partes Urethrae, prostatasque & vesiculas feminales comprimunt. Pelvim finiunt ejusque imum parietem efficiunt, ubi ossibus non firmatur. WINSL. IV. 191.



sacro, lateraliter ab Ossibus Ilium, & undique totum intestinum rectum amplectuntur, ut non elevent solum, verum quam maxime dilatent. Recte eos BIDLÖO proposuit, & COWPER, & SANTORINUS.

*Pinguitudinis*] Rectum Intestinum est pinguisimum (5), ut a Lanionibus vulgo Intestinum pingue vocetur, etiam in macilentissimis hominibus, & praeterea glandulas mucosas (6) copiosissimas habet, quae emulgentur actione fibrarum longitudinalium (CX. not. 3.) intestinum stringentium.

*Muco*] Adjacent hic lacunae (7) mucifluae, amplissimae, in quibus sedem faciunt fistu-

[5] Inde edule & delicati saporis: est autem ea pinguedo partim effusa in cellulosam fabricam peritonaei, in qua ultimum Rectum situm est LXXXVI. not. 12. partim in cellulosis appendicibus, quales in Colo descriptae sunt CIX. not. 31. in Recto non minus frequentes.

[6] CIX. not. 32.

[7] Non solum glandulae simplices, quas *lacunulas* vocat RUYSCH. *Thes.* IV. 67, & pingit in T. XII. *epistolarum*. Sed majores vesiculae, propriis ductibus se exonerantes in Intestinum Rectum supra sphincterem, secernentes inungens liquidum. Tales in quadrupedum pene toto genere reperiuntur, & peculiarem odorem solent validissimum exhalare, foetidum in vulpe, Putorio Lutra, Castore &c. odoratum in Cato Zibethico, Mure moschato &c. conf. GREW *Compar. Anat.* T. XXIII. PARISINOS in Castore &c. PEYERUM

fistulae ani, pertinacissime (8) depascentes omnem pinguitudinem, donec Intestini parietes, non lubricati, adfricti ad se mutuo, inflammentur, & exulcerentur. Ipse sphincter, raro, nisi in Lue Venerea adficitur (9): Si desit is mucus, ut non raro fit infantibus, pereundum est, nisi oleum per siphonem injeceris, quo inungantur scybala, quae tunc quidem instar cretae sicca sunt. In haemorrhoidibus siccis omnis dolorum vis averti potest, si ante egestionem alvi unciam dimidiam olei per fistulam injeceris, neque unquam fefellit experimentum, in iis, a quibus suadente BOERHAAVIO factum est.

## §. CXII.

*Bilis*] Negat acerrime HELMONTIUS, quod aliqua Bilis particula faeces tingat [1].  
Ve-

de *Gland. Intest.* p. 103. &c. Sed & in homine non perpetuas, tamen similes vesiculas muciparas vidit MORGAGNUS propriis ductibus pervias. *Advers. anat.* III. p. II. & similem folliculum in femina Cl. SCHULZE *Commerc. Liter.* 1731. *spec.* 3. p. 20. Accedunt diversae glandulae &c.

[8] Si profundae fuerint, ipsaeque ossa carie erodentes, fundentes enormem vim puris corruptaeque pinguitudinis.

[9] Omnino eroditur sequente urinae incontinentia HEISTER. *Chir. German.* p. 816.

[1] Quod faecum alvinarum dulcis sit sapor &c. *sexupl. digest.* 36. 37. Verum bilis putre-

Verum vel solus flavus color satis arguit praesentiam bilis; deinde perpetua observatio, quod bile vigente intensior sit color, una cum bile languescens, in ictero nullus.

*Sanguinis*] Multa sunt, quae docent ipsa sanguinis recrementa per hanc viam educi. Laxissima fabrica vasorum Mesentericorum (xcī. not. 3. &c.), quae ceram ipsam in Intestinorum caveam transmittunt,, frequentes eorum conjunctiones, ut repleto uno trunco, repleantur omnes (xcīi. not. 6.),, papaverculum (3) in foetu, quod certe ex sanguine ipso potius nasci videtur, quam ex amnii liquore, tantas vires adtenuantium vasorum experto, & longe, quam sanguis est, subtiliore, adeo tamen copiosum, ut omnia intestina crassa repleat, adeo faeculentum, ut opium ipsum referat,, sanguinis per alvum depuratio, quam adeo potenter promovent medicamenta hydragoga, creberrimas & uberes egestionem scientia,, & aliae rationes satis suadent, Hepar, Lienem, universum sanguinem per eas vias posse inutili & noxia materia liberari, quae Veterum sententia

[4]

trifecta potest saporem proprium deposuisse.

[2] XCIX. not. 6. In ictero, & calculo vesicae felleae faeces albae. Huc dejectiones cum subito tormine, bilis pene meracae, turbidae, flavae, in sanis etiam hominibus frequentes.

[3] INST. MED. DCLXXXII.

(4) fuit. Aliam rationem tristitia subpeditant experimenta. Postquam horribile instrumentum ternis hedris vulnerans, (*bajonettes*) inventum est, frequentes facti sunt casus, quibus intestina ipsa dissecta sunt. Nihil magis erat ad sanationem necessarium, quam cibus, qui nullas daret faeces alvinas, donec intestina faucia 14. dierum tempore se comprehenderent, & coalescerent (4\*). Id praestiterunt Medici, dum solo jure carniū aegros aluerunt (4\*\*); ita per 14. & 21. dies alvus sicca erat, & quando tandem aliquando solvebatur, succedebat meconium; id ab ipsis humanis erat humoribus.

*Causa*] Eductum est ex cibo id omne, quod acescit (5), id omne, quod in alimentum cedere potest; adfunditur nihil, quod humano sale, & ad putredinem prono non praegnans sit; accedit calor, quies: nihil superest,

[4] A ventre non sentienti tenuia prodire malum, est enim ab hepate *Prorrhēt. I. X. Cont. MAEANDRI uxorem, & NICOSTRATI uxorem, & famulam, in EPIDEM. IV. & CLEOTIMVM Epidem. VII. Pus ex hepatis abscessu per diarrhoeam dejectum SHORT. Philos. Trans. 420.*

[4\*] Frequentes ab eo tempore casus occurrunt, in quibus dissectum Intestinum ad parietem vulneris coaluit, eventū minime funesto RAV. in *orat. Prorect. GARENGEOT oper. de Chir. I. p. 193. &c.*

[4\*\*] GARENG. l.c. p. 190.

[5] Quare Chylus & Lac acescunt.



supereſt, ut naturam ſuam, & ſpontaneas mutationes faex ſequatur, fiatque putredo.

*Glandulas*] Quia ſtercus, quo propius exitui inteſtinorum, eo durius ſimul eſt, & acrius.

*Stercoreo*] HELMONTIUS (6) videbat perpetua obſervatione, nunquam in Ileo inteſtino faeces faetidas reperiri, neque in Colo, quae non faeterent. Quaerebat ergo cauſam huius mutationis in limite utriusque generis faecum; atque, cum mera fermenta in mente haberet ex praeiudicio, poſuit in coeco inteſtino flavum fermentum, ſive ſcoriam liquidam, quod & faeces putredine inbueret, & ad renes effluens, flavum colorem in urina faceret, quem male a bile dicebat deduxiſſe GALENUM. Argumento eſſe, inquiebat, calculoſos, in quibus nunquam flava reperiretur urina. Verum videtur bonus vir HARVEII ſcripta vel nunquam, vel adeo ſenex legiſſe, ut ſententiam ſuam vix potuerit mutare, adeoque de itinere quidem ſcoriae ad renes error excuſabilis eſt. Putredinem poterat ſcire omnibus etiam acidiffimis vegetabilibus contingere, ſola quiete, & calore humido.

*Pinguitudo*] In craſſis inteſtinis cellulosa fabrica evidentior eſt, & pinguitudine foeta uberiore, inter extimam, & muſcularem membranam. Verum ibi omentum deeſt, & majori etiam lubricatione indiget inteſtinum, cum muſculosae fibrae, nerveam tunicam

nicam ad dura scybala affricent, non sine doloris & excoriationis metu. Quare pollicis aliquando crassitie (7) ano adjacet pinguitudo, quae soluta a calore, in cavum Intestini transudet, faeces inungat, membranas intestini lubricet, ne adfrictio dolorem, inflammationem, ulcus, pariat. Inde macilentis frequentiores haemorrhoides (8), rariores obesius.

*Lenta*] Vulgo recepta est opinio, eo meliori quemque esse valetudine, quo crebrius alvum deponit, & quo solutiores faeces egerit, neque defunt, qui ex eo praejudicio, perpetuo alvum purgantibus medicamentis stimulando, naturam suam destruunt. Sed certum est, nisi adcedat aliqua ex morbo (9) peculiaris causa, officinam omnem concoctionis eo validiorem esse, quo faex

[7] De eo adipe dicit BOERHAAVIUS, qui inter Glutaeum majorem, & Coccygem adeo copiosus interfunditur, vicinus intestino Recto, & qui per tenuem musculum Levatorem potest transudare. Is non semel in feminis duarum unciarum crassitie visus est.

[8] Hispanis, & Italis, & macilentia familiaris & frequentes Haemorrhoides GULICH. p. 3. Sed HOFMANNVS laxi corporis, & molles, atque lautae vitae sedentarios homines frequentius huic morbo obnoxios esse observat, omnino respondente experientia. *Med. System.* V. c. IV.

[9] In febribus enim pene semper mala, & in sanis etiam febriculam facit sola alvus dura COAC. II. c. V. 5.

alvina durior, & figurata (10) magis, & levior est. Manifesto enim est indicio, omne id emulsum esse, quod utilis liquoris adfuit. Neque unquam debemus metuere, etiam post sex, & 12. dierum constipatam alvum, dum abdomen molle fuerit, & appetitus ciborum validus [10\*]. Liquidum vero excrementum indicium est debilitatis, & causa: Indicium, quod sibi permissus cibus non passus sit sufficientes vires vitae: Causa, quod magna pars chyli, una cum faecibus corpori pereat. Leviores autem sunt

[10] Alvum obstructam pro causa plerorumque morborum habet proprio libello *le medecin de soi meme*, neque fere recedit HOFMANNUS *Med. System. Physiolog.* p. 572. *Patholog.* p. 406. &c. „ quia nempe pu- „ trida lymphæ resorbta ex Intestino Re- „cto, adfusa sanguinem incendit. Sed dudum SANCTORIUS faeces consistentes (*de Ponder. XXX. de Exerc. & quiete XVIII.*) sanæ valetudinis, liquidas ægræ [*de Pond. XIV. XXI. Clv.*] signa esse pronunciavit, & CHEYNEUS, paucas & figuratas [licet non duras] optat *de sanit. ruenda* c. V. §. II. RUYSCHIUS certe firmissimus senex, semel in octiduo alvum deposuit SCHREIBER. *vit. RUYSCH.* p. 78. Conf. PRAECEPTOREM ad DCCCLXXXV. 7. SANCTOR. *de ponder. XCIII.* ●

[10\*] Homo fuit integrae valetudinis, cui quinta demum septimana alvus evacuabatur STALPART *van der WIEL observ.* 55. *Centur. I.*



sunt faeces solidae , quam quae liquidae egeruntur , quia aqua ponderosior [11] est pane , furfure &c. Faex dysentericorum in aquam emissa fundum petit. Et non aliud majus est naturae beneficium , quam alvus lenta , neque tumens [12] tamen. Signum est evidens , quod cibi perfecte adtenuentur , ut paucissima faex nascatur , chylus paretur plurimus , subsidio futurus sanguini , & omnibus humanis humoribus. Quo pertinet observatio SANCTORII [13] , Augeta perspiratione , minuuntur excretiones reliquae , inminuta augentur.

*Haemorrhoides*] Haec thesis paradoxa videtur [14] , quae tamen est verissima. Fe-

minis

[11] Liquida excrementa graviora SANCTORII *de ponder.* XXII. & cibi liquidi solis LXIV. Quod non repugnat experimentis HAMBERGERI *Elem. Phys.* 151. &c. is enim solida , sed aqua saturata fundum petere vidit.

[12] Hypochondriorum tumor cum alvo suppressa malus Coac. II. XI. 11.

[13] *De ponder.* §. 14. 26. &c.

[14] Nunc quidem , in Germania certe , desit paradoxa esse , postquam STAHLIUS inter solennes haemorrhagias , quibus Anima se a plethora liberat ; principem in adultis & senibus evacuationem fecit haemorrhoides , quas & vulgares esse adseruit , & succedaneas omnino mensium muliebrium , succedaneas etiam haemorrhagiae narium , praecipuas ventilationes venae Portarum , a quarum anomalia , & reten-



minis salutaris est ea sanguinis excretio, quae singulis mensibus fit per uterum, easque a plethora liberat, atque non subprimitur, quin gravibus incommodis eas adficiat. Nulla est ratio, quare similis excretio sanguinis, in viro sanguinis copia abundante, non eadem commoda praestet. Itali, Hispani, Lusitani, de haemorrhoidum fluxu, quando largior ipsis accidit, gratulantur amicis. Eadem haemorrhoides, si vel sistantur omnino, vel imminuantur etiam, pessimos capitis dolores [15], & multa mala pariunt. Et, si quidem juveni sanguine turgenti haemorrhagia narium prod-est, quid est, cur noceant haemorrhoides? An plus periculi in itinere sanguinis per guttur inferius? omnino est, quare recedamus a vulgari praejudicio. Dicendum vero est, qua de causa haemorrhoides contingant hominibus firma valetudine utentibus. Nempe iis scybala dura sunt (16), globosa, atque,

retentione, podagrici, & arthritici dolores oriantur, & multa in Mesenterio & hypochondriis mala. Vid. *Theor. Med.* p. 741. seq. & *Tract. de haemorrhoid.* Et STAHLIUM quidem pars magna Germaniae secuta est.

[15] Vide malorum inde orientium catalogum STAHL. *de haemorrh.* p. 91.

[16] Non recedit STAHLIUS. p. 744. &c. Et minime dubito, quin retentae diutius faeces alvinæ frequens sint causa haemorrhoidum in viris, qui rei publicae praesunt, ob acrem naturam faecum, resorb-

que, ex ea figura, repletia universam intestini caveam, neque ergo egeri possunt, absque magno conatu. Quare, quoties eos homines natura ad fellam citat, adprimit se validissime ad faeces Rectum intestinum, conprimuntur venae (17) per tunicas repentes, sanguis sistitur, & cum per liberiores arterias adfluat continuo, adgeritur copiosior, in eo, non minimo tempore, quo

tam lympham putrescentem, compressio-  
nem venarum Verum major, & princeps causa est sanguinis inpeditor motus per ramos Venae Portarum, ubi lentissima circulatio, maxime si accedat Plethora. vid. STAHL. ubique.

- [17] Quarum aliae *internae*, ultimi sunt rami venae Mesentericae inferioris [p. 304.] principes statarum haemorrhoidum causae, & solae cognitae veteribus [GALEN. in HIPPOCR. *Aphor.* VI. 11. 12. 21.] Et eae fiunt stagnante sanguine in trunco venae ipsius, conf. experimentum VESALII. III. p. 316. edit. LVGD. BAT. Quare scirrhus viscerum potenter inpediunt, exoptatae hypochondriacis, & repressae scirrhus vomitusque cruentos faciunt STAHL. de *haemorrh.* l. c. Aliae Venae Intestini Recti sunt, & ab Hypogastricae ramis vesicalibus, & imprimis ab insigni ramo *Haemorrhoidali externo*, qui extra pelvim a continuata Pudenda provenit WINSL. IV. 239. In iis Haemorrhoides *externae* quarum sedem primus distinxit VESALIUS l. c. succedaneae priorum, ob earum venarum anastomoses, vid. p. 303.

nititur homo in egestionem faecum duriorum. Dilatantur ergo venae, & cum elatere pene destituantur (cxxxiii.) etiam remota dilatante causa, manent dilatatae, nascitur varicis genus, quod *nodum* vocant. Is nodus, ejusque similes, augentur dissipato sanguine fluidiori, turgent sanguine crassiore, atque redeunte ea causa, ex qua nati sunt, ipsa nempe compressione, crepant, atque sanguinem effundunt atrum & crassum, quem fluxum sanguinis vocent *Haemorrhoides fluentes*, cum prius, dum integri & duri varicosi nodi fuerint, *sicca* dicerentur haemorrhoides. Si crassae fuerint venarum membranae, siccae fere manent, cum magno tormine; si tenues, facilius rumpuntur. Sed & literati homines (18) frequentem experiuntur hunc morbum, ob alvum, quae ipsis lenta solet esse: inde dolor & magna mala in hominibus, quorum nervi aliunde a minimis causis facile perturbantur. Iis non aliud certius est levamen, quam ab olei mitissimi uncia, ante faecum (19) egestionem injecta ano, deinde ab usu horaeorum fructuum, & abstinentia cibi calidioris. In feminis vix unquam haemorrhoides, nisi proxime ante partum,

[18] Quibus corpus frequenter flexum, exercitium corporis justo infrequentius, ad stagnationem sanguinis summa dispositio.

[19] Et in primis feminis lini oleum expressum aut decoctum.

partum, quando uterus maximus venas ani comprimit.

*Urina*] Quia eadem vis respirationis, quae faeces alvinas exprimit, vesicam urget necessario. Vesicam vero inanientes, non ideo necessario alvum laxant, quod vesica possit evacuari minori nixu, quam is est, qui ad superandum sphincterem ani requiritur (20). Deinde aliquae fibrae levatoris ani ambeunt partem aliquam urethrae & Prostatarum, unde fit, ut ex Prostatis, quoties liquore suo plenissimae fuerint, saepe exprimant mucum tempore excretionis alvinae, quod in sanissimis hominibus contingit fieri, absque causa de gonorrhoea apud medicos saepe conquerentibus (20\*).

*Calculo*] (21) Quia cervix Vesicae incumbit Intestino Recto. Inde fit, ut calculus, innitens ei intestino, efficiat sensum praesentis & duri scybali.

*Stranguria*] Ob acrem materiam, quae ad valvulas Ani haerens erodit Intestinum Rectum, ut convulsum, secum (22) in similem

[20] Vesica propria vi contractilis membranae se evacuat, nulla saepe accedente mutatione respirationis. In globum exiguum contractam vidit WEPFER. *de cicut. aquat.* p. 180. & DRELINCOVRT. *Canic.* ll. p. 683.

[20\*] Confer DCLII.

[21] GROENEVELT. *dissert. litholog.* p. 30.  
GARENGEOT. *Oper. de Chir.* ll. & alii.

[22] Nexus Intestini Recti cum Vesica & Urethra




similem convulsionem Vesicam abripiat. Inde in Dysenteria frequens stranguria. Verum & ab obstructa alvo stranguria oritur, quod dura scybala, haerentia ad collum vesicae, eamdem, quam calculus, irritationem faciant.

*Tenesmus*] Vesica magna vi nitens, ut se exinaniat, conglobata incumbit ano, & efficit sensum duri scybali. Verum praeterea acris etiam urina irritat vesicam, & sollicitat ad egerendum, uti novimus fieri a recente cerevisia; Quam irritationem patitur per consensum proximum rectum Intestinum, cum inter urethram nascentem, & membranas recti Intestini pene nulla sit distantia.

*Liberum*] Pleraeque partes molles corporis humani ad ossa aliqua firmantur. Solus uterus & intestinum Rectum undique libera sunt. Id fit, ut utrumque possit quam amplissime dilatari. Quando sex & ultra dies alvus sicca fuit, tum vero aliquando ita congeruntur scybala in rectum Intestinum, ut totum in orbicularem saccum expandatur, neque possit clyisma infundi. Tum vero eximendum est instrumento aliquid scybalorum, deinde infundendum clyisma.

ME-

thra levis est, & cellulosus. Verum & vicinia sufficit, & communes nervi, & Acceleratores muscoli, atque LITTRIANA portio, omnes ex sphinctere in Urethram propagati. conf. DCLVII.



## MESENTERII ACTIO IN CHYLUM.

### §. CXIII.

*Laeteorum]* Quam primum particula chyli vasa lactea subiit, adest valvula, & separat eam particulam ab Intestinis, ne contra ea gravitet, atque porro chylus ope valvularum in vacuo Boyleano protrahitur.

*Laeteae]* Obliquam viam esse ex eo apparet, quod & aqua, & flatus (1) intestinis inmissi, nunquam sint visi in vasa lactea transiisse, tum quia neque tubuli (2) lacteorum, neque pori unquam conspicui facti sunt. Ab obliquitate fit, ut distenta intestina nihil in vasa lactea transmittant, sed contracta, & breviora facta, collapsa in rugas tunica villosa, chylum emittant, eoque tempore musculosae fibrae contractae sunt, & Chylus in fabrica villosa manet. Momento temporis proximo laxantur fibrae musculosae, tuncque chylus in lacteis fibras carneas perforantibus meat ad cellulosa, unde porro a nova succedente unda chyli pellitur in Mesenterium.

*Magnis]* Protinus supra Intestina, & in ipsa aliquando cellulosa fabrica intestinorum,  
Lactea

[1] CIII. not. 3.

[2] XCI. not. 9.

Lactea stylum admittunt, & conspicua fiunt (3), uti RUYSCHIUS (4) docuit, NUCKIUS pinxit (5).

*Mesenterium*] Non frequenter homines invenimus, qui recte teneant historiam Mesenterii (5†). Nempe Peritoneum succingit omnia vasa abdominalia, & tegit Aortam, venam Cavam, nervosque, neque ullum eorum vasorum liberum est ad abdominis partes. Ubi a lumbis vasa recedunt, aufert secum eorum quodlibet membranam Peritonei, neque perforat. Ea vasa sunt arteria Mesenterica superior, & inferior, & cisterna chyli, & venae cum Cava correspondentes RUYSCHIANAE. Praeterea mesenterium inter lamellas suas recipit venas lacteas & bibulas, & venae Portarum ramos, & eas ordinat.

*Solidior*] Omnia, quibus alimur, in chylum resoluta, globosam figuram induunt, sphaerulis tamen minoribus quam sanguinis globuli. Id in vino, cerevisia, farina, LEUWENHOECKIUS (6) observavit. Sed id omne, quod sphaericum est, potest subire oscula cylindrica vasorum Lacteorum, eo facilius,

(3) Conf. DUVERNOI *Act. Petropolit. Vol. I. T. II. f. I.*

(4) Pollicis distantia ab intestinis. *Advers. Anat. p. II.*

(5) *Adenograph. f. 9.*

(5†) Confer XCV.

(6) *Arcan. nat. contempl. Tom. II. p. 10. 11. 12.*  
Conf. BERGER. de nat. hum. p. 147.

facilius, quo minores globuli sunt, simulque densiores, in quos resolutum est, atque vi vitae compactum. Adtenuatione nempe & densitas augetur, & pori minuuntur. Et albus color densitatis, cum polita superficie conjunctae, index est.

*Ramosiore*] Manifestum est plumam, & lanam fluctuantem, nunquam (7) per angustum foramen transire, verum id unicum, quod superficie minori constat, & densitate debita praeditum nititur in aperturam clausi osculi.

### §. CXIV.

*Laedatur*] Vivimus fere omnibus generibus rerum; sed pleraque, si ad sanguinem transirent, venena essent. Acidum, acre (1), durum, viscidum, rancidum, oleosum:

(7) Neque fibrā longā, etiam cylindricā. Infiniti enim sunt casus, in quibus non directe respondet osculo, & in iis omnibus non resorbetur. conf. PITCARNE *de circul. sang. per vas. min.*

(1) Hellebori albi succus, si sagittis illinatur, praesentanea mors est feris etiam levi ictu vulneratis CRATO a CRAFTHEIM. *Epist. Med.* Lll. p. 226. per os vero adsumi potest extractum non minima dosi. Veneni viperarum exilissima guttula vulneri infusa subito funesta est, deglutiri vero potest ad drachmas integras RHEDI *de viper.* p. m. 166. Spiritus vini sanguinem coagulat, haustus non nisi longa con-



leosum : interim tamen his omnibus non laedimur.

*Fabricam*] Quae tenax est, robusta, membranea, & injuriis omnibus valide resistit, Coctio certe decem horarum (2) non dissolvit Intestina, neque canum avidissimi dentes, aut calidi stomachi digerunt. Farci-  
mina cocta in aqua fervida integra manent, nempe intestina, farta carnibus concisis. Summa est diversitas inter Intestinum, quod in chordas musicas elasticas, & sonoras parari potest, & hepar, quod prae mollitie sub digitis diffluit. Sed addi debet mucus inungens, diluens liquidum.

*Angustas*] Quae id solum transmittunt, quod vi vitae elaboratum est in globulos determinatae molis; omnis enim alia figura, si oblique obvertatur vasis lacteis, excludit se ipsam, & si acris sit, stimulat ad contractionem contractiles vasorum membranas.

*Sphincterulorum*] Nervi innumeri (3) & maxime sensiles ad Intestina veniunt, ab omni acrimonia facillime convellendi; si in universum constringendo totum Tubum Intestinorum resistunt admissioni, & ipsa vascula lactea videntur coarctare, quod officium ARCHAEO suo tribuit HELMONTIUS, &

consuetudine nocet. Adeps familiaris cibus est, sebum venis injectum cito necat  
DRELINCOURT *Canicid.* VI.

[2] Conf. XCV. *not.* 27. 28.

[3] Conf. XCII. *not.* 10. & RUYSCH. *Advers. Anat.* II. n. 4.

& arteriolas Mesentericas ultimas constringendo emulgere, ut acri cibo mollem aquulam interfundant. Si mica salis in pulmonem delapsa fuerit, tussis oritur inconspicibilis. Si ad cerebrum acre aliquid perveniat, mirae passiones oriuntur. In lingua humana gratum acidi saporis sensum vinum excitat, idem in oculos illapsum irritationem facit, quam adfluentes demum lacrumae solantur. Cutis universa a frigore exasperatur in tubercula plurima, constrictis sphincterulis, excludentibus aërem & continentibus liquorem, qui in calido aëre exspirat. Ita in intestinis est. Venena non penetrant in vasa lactea, sed cum chylo exturbantur, constrictis iis sphincterulis, & oborta convulsione, qua causa irritationis expellitur.

### §. CXV.

*Duplicatum*] Vasa Lactea solam tunicam muscularem perforant, extimam minime, & per cellulosa[m] tunicam repunt (1), ex communi lege omnium vasorum; quare nactae cellulosa[m] fabricam Mesenterii, per eam feruntur, defensa, & inuncta.

*Inpellunt*] Videtur prima vis, Chylum in vasa Lactea exprimens, desinere, ubi ea vasa muscularem tunicam perforant, novo impulsu sequente eundem chylum, promoveri ulterius ab unda posteriore, dum interim valvulae reditum inpediunt.

*Con-*

[1] XCII. p. 305. & XCIV.

*Conjugatis*] Quae (2<sup>a</sup>) chylum retrocessurum, ob difficultatem ascendentis itineris, sustinent, & cavent, ne relabatur per eadem spacia, quae emensus est. Sunt vero eae valvulae adeo & crebrae, & robustae, ut mercurius vivus vasis Lacteis injectus, nunquam potuerit eam resistantiam superare, aut viam sibi facere in cavitatem Intestinarum, neque flatus per ductum Thoracicum impulsus viam ad Intestina relegere. Deinde impediunt, ne chylus anterior obicis loco sit chylo posteriori: & si decem fuerint valvulae, non nisi per singulas sola

[2] Valvulae in Vasis Lacteis non facillime demonstrantur, neque nodosa sunt, sed venis semiplenis simillima. Ipse tamen ASELIIUS recte cognitas habuit, conf. *de Lact.* c. XII. XXV. & t. I. sub. L. Reliqui scriptores fere una voce admiserunt, negavit BILSIUS, experimentis confirmavit RUYSCHIIUS *de Valvulis Lymphat. postscr.* c. II. p. 9. & *Advers. Anat.* II. 4. & depinxit ex equo f. III. IV. ita tamen ut DRELINCOURTIUS ipse & frequentes esse, atque vix trium linearum intervallis distinctas, egregie restetur. *Canicid.* XI. 7. Sunt vero, uti in Lymphaticis vasis, duplices, & conjugatae, semilunares, ortae ex parte vasculi respiciente Intestinum, productae versus Receptaculum. Hinc cedentes Chylo cuncti viam naturalem, resistunt remeanti. Neque lac, neque chylus, neque mercurius inversum id iter superare unquam visus est: neque ligata vasa Chylum sinunt relabi, sed sustinent, & turgent, more Lymphaticorum, conf. DRELINCOURT. *Canic.* XI. XII. XIII.

losa diaphragmata, chylus posterior decimam tantum partem resistantiae invenit, & decimam tantum partem chyli prioris sustinet. Deinde evacuata cellula quaelibet, inter duo valvularum paria intercepta, **BOYLEANUM** facit vacuum, in quod unda chyli proxima absque ullo renixu sequitur. Atque hac nota facile adgnosimus, nihil a lymphaticis vasis lactea differre. Eas **BILSIO** refraganti juvenis demonstravit **RUYSCHIVS**; (2\*) **BILSIUS** enim medicinae inperitus, in vivorum vero Anatome eximie exercitatus, valvulas lacteorum vasorum nullas esse defenderat, & libere a cisterna ad intestina flatum pelli posse. **RUYSCHIVS** nactus equi recenter mortui vas lacteum duobus locis ligavit, inseruit chalybeum tubulum paratum a **MUSCHENBROECKIO**, nostri patruo, aërem admisit, exsiccavit, invertit, & duplicia haustula demonstravit.

## §. CXVI.

*Fluvium*] Inde fit mirabilis permixtio, *homogeneitas*, & adtenuatio humorum: Si nempe diversissimi humores, ea vi quae suffi-

[2\*] Totam historiam vide *de valv. Lymphat.*

[1] *Humano, in Text.*] Rara sunt utique experimenta, semel & mihi in homine uberissime vidisse contigit. Externa facies non diversa est ab iis, quae in brutis animalibus videram; non arcuata sunt, uti Vasa rubra, neque eorum ductum sequuntur, sed libera, peculiari fabrica in innumeras



sufficiat, ex uno vase in duo vasa secedant, denuoque redeant in vas unicum, praestitum est id, quod eos humores efficacissime miscet. Sed ea actio repetitur, oritur separatio altera ad proximi rami originem, & proxima huic succedit commistio, donec omnium una & simillima natura fiat. Quae non fierent, si vasa vel incederent parallela, vel unice, aut separarentur, aut confluerent. Sint nempe vasa duo in decussum conjuncta, communicabunt utique in puncto, &


meras areolas coeunt, ut bina in unum jungantur, id in duo denuo secedat, jungatur vicino, id recipiat, & ab eo recipiatur, (conf. DRELINCOURT. passim,) donec vel glandulas offendant (CXVII.), vel absque intermediis glandulis cum vasis secundi generis jungantur, uti & LEPROTTO l. c. & NUCKIO *Adenogr.* f. xxvii. & mihi visum est, & in Lymphaticis COWPERO *app. ad BIDE.* f. 14. Pauciora utique sunt & majora, quo longius ab Intestinis recedunt. Icones huc referri debent DUVERNOY l. c. HEISTERI *Compend. Anat.* T. II. f. 8. & exilior NUCKII *Adenogr.* f. IX. BOURDONI in *Tabb.* & apud BIDLOUM T. XXXIX. ejusdemque BIDLOI apud EVERTSE *Adenogr.* f. IX. de *Org. Chyli* T. I. tot. & VESLINGII *syntagm. Anat.* T. VIII. *post.* si quidem verus est titulus, qui ex foetu depictas adfirmat. Ad descriptiones addendus SANTORINUS *Obs. anat.* c. IX. 10. LEPROTTUS *Comm. Bonon.* p. 123. EULERUS de *Mesent.* XII. XIII. WINSLOW. IV. 210. seqq.

& miscela vix (2) ulla fiet, effluet liquor cujusvis vasis, per id vas, quod continuum est ei, per quod est advectus, & ruber liquor colorem, atque directionem tenebit, suamque coeruleus. Verum si iidem decussati tubi denuo conjungantur in aliquo puncto convergentibus brachiis, jam miscetur uterque liquor, oriturque color violaceus in toto tubo. Eadem ratione Chylus, qui a crassis Intestinis faeculentus advectus est, miscetur cum cremore florido tenuium Intestinatorum, & ex utroque dilutus atque similis chylus nascitur.

*Attenuatio*] Si quam vehementissime moveatur liquidum quodcunque, nihil certe mutabitur in ejus particulis, nisi aliquam resistantiam offendat, in quam impingentes massulae, a se invicem secedant. Sed id egregie fit in vasorum angulis. Namque si unicum vas in duo vasa secedat, impingent particulae in eminentem verticem anguli discessus, atque solventur. Sed eadem opera cavetur, ne Chylus aut coaguletur, aut in grumos coëat. Contactus mutuus particularum auget earum adtractionem, quietem facit. Si contactus perpetuo mutetur, divelluntur a mutuis vinculis particulae, neque concrescunt. Quare Chylus  
re-

[2] Dimidia fiet commistio, & media pars coerulei liquoris per rubrum vas, media per coeruleum effluet.

resectis abdominis musculis, desinit moveri  
(3).



## ACTIO GLANDULARUM MESARAICARUM.

### §. CXVII.

*Glandulas*] Primus eas, & optime, descripsit EUSTACHIUS (\*), ut vix RUYSCHIIUS melius cognovisse videatur, novo argumento, artem injiciendi, vel nostram, vel vicariam ali-

[3] Repugnat experimento. Ligata enim vasa Lactea aggesto Chylo turgescunt, non ligata cito exinaniuntur.

[4] *Primi, in Text.*] Distinctio, ni fallor, est WARTHONI vel GLISSONI (*de hepat. c. XXXV. p. 316.*) qui primi primum genus Vasorum Lacteorum dixerunt, quod ab Intestinis ad glandulas fertur, secundum quod a glandulis ad Receptaculum. Sed WINSLOWUS tertium genus addidit, quod inter glandulas duas medium est (IV. §. 216. 217.). Et omnino unum vas Lacteum visum est, non unam, sed duas, tres, pluresve ex ordine glandulas subiisse, ut injectus Mercurius, amissa omni velocitate stagnaret in glandulis, neque posset in Ductum Thoracicum urgeri.

[\*] Puto *depinxisse*, nam descriptionem non invenio.

aliquam, ei notam fuisse. In homine (1) absque ullo ordine per Mesenterium disperguntur, nisi quod vasorum sanguineorum divisioni ament adfidere, uti optime icone sua expressit EUSTACHIUS. Hae ipsae gland.

- [1] Descriptio GALENI *de usu part.* L. IV. c. XX. videtur desumpta ex brutis animalibus. VESALIUS minores substratas vasorum divisionibus, atque iis fulciendis destinatas agnovit (p. 504. ed. 1543.), sed in centro tamen Mesenterii unicam & magnam depinxit fig. XI. L. V. L. L. non sine aliqua obscuritate, num id corpus satis distinxerit a Pancreate, quod utique bene cognitum ipsi fuisse adparet ex p. 261. 497. *edit. ej.* EUSTACHIUS verissime eas proposuit T. X. f. II. T. XI. f. I. II. sparsas, & exiguas, & non ad tenuia tantum Intestina, Jejunum & Ileum, verum in ipso etiam, quam magnum est, Mesocolo ubique disseminatas, (EULER. l. c.) Sed ASELLIUS omnia turbavit, & *Pancreas* quidem dixit, congeriem glandularum mesentericarum, quae est in centro Mesenterii canini, (cont. f. I. & II. L. L.), verum autem *Pancreas* depinxit pro singulari corpore anonymo, quod soli canini proprium esset f. 2. Q. Veritatem restituit VESLINGIUS in *epist. posth.* p. 66. & WHARTHONO quidem (*adenogr.* p. 31. c. VII.) atque GLISSONIO (*de hep.* p. 440. 441.) hae glandulae optime notae fuerunt, & recentiorum plerisque. Conf. de earum fabrica exteriori, EULER. *de Mesenter.* XVI. WINSLOW. IV. 207. seqq.



glandulae in senio paulatim corrugantur (2), evanescunt, ut in vetulae Mesenterio repleto a RUYSCHIO, cum amico BOERHAAVIUS vix aliqua earum glandularum vestigia invenerit. Quae observatio RUYSCHII non his solum, sed & Mammarum glandulis, & Thymo, aliisque communis est; causa vero obscura est. Mollissimae sunt, ut fere digitorum adritu destrui possint. In plerisque brutis animalibus non sparsae per mesenterium, sed in unam glandulam collectae sunt, quae ad lumbos, in ipso centro Mesenterii adest. Eam ASELLIUS ob aliquam cum vero Pancreate similitudinem, dixit *Pancreas*, & reliqui addiderunt huic voci nomen primi descriptoris ASELLII (3). Quare bruta animalia non nisi unius generis lactea vasa habent, & partes mesenterio vicinas ab humanis diversissimas.

*In-*

[2] *Advers. Anat.* III. 7. Verissima observatio, & quae de plerisque glandulis vera est, de conglobatis omnibus, & inter conglomeratas, de Thymo, Capsula Renali, glandula Thyroidea, Mammis &c. Neque exiliores solum fiunt, sed quae rubellae fuerant, succi plenae, & cremorem quemdam expressae dederant, WHARTON. *Adenogr.* p. 50.), cae per aetatem nigrae fiunt, exsuccae, omnino uti glandulae conglobatae Pericardii, asperae Arteriae, juguli &c.

[3] In quibus non una adeo glandula est, quam plures, sed congestae & valde vicinae. In Cane (ASELL. ubique) Phoca (SCHELLHAMMER. *EPH. NAT. CUR.* Dec. III.

Nn *Ann.*

*Intrant*] Id demonstrat pulcherrima observatio NUCKII (4) in corpore rustici per epulas occisi, ad cognoscendam naturam vulneris ex iussu magistratus publice dissecti. Namque in eo corpore mercurius vasis lacteis primi generis injectus, subiit glandulas mesenterii, & replevit, non uno, sed multis canalibus: deinde per unum & majorem ductum ex parte opposita exiit. Nemo ante NUCKIUM hanc fabricam cognoverat, ab eo omnes admiserunt.

*Velant*] Nempe non omnes venae Lacteae subeunt glandulas, verum aliae glandulam aliquam coronantes, supervehuntur non admissae (5). Sed & eae alias glandulas offendunt, quas subeant. Quae vero vasa glandulas ingressa sunt, non pereunt, sed accurate renascuntur ex opposita parte glandulae, quam subierunt.

§. CXVIII.

*Ann. VII. VIII. p. 21.*) Chamaeleonte PARISIN. *Diff. de anim.* p. 42. Echino BLAS. *Anat. Anim.* p. 65. Fele Zibethina DRELINCOURT. apud BLAS. 76. Leone PARISIN. p. 6. ed. BAT. Lynce, *lid.* p. 127. Humanae vero fabricae similes & sparsae in simia DRELINCOURT, ap. BLAS. p. 110. & Rangifero STENON. *Act. Hafn.* 1671.

[4] *Adenogr.* p. 21. 22. 32. 33. Id ipsum experimentum in asini glandula Mesocolica atramento instituit MALPIGHIVS de *struct. gland. conglob.* p. 5. & in homine opere mercurii RUYSCHIUS ad BOERHAAV. de *fabr. Gland.* p. 65. BIDLOO apud EVERTSE de *Organ. chyl.* & Ill. ALBINUS anno 1726.

[5] V. not. I. CXVI.

## §. CXVIII.

*Dilui*] Crediderunt aliqui (1), clarique viri, resorberi aliquid subtilissimæ partis chyli in his glandulis, reliquum adire vasa lactea secundi generis. Verum si quidem aliquid de chylo in iis glandulis separatur, id aut tenuius erit chylo, aut crassius. Si tenuius est, relinquet crassio rem chylum, quod est contra experimenta (2), quae testantur chylum in vasis lacteis secundi generis dilutionem esse. Si crassius, tunc egebit vasis, quam lymphatica, crassioribus; sed ea necesse est, ut subjicerentur oculis nostris.

## §. CXIX.

*Cavernosas*] Multum de fabrica harum glandularum disputatum est. NUCKIUS non nisi reticularem aliquam texturam admittit, coërcitam membrana communi.

MAL-

- [1] Crassio rem humorem inde secerni BOHN: *progymnasm.* XII. Subtilissimum, & qui in nervos resorbeatur pro nutritione WHARTON. *Adenogr.* c. X. p. 43. GLISSON. *de hep.* p. 440. 441.
- [2] Qui lactis similis glandulas subiit, exit lymphæ similior & pellucens RUYSCH. *Advers. Anat.* III. 7. ad BOERH. *de gland. fabr.* p. 65. MUSGRAVE *Phil. Trans.* p. 275. & MOTTE *abridgm.* II. p. 71. LEPROTT. *comm.* Bononi 23.

- [1] *Muscosas* a cellulosa fabrica vocat *Adenogr.* c. II. p. 36. 37. &c. f. XIII. XIV.

MALPIGHIIUS (2), praeter membranam externam fibrosam, robustamque, & ex ea membrana propagatas fibras reticulares, folliculos etiam proponit in areolis fabricae reticularis positos, quos arteriae coronent, per propriam eorum membranam distributae: hos folliculos existimat recipere proprium liquorem, quem adservatum, emittant per vasa sua excretoria, quae, in his mesentericis glandulis, sunt lactea vasa secundi generis. RUYSCHIIUS in ultimis observationibus docet, quod glandulas Mesaraicas arteriolae innumerae adeant, in iis in minutissimos ramulos distribuuntur, &, ultima divisione, desinant in pulposos acinos (3), quos & ipsos vasculosos esse existimat. Videntur utique sententiae MALPIGHII & RUYSCHII si-

[2] De *struct. gland. conglob.* p. 4. Primam membranam vasculosam, alteram carneam fibris circularibus, deinde ex hac ortas fibras reticulares, in quarum areolis singuli folliculi, figurae ad rotundam accedentis, tenui membrana facti, liquorem continentes. Eos folliculos, in morbofis glandulis primum visos, perpetuo ordine, ultimo etiam in sanis vidit. Sed nihil praeter fabricam reticularem NUCKII visum est GMELINO nostro *diff. de gland. Mesenter.* neque cuiquam aliorum anatomicorum. Conf. CCXLII.

[3] *Thes.* X. n. LXI. & apertius *Epist. ad BOERH.* p. 64. & *icon.* BB. & haec ipsa est BOERHAAVII observatio, facta in glandulis RUYSCHIANA arte praeparatis. *Epist. ad RUYSCHIIUM* p. 79.



bi non repugnare, multa tamen subesse, quae alta haecenus tegantur caligine (4). Id vero extra dubium positum videtur, quod arteriae Mesentericae, vel in glandulas ultimas, vel in vasculosos acinos aliquid deponant, quod chylo admisceatur. Neque enim videtur alia ratio esse, quare adeo numerosa vasa ad exiguas glandulas ferantur; & manifesto id videtur confirmare experimento COWPERI, quo constat, liberum iter ex Mesentericis arteriis in ipsa vasa Lactea esse (5). Sed & *venae* adcedunt, singulares, nuper detectae a RUYSCHIO, delineatae in rarissimo illo cimelio Anatomico, tabula nempe aenea, quam addidit optimus senex epistolae ad BOERHAAVIUM (6) scriptae. Eae venae has mesenterii glandulas subeunt, & videntur referre eam sanguinis rubri partem, quae a nutritione est superflua.

### §. CXX.

*Conquassatio*] Ope tunicae fibrosae externae contractilis CXIX. not. 2., ope arteria-

[4] Conf. WINSLOW. IV. 208. 209. qui ab injectione mutari fabricam harum glandularum monet, neque quidquam adhuc posse pronunciari.

[5] Mercurium nempe arteriis Mesentericis impulsum redire per lactea. COWPER. ad BIDDLE. T. XXXIX. f. 1. & DRAKE. conf. VIEUSSEN. *nov. vasor. syst.* p. 235.

[6] Nihil omnino de iis venis in icone RUYSCHII: de ipsis vasis vero conf. ad §. LXXXXII.

riarum, earumque diaстоles, ope pressiois externae. Quam unicam utilitatem NUCKIUS (1) glandulis Mesenterii reliquit.

*Spirituum*] Nervi copiosissimi Mesenterium peragrant (2); Verum nullus sensus hic peragitur, imo vero vix vulgaris tactus hic adest. Motus vero muscularis omnino nullus est. Sed integer plexus Solaris, totius Abdominis princeps, in Mesenterio a WILLISIO (3) descriptus, medius exstat, & per universum Mesenterium latissime spargitur. An non liceat suspicari, Nervos, qui glandulas adeunt, ultimis osculis humorem exspuere, qui chylo mistus eum diluat, reddat mobiliorem, magis humanum. Non videtur absque ratione haec esse suspicio.

### §. CXXI.

*Unita*] Et minus ramosa, valvulis vero etiam copiosius instructa. Cum enim vis intestinorum chylum pellens hic desit, debent augeri causae, retrocessionem impedientes.

*Cisternam*] (1) Quae est collectio vasorum Lacteorum in canales majores, tres, quae-

[1] p. 46.

[2] Conf XCII. not. 10.

[3] Neurolog. T. XI. O.

[1] Primus in cane descriptor PECQUETUS cisternam unicam, & conicam depinxit, quae Vasa Lymphatica innumera recipe-  
ret. *Experim. nov.* C. IV. p. 10. c. V. p. 14. nisi priorem laudem mereatur RUD-  
BECK.

BECK. qui eamdem anno 1650. vidit *de vas. hepat. aquos.* C. III. p. 277. non doctus a PECQUETO (BOURDELOT. ad BARTHOL. *Cent. II. Epist. XXI.*) Sed & BARTHOLINUS in cane cisternam vidit, fecutus PECQUETUM *Centur. II. Epist. 13.* Primus in homine receptaculum conspexit a. 1654 RUDBECKIUS, atque van HORNIO demonstravit, [WORM. ad BARTHOL. *Cent. II. Epist. 36.* quam historiam van HORNE propria dissertatione descripsit]: deinde SYLVIUS *de le BOE* vide BORRICH. ad BARTHOL. *Cent. IV, Ep. LI.* Sed circa id tempus etiam le NOBLE longissimum receptaculum vidit in homine *de Ven. lact. Mes. & Thor.* vid. BARTHOL. *de vas. Lymph. spicil. sec. p. 484. & 490.* Deinde in brutis animalibus omnibus innotuit, ut LOWERO *de corde c. V. p. 226.* aliisque in vitulo, ove, cane, lupo, Catopardo, Phoca, porco, cervo; Paucis in homine ut PERRALTO *Oeuvr. ed. LUGD. BAT. Tom. I. p. 127. & T. I. SCHRADERO, a. 1669. Dec. I. Observ. VII. DIEMERBROECKIO Anat. corp. hum. I. l. c. XII. p. 49. ZELERO de admin. vas. Lymph. p. 3. & post magnum intervallum BIDLOO apud EVERTSE T. II. f. I. & COWPERO app. ad BIDLOO T. IV. f. XI. & X quae eadem est DRAKII Anthropol. nov. L. I. c. X. p. 57. & WALTHERO vid. Observ. anat. tres. &c.* Cumque jam increbesceret ductus Thoracici cognitio, opera HENNINGERI & SALZMANNI, observationibus conpertum est, in homine,, alias veram esse cisternam, receptaculum oblon-

gum, simplex, multo & Thoracico ductu & vasis lacteis latius, quae sunt observationes SALZMANNI *nov. Encheir.* Ic. I. & §. IV. & p. 38. HEISTERI *compend. Anat.* not. XV. DIEMERBROECKII. PERRAVLT, HALE *Phil. Trans.* 364. f. 12. & 14. ZELLERI l. c. SCHEID. apud SALZM. p. 26. MONROI apud CHESELD. c. VI. & peculiari tractatu of *the lact.* NVCK. *Adenogr.* T. XXXII. ALBINI in icone CANTII, NICOLAI *Comm. lit.* 1732. n. XXXIII. CANTII *Inpet. Anat.* V. VI. WINSLOWI pro exemplari IV. 222. GARENGEOTI *Splanchnol.* T. XVII. & in meis experimentis frequentiores; cujus loco aliquando gracilis tantum ductus minime dilatatus adest SALZMAN p. 35. EVERTSE l. c. ad quas observationes refero RUYSCHII sententiam, qui cisternam in homine negat reperiri *Adv.* II. p. 11. & concordem SANTORINI *Obs. Anat.* p. 171. & ipsam etiam HENNINGERI tabulam quam MORGAGNUS probat *Adv.* III. *anim.* XVII. Alias modicae latitudinis sacculus duobus aut tribus vasis lymphaticis aut lacteis componitur, quae modo conjunguntur in unam multilocularem ampullam, quae sunt experimenta COWPERI l. c. BIANCHI *ad hist. hepatis.* T. III. le NOBLE apud BARTH. *Spicil. Lymph.* *Secund.* p. 484. WINSLOW IV. 222. in alia observatione. Modo separata & distincta manent, ut habet ALBINUS apud PALFYN. *Anat. Chirurg.* Pl. VIII. f. 6. & aliquando HEISTER. & DIEMERBROECK. ad quas observationes etiam refero cisternas duplices, WIJUM. in *Aff. Eruditor.* 1718. p. 9. seqq. T. I. f. 2. & cita-



quatuor, ut demonstravit ARENT CANT, qui primus bonam cisternae descriptionem dedit, aut unum quandoque; Id enim varium est pro diverso numero vasorum magnorum, quae modo plura, modo pauciora ad cisternam conveniunt. Glandulae BARTHOLINI (2) vero sunt glomeres innumerabilium vasorum Lymphaticorum.

[Lympha]

citata Fr. SYLVII. & MURALTII *Exerc. Med. Observ. & exp. misc.* p. 9. & ter omnino DUVERNOI *act. Petropolit.* Vol. I. conf. T. XII. f. 3. atque SALZMAN. apud eumd. p. 281. QUEITSCH. *Select. Francof.* p. 164. Et simplex quidem, quale nos vidimus receptaculum, fere pone appendicem dextram septi transversae latet, ad dexteriores arteria Aortae, ita constanter & magno consensu anatomicorum, ut mirer a SALZMANNO sinistro lateri vertebrarum adscribi, mirer etiam a GARENGETO adeo longe in thoracem protrahi. *Splanchnol.* T. XVII. Membrana valens est, liquor plerumque rubella lymphae, rarius chylus.

- [2] BARTHOLINUS (*de lact. Thoracici*, & alibi) in homine non cisternam vidit, sed glandulas lumbales, veras conglobatas & Lymphaticas, & earum vasa Lymphatica, radices non minimas ductus Thoracici, quae revera omnia existant in homine vid. §. CXX. sed non sola, neque excludunt receptaculum, ut festinus admiserat BARTHOLINUS, quem secuti sunt BOURDON *Anat.* p. 360. & alii.

*Lympha*] (3) omnium (4) fere viscerum  
abdo-

[3] *Vasa lactea secundi generis GLISSONII* ex centro Mesenterii subeunt cisternam sinistrorsum adscendendo cum arteria Mesenterica. Eorum aliquando unicus truncus est, quae observatio ZELLERO *de admin. vas. Lymph.* p. 3. & SANTORINO visa est, neque nuperrima nostra recedit, alias duo, tria, quatuor, quinque, quae longe frequentior est observatio RUDBECKII *de vas. serof.* f. VI. XI. &c. STENONIS *Act. Hafn.* II. 97. f. 1. RUYSCHII *de vas. Lymphat.* t. 3. EVERTSE *T.* II. f. 1. COWPERI app. ad BIDLOO f. XI. HENNINGERI l. c. a. a. a. SALZMANNI p. 32. & f. 1. WIUM l. c. p. 11. CANTII l. c. WINSLOWI 271. cui sunt tertii generis, WALTHERI *Observ. Anat. tres.* Aliquando longe plura sunt, qualia habet PECQUETUS in utraque icone, van HORNE *de duct. Chylif.* p. 281. ed. LIPS. HALE l. c. f. 12. n. 20. SALZMAN. apud DUVERNOI l. c. p. 283. Quocunque numero sint, chylum certe limpidiorem vehunt, CXVIII. not. 2. & frequentiores habent valvulas (RUYSCH. *de valv. lymph.* p. 10. ) & tenuiora sunt RUYSCH. *advers.* II. n. 7. similia Lymphaticis vas.

[4] *Vasa Lymphatica* visa ASELLIO ad hepar, & habita pro lacteis vas, *de lact. tab.* III. IV. visa saepissime VESLINGIO cum eodem errore *Epist. Posthum.* passim, anno 1648. v. *Epist.* VIII. deinde FOLIO *de nov. sang. via,* & HIGHMORO *disquisit. anat.*

abdominis , & artuum inferiorum , quae  
quidem

*anat.* T. III. p. 41. aliisque, & ipsi BARTHOLINO *de Lact. Thorac.* c. IV. p. 50. & VI. p. 66. & XII. & *Cent.* II. Ep. XIX. Primum pro novo genere vasorum proposita sunt ab eodem BARTHOLINO, in variis scriptis & proprio libello *de Vasc. Lymphat.* qui 1653. prodiit, ita, ut JOLIVIO quidem ea gloria a GLISSONIO *de hepat.* & c. XXXI. & WHARTONO *aden.* c. XV. p. 93. adtributa, nihil BARTHOLINO demat, neque SCHNEIDERI assertio, qui quindecim annis ante BARTHOLINUM ea se vidisse contendit *de catarrh. L. I. specialiss.* p. 523. neque SYLVII, qui anno 1643. vasa flavo liquore plena se vidisse adfirmat *de bile & hepat.* §. XI. p. 26. neque liqueat satis, num RUDBECKIUS, cui tribuit inventionem HORNE. p. 75., famam novi inventi hauserit a BARTHOLINO. Certe brevis in ea doctrina fuit inventor, uberior RUDBECKIUS, *de vasc. hepat. aquos.* post quem STENONIS *Act. Hafniens. Ann.* II. *Obs.* XCVII. & RVYSCHIVS *de valv. Lymphat.* & NUCKIUS in *Adenogr.* ubique, & ZELLER, & HALE in eorum historia fuerunt feliciores, ita tamen, ut passim hiulca sit descriptio, & integra Angiologia Lymphatica humana sit in desideratis. Et Lymphatica quidem abdominis ab Hepate, ubi plurima sunt, dicta veteribus, BARTHOLINO *lc. lymphat.* p. 204. apud HEMSTERHVSIVM & c. II. III. & BIANCHO *hist. hepat.* T. III.

&

quidem non exigua est quantitas. Namque  
 si

& SWAMMERDAMIO ap. BLAS. in  
 VESLING. p. 554. & RUDBECKIO  
 T. I. & GLISSONIO. c. 31. &c., &  
 FERREN *Hist. de l' Acad. des scienc.* 1733.  
 p. 53. uno ductu, ut ZELLERO visum,  
 p. 3. aut pluribus, ut DIEMERBROE-  
 CKIO p. 59. RUYSCHIO l. c. NUCKIO  
 p. 144. REVENHORSTIO l. c. ex cava sede  
 hepatis, intermediis propriis glandulis con-  
 globatis perpetuis, RUDBECKII p. 269.  
 T. I. RUYSCH. l. c. f. 2. & BIANCHI.  
 NUCK. l. c. REVENHORST. p. 16.  
 MALPIGHII *de gland. conglob.* aliis junguntur  
 ex convexa parte, NUCK. p. 144. RU-  
 YSCH. Ep. V. T. 6. WINSLOW. IV.  
 599. REVENHORST. *de mot. bil.* T. I.  
 BIANCHI *hist. hep.* T. I. Utraque se ad-  
 miscent vasis lacteis secundi generis RUD-  
 BECK. p. 270. BRUNNER. *de Duod.* c.  
 VII. SWAMMERDAM. apud STENONIS  
*Aët. Hafn.* ll. *Obs.* 97. f. 1. & lymphaticis  
 lumborum, modo dicendis, BIANCH.  
 L. I. p. 21. & receptaculo, ut RUDBE-  
 CKIO visum. c. 11. & T. I. & BIANCHO.  
 cum sociis ramis a Vesicula fellea, dictis  
 BARTHOLINO, *de Vaf. Lymphat.* c. 111.  
 RUDBECKIO Tab. I. KERKRINGIO  
*Obs.* V. BIANCHO l. c. quae NUCKIUS  
 p. 145. hepati adscribit, & REVEN-  
 HORST. §. 21. T. 11. f. 4. Ex Ventri-  
 culo, dicta LXXXVII. *not.* 32. & RUD-  
 BECK. fig. post V. & PEYERO *de rumin.*  
 p. 83. NUCKIO p. 144. Ex Liene  
 pauca, sed visa tamen NUCKIO p. 52. &  
 145.



fi quolibet pulsu ex Corde expellantur sanguinis

145. RUDBECKIO. f. VI. MALFIGHIO p. 291. & de *conglob.* p. 7. BARTHOLINO de *Diaphr.* p. 91. & uberius RUYSCHIO. l. c. p. 12. & f. 6. tum MORGAGNO *Adv. Anat.* ll. §. 47. Ex Renibus multa, (uberrime NUCK. T. XXXII. XXXIV. & c. 6.) trans Venam Cavam ad glandulas Lumbares confluunt, ut per ea Ductum Thoracicum investigandum proponat SALZMANNUS c. III. (quod etiam in tenero infante non difficillimum est,) & in homine etiam magna sint atque conspicua. Sed ad easdem glandulas, interjectas Aortae & Venae Cavae COWPER. app. ad BIDL. f. 10. QQ. vel adjacentes WIUM. aaa. COWPER. l. c. R. ic. XII. mm. DUVERNOI. *At. Petrop.* I. uberrima etiam alia Vasa Lymphatica confluunt a pene COWPER. *myot. reform.* T. X. LL. a testibus RUDBECK. f. VII. BARTHOLIN Cent. III. *Epist.* I. CAMERAR. *Eph. nat. cur.* Dec. II. *Ann.* VII. *Obs.* 228. p. 432. CHESELDEN. IV. c. I. KOHLHANS *diff. propr. Regiom.* NUCK. p. 53. & 147. a vesiculis seminalibus HOFMAN. *Med. Syst.* I. p. 238. a Vesica ZELLER. ab Utero brutorum RUDBECK. f. 7. VERHEYEN. L. II. Tr. I. c. 22. NEEDHAM. de *form. foet.* c. I. NUCK. f. XXXIII. HARTMAN. E. N. C. Dec. III. *Ann.* I. *Obs.* 152. [in ave], & humano MORGAGNO. IV. p. 78.; ab ovario NUCK. l. c. T. V. p. 70. a Mesocolo & vicinia Intestini Recti,

Rvñ-

guinis unciae duae, & fit lymphæ nonnisi  
decima

RUDBECK. c. VI. & p. 302. NUCK. p. 129. 130. MALPIGH. SCHELHAMMER. E. N. C. Dec. III. Ann. III. Obs. XCII. a Peritoneo, NUCK. p. 58. 99. DUVERNOY. l. c. C. C. a medulla spinali MARCHETT. & GALEAC. apud BIANCH. p. 908. [conf. in thorace SALZMAN. in Diff. III. & apud DUVERNOY p. 281.] a musculis abdominis & lumborum, RUDBECK. T. II. hhh. & f. IX. p. 301. NUCK. p. 99. T. XXXI. R. R. ab artubus inferioribus BARTHOLIN. *Vas. Lymph. in hom.* p. 180. 181. DUVERNOY l. c. a. b. c. ipsisque digitis pedum NUCK. p. 148. STENONIS l. c. Et ea quidem quæ ex pedibus adscendunt glandulas inguinales adeunt uberrima RUDBECK. l. c. T. II & f. IX. p. 301. MOINICHEN *Epist.* BARTH. 39. & 70. Cent. II. DUVERNOY. l. c. 22. MALPIGH. *de gland. congl.* MORG. *Adv. Anat.* II. §. XLVII. ut etiam ibi pulcherrime repleverit Ductum Thoracicum DUVERNOY, conf. COWPER. l. c. f. f. quæ methodus in cadavere, huic uni usui destinato omnium est elegantissima. Atque ea vasa Lymphatica omnia, quæ glandulas lumbales subierunt, uno ductu, ut ZELLERO visum p. 3. & nuper mihi, aut pluribus, ut DUVERNOY l. c. & WALTHER. l. c. SS. adscendunt, atque originem veram receptaculi faciunt, ut non inperite BARTHOLINO glandulæ Lumbales habitæ sint pro origine ductus Thoracici, licet veritatem non omnem viderit. Adeo variis

decima sexta (5) pars totius massae sanguineae; facile adparet, intra unam horam 7200 uncias sanguinis per cor fluxuras, lym-

variis ex visceribus, ad unam cisternam convehitur, adfunditur chylo Lympha interior, exiguis vasis exceptis, quae solitaria inferuntur venis emulgentibus PERRAVLT. *nouv. Inf.* p. 133. T. I. A. D. E. & hypogastricae venae WEPFER. *dub. anatom.* p. 100. & Cavae conf. NEEDHAM. l. c. p. 10. CONRING. apud BARTH. *Epist.* ll. 14. STENON. *de gland. oris.* p. 39. 40. MAUROCORDATUS apud BARTH. *desper. hep. caus.* T. II. WALAEUS *de Mot. Chyl.* p. LXVIII. apud SPIGELIUM, DUVERNEY apud ZELLERUM & ipse ZELLERUS. p. 5. praeter ea vasa, quae adeo multa axillaribus inserta demonstrata sunt a STENONIS, *de Musc. & Gland.* p. 40. 41. & alibi, & a Cl. HALE l. c. Avibus atque amphibis non deesse adparet experimento HARTMANNI jam dicto & KVLMSI *Ephem. Nat. Cur.* 1727. p. 21. Imo vero, si fides experimento, in orbe pisce BARTHOLINO visa sunt.

[5] Siquidem ductus Thoracicus est Vena Cava omnium liquidorum, quae sanguine tenuiora sunt, [CXXIX.] erit utique eadem ratio Lymphae per eum ductum fluentis ad massam sanguinis, quae est feri flavi ad rubram massam. Sed ea ratio multo est major ea, quam proponit PRAECEPTOR, aequalis, aut paulo minor BOYLE *appar. ad hist. sang.* p. 54. *seqq.*

lymphae vero uncias quadringentas quinquaginta, five libras plus quam triginta septem. Sed ea quantitas major est, quam omnium aliorum liquidorum, quae eam in sedem confluunt. Unde maxima dilutio & in naturam nostram mutatio. Lymphatica vero ea vasa praecipue describit NUCKIUS, cujus certe tabulae injuria profectiis habentur (6). Omnia enim lymphatica vasa per ligneos asseres disposita, centies vidit BOERHAAVIUS. Solebat peritissimus Artifex quaerere aliquod vas Lymphaticum minimum, punctim insigebat tubulum ferreum, per eum infundebat mercurium, ita in fixam naturam coactum admisto stanno vel plumbo, ut consisteret. Ea ratione composuerat integram historiam vasorum Lymphaticorum, eamque cum ipsis praeparatis partibus conservabat, inmensum opus, cujus specimen est pulcherrima illa *Adenographia*, & nihilo inpeditiis demonstrabat angiologiam Lymphaticam, quam alii Anatomici rubram solent exhibere. Sed Clarissimum Virum, non sine maximo damno rei Anatomicae, mors immatura eripuit.

## §. CXXII.

- [6] HEISTER. *Compend. Anat. not.* VI. p. 65. Et revera Cordis icon f. XLI. ex bruto videtur, sed Utero humano neque adpinxit Vasa NUCKIUS f. XXXI. neque adscripsit, p. 74. ut censuram Cl. HEISTERI non mereatur.



## §. CXXII.

*Valvulae*] (1) Quae transitum chyli, aquae (2), & mercurii a cisterna ad partes in-

[1] Vasa Lymphatica aliquando geniculata apparent, plerumque plana, tenuia, vel albicantia, vel rubra, vel flaventia, undulata quasi, ut valvulas potius suspiceris, quam demonstrares. Figurae autem plerorumque scriptorum nodosa faciunt, vel vitio repletionis, quae Mercurio fit, ut CHESELDENIO visum, L. III. c. X. vel ex rario-ri observatione. Et BARTHOLINUS quidem valvulas Lymphaticorum sola suspitione attigit de *vaj. Lymph* p. 215. & c. V. &c. *Rudbeckius*, & vidit, & naturalem habitum ubique exhibuit. Cumque *Bilsius*, in *Epist. Dissert.* p. 22. non absque sectatoribus contenderet, Lympham ex Labyrintho (cxxxiv.) deorsum ad viscera defluere, experimentis variis eum impugnaverunt *Leidenfes* Anatomici, donec *Ruy-schius de Valv. Lymphat.* p. 1. &c. & *Savamerdamius* apud *Blas.* in app. ad *Vesl.* p. 550. T. xxiv f. 1, 2, 3. evidentissime demonstrarent, duplices esse, & conjugatas, & semilunares valvulas, frequentes, in exsiccato etiam vase Lymphatico facile conservandas, quibus motus Lymphae ab omni corporis humani parte determinetur ad Receptaculum & Thoracicum ductum. Iconem ad lentem dedit *Nuck* f. 22, 23.

(2) Aliquando tamen, ut tenerae sunt, a flatu, lacte, vel aqua superantur. Vasa Lym-  
pha-

inferiores remorantur, admittunt eadem facillime ab omnibus eis partibus ad cisternam: ut videatur cisterna chyli esse quasi *cor lymphaticum* universi abdominis.

*Ligaturae* ] Quae (3) injectae vasi Lymphatico, faciunt, ut inaniatur inter vincu-

phatica Thoracis frequentissime replentur per ductum Thoracicum, conf. STENONIS apud BARTHOL. *Cent. III. Epist. xxiv.*

- [3] Ligatis venis vasa Lymphatica intumescunt, quae perantiqua est methodus demonstrandi ea vasa, ob insertiones CXXI. 4. sub fin. DIEMERBROECK. L. I. c. 13. ZELLER. *de admin. vas. Lymph. c. I.* RUYSCH. *de Vas. Lien. c. I.* Sed ligata vasa Lymphatica ipsa, perpetuo, in abdomine infra vinculum tument, & deplentur inter vinculum & viscera partesve, in experimentis innumeris BARTHOLINI *de Lact. Thorac. c. VI. fin. c. XII. fin. de Vas. Lymph. nov. c. II. III. V.* RUDBECKII *de vas. seros. c. I.* NEEDHAM *de form. foetu p. 6.* MOINICHEN apud BARTH, *Cent. II. Epist. XLII. XLIII.* STENONIS *ib. Centur. IV. Ep. XXVI p. 106.* VERHEYEN. L. I. Tr. I. c. XIII. DRELIN-COURTII *Canicid. XI.* SYLVII *Diff. Med. VIII. §. XV.*) idemque in Thorace, & Collo verum est, ubi supra ligaturam, nempe inter originem & vinculum, intumescunt BARTHOLIN. *de vas. Lymph. c. VI.* haecque est eorum parandorum pulcherrima encheiresis in viventibus brutis RUDBECKII c. V. (egregie). DRELIN-COUR-

culum & cisternam , turgcat idem inter vinculum & partes, ex quibus Lymphatica adveniunt. Si in vivo animale , veloci opera Anatomici , aperiatur abdomen , & ligetur Pancreas Afellii , atque aqua tepida abdomini injiciatur, turgcbunt vasa Lymphatica abdominis , egregie conspicua. Si removeatur vinculum, subito evanescent. Eadem ratione , ad demonstranda vasa Lymphatica capitis , ligantur venae Jugulares, uti ad demonstranda Lymphatica abdominalia cisterna chyli ligatur.

*Pressio, in vet. edit.]* Sit ad manus canis molossus , stranguletur , ita, ut non penitus vita expellatur , aperiatur sinistra pectoris cavea , inventus ductus Thoracicus prematur digito, intumescet certe, ut pene crepet , & multa lymphatica vasa conspicua fient. Debet autem ad manus esse spongia alia aqua ebria , alia spiritu vitrioli , ut & elui possit cruor exundans , & nova haemorrhagia coerceri.

*Siphones, in vet. edit.]* Si in vas Lymphaticum inseratur tenuis tubulus , & impellatur flatus , aut liquor aliquis , veniet in cor usque , & describet iter sanguinis , si contraria directione aerem infles , nihil proficies contra valvularum resistantiam.

*Morbi]* Morbus regius est, quando glandulae

COURTII ubique BARTHOLINI de  
Diaphor. p. 90. PAULI anat. BILS anat,  
c. VII,

dulae pene totius corporis humani intumescunt, submaxillares, Carotides &c. cum lenta hominis consumptione. In iis corporibus reperiri solet Scirrhus (4) glandularum Mesentericarum, qui turgentem Lympham ita morari visus est, ut vasa a continuo adfluxu media diffiluerint, sicque nata sit pessima species Ascitis (5).

## §. CXXIII.

*Oleo*] Ita exaltato, ut cum aqua misceri possit.

DU

[4] A turgentibus vasis Lymphaticis, per quae naturale Lymphae iter non est liberum, hydatides, & ascites, quod jam suspicatus est BARTHOLINUS *de Vaf. Lymph.* p. 246. ed. HEMSTERHUS. & *de Lymph. in hom.* c. IV. & ex scirrhis glandularum conglobatarum frequentissimus hydrops BARTHOLIN. *Cent.* IV. *Epist.* LIIIX. ALLEN. *synops.* c. XLV. *Eller. observ. Med.* p. 72. & in hydropicis vasa Lymphatica maxima Nicolai *Comm. lit. Nor.* 1732. *hebd.* 33. Nuck. *adenogr.* c. VIII. p. 96. &c. c. IX. p. 109. Allen. *synops. in add.* ad c. VIII quod pulchre illustratur experimento Loweri, ligata nempe vena Cava abdomen fero intumescere, ligata Vena Jugulari caput Lympha turgere, *de corde* & PEYER. *schol. ad parerg. anat.* III. Hydrops ex Steatomate Mesenterii TULP. II. *Obs.* 32. &c.

[5] NUCK. p. 100.

[1] Lympha ductus Thoracici, pura a Chyli contra



tagio, & reliquorum vasorum lymphaticorum Corporis humani, est liquor pellucens, flavus KERKING. *Observ.* 5. aut pallidus, aut ruber, visus Pechlino *Obs.* 60. L. J. Zellero, & Brünnero, aut flavo ruber, qualis visus Cl. Duvernoy. *Sylvio Diff. Med.* VIII. §. 7. gelatinosus Drelincourt. XV. Stenonis apud Bartholin. *Cent. Epist.* IV. p. 9. ad ignem concreescens Verheyen. L. II. Tr. I. c. 22. Diemerbroeck, c. XIII. L. I. *Wepfer. dub. anat.* p. 99. (Conf. experimentum diversum paulum Brunneri de *Gland. Duod.* c. IV. quod etiam est *Dennysii confer.* IX. , fluidius evaporare, residuum in gelatinam scissilem coire) subsalsus, Bohn. *Progymn.* XIII. fin. uti sanguis, cujus phaenomena, si igne fortiori stillat, sunt eadem fere quae sanguinis *Wepfer.* l. c. Acida vero natura Lymphae, dicta *Bilsto* apud Bartholin. *desperat. hep. caus.* & *Pecqueto Barthol. Cent.* II. *Epist.* LXIX. p. 627. chylo omnino tribui debet, uti bili debetur amaricies dicta *Bellino.*

[2] *Spiritibus, in Text.*] Haec opinio Nuckio p. 48. *Sylvio Diff. Med.* VIII. §. 40.<sup>6</sup> *Brunnero de Gland. Duod.* IV. *Glissonio de hep.* c. xxxi. p. 456. Zellero l. c. ad fin. placuit, & est verissima, si quidem nervorum liquor per aliquas venas redditur sanguini (*Inst. Med.* cclxxxii.) Sed demonstrationem hic non admittit.



## DUCTUS CHYLIFERI ACTIO IN CHYLUM.

### §. CXXIV.

*Septi* ] Cum nempe receptaculum Chyli inter appendices (1) Diaphragmatis incumbat lumborum Vertebrae, debet necessario in singulis contractionibus Septi concuti, & liquor ejus ejici; Quumque deorsum ob valvulas cedere nequeat, CXXII. i. omnis vis Septi Chylum per ductum Thoracicum sursum compellet.

*Aortae* ] Cui proximum accumbit (2).

*Ductum* ] (3) Quem primus in Equo de-

(1) Pone appendicem dextram, ante Vertebrae  
CXXI. not. 1.

(2) Rami insignes Lymphatici pone Aortam saepe adrepunt cisternae. Sed ductus Thoracicus inprimis premitur ab Aorta, cui, non minima parte sui itineris dexter & anterior solet incumbere.

(3) Eum ductum in Equo viderat EUSTACHIUS, utilitates, terminosque non viderat, *de Ven. sin. par. Antigr. XIII.* Deinde VESLINGIO manifesto satis visus est, sed res non ad perfectionem deducta *Epist. posth. p. 64, 67, 192. conf. M. HOFMANN. ad BARTH. Cent. II. Epist. 84.* Primum, cum epidemicus error esset, lactea vasa in hepar Chylum deferre, novo experimento

descripsit EUSTACHIUS ; deinde PECQUETUS invenit , cum compresso Mesenterio , chylum in thoracem , deinde in eam venam migrare videret , quae in cane pro subclavia est : cum enim ea animalia clavicula destituantur , nomen vicarium habet axil-

mento vidit PECQUETUS anno 1649. non ibi subsistere , sed collecta in vesiculam , ductum efficere , qui sursum repat , insertus venis , quae canibus sunt pro subclaviis. Sed & anno 1650. innotuit RUDBECKIO *de vas. hep. aquos. c. lll. p. 277.* In homine BARTHOLINUS anno 1652. (*Cent. ll. Epist. Xlll.*) & van HORNE *diff. de Duct. Chylif.* eodem anno primi descripserunt : Sed rarae fuerunt ejus observationes , donec per vasa lactea secundi generis eum replere docuerit HENNINGERUS l. c. per lymphatica lumbaria SALZMANUS c. lll. p. 30. Nunc innotuit omnibus , & facile paratur , sola sede cognita , ipso in homine nunquam ita exilis , ut possit fallere oculos Anatomici. Nempe ex vesicula CXXI. not. 1. sive ex ductu , qui loco vesiculae inter vertebrae supremae lumborum & appendicem dextram septi transversae est , educitur , plerumque unicuique ductus , qui inter venam sine pare & Aortam , per eundem hiatus septi , in tunica cellulosa pleurae , extra ejus sacculum , ascendit recta in universum , sed cum undulata incurvitate , semper dexterior Aorta arteria , aut & anterior , sed in dextra ejus sede , pone orientes arterias Intercoastales , ad quartam usque vertebrae

axillaris. Idem ductum suum in canibus delineavit, *Van HORNE* vero & *BARTHO- LINUS* ex humano corpore, & nuperrime *CANTIUS* magnis iconibus nitide depinxit.

*Dextramve*] *Variae* sunt descriptiones *Auctorum*: namque & ipsa natura non perpetuas leges observat. Visus est ductus  
Tho-

Thoracis, ubi fere semper insulam facit, *EUSTACH* de *ven. sin. pari.* *van HORNE* l. c. I. I. *RUDBECK.* p. 320. f. 2. 4. *WIUM* (plurimas) l. c. *M. HOFMAN.* apud *BARTHOL.* Cent. II. *Epist.* LXXXIV. *BIANCHI* T. III. ad *hist. hep.* *NICOLAI* *Comm. liter.* 1732. *hebd.* 33. *SALZMAN.* p. 39. *HENNINGER.* F. F. *DRELINCOURT.* *Canicid.* XIII. ex bruto, *STENONIS* *act. Hafn.* II. *Ob.* XCVII. *BIDLOO* T. XL. f. 4. *DUVERNOI.* (sed plures) *CANT.* T. VI. f. I. *COWPER.* app. ad *BIDL.* f. XI. *MONROO* of the *laeteals.* *MORGAGN* *Epist.* I. §. X. *HALE* l. c. & denuo conjunctus ad insertionem Azygae situm mutat, & pone omnia vasa Cordis, pone asperam Arteriam & Oesophagum, abit sinistrorsum, ad exteriora arteriae subclaviae sinistrae, huic adjacens, pone venam subclaviam sinistram transit profundior, dexter accedit arteriae Carotidi, medius inter eam & Venam Jugularem adscendit ad ipsam fere glandulam Thyroideam, indeque reflexus (conf. *MONRO* l. c. *Albin.* in *demonstr. publ.* & apud *Cant.* T. VI. atque *Perraltum*, & *Salzmannum*) extrorsum, & retrorsum, pone venam Jugularem sinistram, ut pene Jugulari inferatur,



Thoracicus utrique Venae Subclaviae insertus. [Fere semper dividitur, & secundo exit, adscendit supra insertionem, descendit denuo, tandemque in Venam subclaviam inseritur, uti Ileum in Colon Intestinum, per duplicem valvulam, non, ut  
ex

ratur. COMM. LIT. 1732. hebdomada 33. sed verius tamen conjunctioni hujus venae cum ejusdem lateris subclavia; aut in subclaviae alias sedes se inmittit, semper tamen proxime Jugularem Bartholin de laet. Thorac. c. XII. Monro l. c. Winslow. IV. 163. de la poitr. Haec frequentior est historia consentiente Monroo. Sed variat, & saepiuscule divisus, utramque subclaviam venam subit, quae Pecqueti est observatio & Barthol de laet. Thorac. dub. c. II. sed in canibus, in homine vero le Noble apud Barth spicil. de Lymph. sec. p. 485. Walther. Observ. tres. Wium l. c. Kulmus in Bressl. samml. xvi. p. 432. Hummel Comm. Lit. Phys. techn. Med. 1737. hebdomada 21. Alias dextram solam Salzman. p. 38. & in bove Verheyen I. p. 74. alias sinistram quidem, sed bifidus Stenonis, apud Barth. Cent. III. Epist. XCVII. Salzman. in icon. omn. Cant. icon. Alias in subclaviam sinistram, sed multifidus, quod & Bartholinus vidit, l. c. & Perrault. l. c. p. 133. Hale l. c. Diemerbroeck. L. I. c. XII. in cane vero Pecquet & Rudbeck p. 320. f. 3. Alias in eandem venam sinistram, sed adscendens, quales icones sunt Bartholini, Evertse l. c. T. II Henningeri, Garengéoti, Duvernoy & Cowperi app. ad Bidl. f. 12. quod &

ex brutis animalibus LOWERUS pinxit, unicam. in FELDM. nov.] Positus autem est a provida NATURA ad sedem in thorace immobilem, ne compressus cito vitae finem faceret. LOWERUS enim in cane disruptit ductum Thoracicum, animal optimis cibis aluit, periit tamen intra paucos dies, cum pectus chylo esset plenissimum.

*Val-*

mihi visum, sed rarius: nam de *Schradariana* non liquet, apud *Langley Obs.* VII. p. 194. Alias in duas diversasque venas, ut apud *van Horne*; in azygam tandem *Kulmus* l. c. in qua observatione ductus Thoracicus utrique subclaviae, & superiori, & inferiori Cavae venae, & Azygae insertus fuit; alias in venam cavam, ut in cane *Sten. Kulmus* l. c. & *Barth.* apud *Cent.* III. *Ep.* LXV. & XCVII. Saepe vel tota longitudine vel magna ejus parte duplex est, ut apud le NOBLE, DUVERNOY l. c. in observatione WALTHERI conf. WINSL. IV. *de la poitr.* 164. JOSEPH del PAPA *de humor.* c. III. p. 24. aut triplex KERKRING. *Obs.* XXX. in cane. Caeterum in brutis animalibus, quae lactea vasa habent, ubique reperitur, in lupo, cane, lynce, catopardo, fele, erinaceo, equo, elephanto, ove, vitulo, cervo, cuniculo, phoca.

(4) *Valvulis, in Text.*] Ductus Thoracici valvulae, earumque officium, qua Chylum relabentem deorsum sustinent, jam PECQUETO innotuerunt, qui iconem dedit, l. c. f. 2 & experimenta. (*contra* RIO-LAN. p. 119. 120.) Deinde RUDBECKIO  
T. II.

*Valvulae*] (5) Valvula ductus Thoracici ostio adponitur diversa ab aliis in venis valvulis,

T. II. tot. &c. DRELINCOURTIO *Canicid*, XI. & BARTHOLINO *de lact. Thoracic.* c. XI. XIII. dictae uberius a RUYSCHIO *de vas. Lymph.* fig. V. & a NUCKIO ad lentem expositae sunt, non frequentes ( RUYSCH. *de vas. Lymph.* p. 5. ) ut vix numerum duodecim ( MONRO *of the lacteals* p. 40. conf. RUYSCH. l. c. & WINSL. IV. 164. ) excedant, conjugatae, valentes, semilunares, non absque fibris tendineis NUCK. f. XXIV. XXV. Et ipse ductus, tener ut sit, atque mollis, tunica non unica constat NUCK. f. XIX. XX. fibrasque motrices etiam in homine habere videtur, cum in brutis certo habeat HEISTER. EPH. NAT. CVR. Cent. V. VI. *Obs.* xxvi.

(5) Etiam BARTHOLINUS primus descripsisse videtur, *de lact. Thoracic.* c. XII. & c. II. sub fin. deinde visa est *van Hornio* p. 3. *Lower de Corde.* T. VI. f. 2. adcuratius *Drelincourtio Canicid* xvii. *Cantio* l. c. p. 27. *Bidloo* apud *Evertse* T. II. f. 3, 4. *Bohn. Progymn.* XII. p. 166. *Eulero de Mesenter.* lit. G. *Cowpero* l. c. & *Drake* l. c. X. *Duvernoi* l. c. T. XII. f. 2. *Monroo, Walthero*, ruga nempe duplicis tunicae venae subclaviae, majorem partem ( *Monro* l. c. p. 48. *Walther.* l. c. ) ductus Thoracici obducta tegens, & necessaria utique, si adscendendo ductus inseratur. Quoties descendit, minor videtur esse necessitas, cum de-

vulis, lunae nempe dimidia figura est, & totum ostium ejus ductus claudit: adeoque a labente desuper eo sanguine, qui ad Cor tendit per venam subclaviam, deprimitur, ut via sanguini ex vena in ductum nulla maneat. Eadem elevatur a Chylo per ductum Thoracicum adscendente, per vires modo dictas, & admittit Chylum lymphamque.

*Lympha*] Omnis Lympha (6), ex omnibus Thoracis visceribus, huc confluit; &

delapsi chyli pondus sanguinem reprimat. Nondum vidi rationes *J. A. Wedelii*, ex quibus non inservire Thorarico ductui evicit, *Progr. propr. cit. apud Heister. compend. not. 16.* Quando plures insertiones sunt, plerumque plures etiam adsunt valvulae *Salzman. f. IV. lit. a. a. Duvernoi l. c.*

(6) Vasa Lymphatica superiora, quae ductui Thoracico, & vicinis ad insertionem ejus venis inferuntur, varia & copiosissima sunt. Namque in Thorace proveniunt a Diaphragmate *Nuck. p. 142.* & a mediastino *Rudbeck. l. c. VII. f. nov. 3.* & a pulmone *Rudbeck. fig. nov. 2. Nuck. Adenogr. p. 53, 141. Morgagn. Adv. II. Anim. 47. Ferren in Acad. Reg. Paris. Hist. 1733. ex pericardio Marchett. apud J. M. Hofm. in Horn. p. 116. & a Corde Rudbeck. p. 300. f. nov. 1. Nuck. l. c. p. 143. Moinichen apud Barthol. Cent. II. Epist. 43, 44. Horst. Obs. anat. VIII. & a glandulis conglobatis, Pericardio atque asperae arteriae incumbentibus, *Nuck. p. 142. a glandulis conglobatis plusculis, quae sociae ad-**



& ductu Thoracico ligato, turgent ea omnia Thoracica vasa Lymphatica, atque distenduntur a Lympha, cui reditus in ductum suum denegatur. Ratio esse debet omnino

adjacent ductui Thoracico, perpetuis, a glandula Oesophagaea *Rudbeck. p. 300.* atque ab Oesophago, quae nuper vidi. Ea omnia fere ductui Thoracico, per totam ejus longitudinem variis locis *Rudbeck. f. I, II, III. Henninger, Salzman, Perrault &c. & in venas [ut ex pulmone Ruych. p. 6.]* inferuntur.

Sed *Axillaria* Lymphatica, quae ab universo brachio redeunt *Barthol. de lact. Thorac. c. xii. & c. vi. &c.* per glandulas Axillares conglobatas, & Claviculae subjectas, dictas *Cowpero app. ad Bidl. f. 12. E. modo ad Thoracicum Ductum, Hale l. c. 29. modo in venas axillares Pauli c. VI. Swammerdam. apud Stenonis Act. Hafn. f. 1, 2, 3, 5, 6, 9. terminantur.*

Denique ex capite universo, Cerebro ejusque plexu Choroideo *Ridley de cerebr. C. VII. p. 62. f. 5. q. q. Nuck. de nov. inv. p. 150. pia matre LANCIS. de motib. subitan. l. c. xi. p. 36. Oculo, Valsalv. de aure human. III. §. xv. p. 60. facie, [Nuck. p. 141.] & glandulis maxillaribus Pauli c. VI. Stenon, de gland. oris, muscualis linguae *Coschwiz. duct. saliv. nov. & ossis hyoidis, ib. & Thyroidea glandula, id. ib. c. utque occipitis Nuck. l. c. per glandulas Jugulares saepe in unum truncum conveniunt, Stenonis de gland. or. Zeller. l. c. qui descendens occurrit chylifero ductui,**

mnino, quare in omni genere Quadrupedum animalium Deus noluerit chylum per exiguas venulas in sanguinem ducere, sed colligi iusserit in unum magnum canalem, qui in peculiarem venam, & quidem in sanguinem descendentem, perpetuo inseritur. Videtur vero ratio fuisse, ut chylus prius, quam ad cor ferretur, reciperet quam plu-

stui, & plerumque ad ejus descensum inseritur *Moinichen Cent.* III. *Epist.* Barth. p. 7, 8. *Stenonis* ibid. LVI. p. 229. & *Aët. Hafn.* f. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. FF. *Monroo* l. c. *Zeller.* *Diemerbroeck.* p. 60. *Cowper.* l. c. E. G. vel in venas, Jugularem apud *Blas. anat. anim.* T. IX. f. 22. *Hale* 46. cavam *Stenonis* de gland. Or axillarem & Jugularem externam *Pauli* l. c. c. VI. & in ic. maj. Alias vero separatist truncis se inmittunt Jugulari venae ut apud *Swammerdam.* in *Blas.* ad *Vesling.* T. XXIV. f. IV. *Hale* l. c. 31. *Stenonis* l. c. f. 6. Ad eam reflexam sedem ductus Thoracici not. 3. confluentia vasa Axillaria, & Jugularia, & Thoracica, efficiunt (vid ic. *Pauli* & *Stenonianas* & *Hale*) labyrinthum, ex anfractuosis circulis conpositum, quem *Bilsius* ex paucis experimentis, non sine ostentatione depinxit f. 1. E. & pro centro omnis Lymphae corporis humani habuit, unde & ad caput, & ad artus, & ad Thoracem ramos mittat. Eum errorem *Stenonis* *Cent. Ep.* Barth. IV. *Epist.* LXXVI. *Drelincourt.* *Canicid.* XI. *Pauli Anat.* *Bilf. anat.* & *Ruyschius* de valv. Lymph. p. 1. per ligaturas, & valvulas dudum refutaverunt.

plurimam lympham. Si enim in via chyli vel minimus fuisset obstructionis metus, in Pulmone certe non metus solus, sed certa oritura erat peripneumonia, deducto in angustos, & convergentes canales, quod in latioribus chyli valis inmeabile fuerat.

§. CXXV.

*Exilem*] Si compares quantitatem Chyli & Lymphae, quae per eum fertur; & cui nunquam is ductus sufficeret, nisi magna pressione, & insigni velocitate ferrentur.

*Pressam*] Ductus Thoracicus premitur (1) ab omni vi aëris incumbentis in inspirantes pulmones, quae sufficit ad sustinendam aquam in tubo triginta duorum pedum, mercurium vero ad pollices pene triginta. Sed pectus plenissimum est, neque quidquam inter pulmones & costas relinquitur spatii; ergo necessario ductus thoracicus comprimetur ab expansis in inspiratione pulmonibus. Cui tanto ponderi resistunt, alterna exspiratio, in qua pondus aeris nullum sit, pulsus arteriae Aortae &c.

*Valvulas*] Quae (2) chylum retrorsum la-

[1] Cum ipsis vertebrae incumbat, tectus valida tensaque Pleura, eminenti & tereti aortae vicinus, quae incumbentia corpora avertat, nullam pati videtur pressionem pulmonum, ne quidem in homine procumbente.

[2] cxxiv. not. 4. Non tamen inpediunt, quin flatus fortiter adactus aliquando viam deorsum

bentem sustinent, ne longius, quam ad proximam conjugationem, relabatur. Sed ea valvularum conjugatio, cui relapsus chylus incumbit, elatere suo repellit Chylum & cogit adscendere, dum pressio externa validè accedens iter ejus adjuvat. BILSIUS adfirmaverat, chylum ex labyrintho, tamquam communi fonte, distribui ad partes omnes, ipsasque mammas: Id commentum valvularum consideratio destruit.

*Efficacia*] PAPINUS olim demonstravit, quanta vehementia aer in locum vacuum irruat: deinde eam vim BOERHAAVIUS demonstravit esse duplam venti velocissimi, qui intra minutum secundum temporis, auctore MARIOTTE, percurrit pedes 22. Incredibili ergo celeritate Chylus in ductum Thoracicum rapitur, cum ductus Thoracicus in totidem capsulas inanes distribuitur, quot intercapedines sunt valvularum. Si

orsum sibi faciat, aut ipse chylus relabivus sit *Cl. STENONIS de glandulis oris, p. 42. & apud BARTHOL. Cent. III. Epist. LVI.* Verum, dum vita manet & novae chyli suppetiae accedunt, propellit insequens unda undam incumbentem valvulis, atque ante se urget.

[3] *Diaphragmatis, in Text.*] Hujus princeps efficacia est, comprimens validissime cisternam, & nascentem ductum, impetu omni per valvulas sursum determinato Arteriae Intercoastales vicinae & ductum decussantes, aliquando anteriores (*van HORNE in icone*) fere semper subjectae, hic aliquid possunt.



Si suprema evacuata fuerit, rapitur ex secunda chylus in eam, atque evacuatur secunda; in eam inanem, & vacui BOYLEANI simillimam, pellitur vi magna chylus tertiae capsulae, atque ita ex ordine. Velocitas vero motus summe necessaria fuit, ne chylus prius concrederet, quam ad pulmones venit.

*Peritonaei*] Mesenterium non pendulum est, neque vacuum abdomen, ut male creditur, sed compressum undique in abdomine plenissimo. Si per vulnusculum, in homine sano, cui casu aliquo abdomen incisum est, digitum inserueris, experieris longe majori vi conprimi, quam quidem expectatur. In inspiratione Diaphragma vi magna viscera omnia versus pelvim compellit; & vicissim versus superiora urgent in expiratione muscoli abdominales, adeoque etiam lactea vasa comprimunt; quorum partitus motus est, alius ab Intestinis acceptus, alius a compressione partium vicinarum.

*Tenuem*] Quae, nisi farta sit eximio pinguedinis pondere, vim, quam habet, integram subjectis vasis adplicat.

*Aortae*] Quae plus, quam 100. librarum est (2\*). Vidimus in Nundinis hominem circulatorem, qui supinus pectori inponebat validum ferreum incudem, & observavimus, ad singulos ictus cordis, adscendere incudem.

*Validam*] Membranae tenues sunt, sed elasticae. Nam post mortem in gelido cadavere (4), ubi nullus motus exterior superest, du-

[4] A morte, cisternam & ductum Thoracicum,  
Pp cum

ductus Thoracicus, qui proximo momento chylo albo distentus adparuit, integre evacuat sub spectantium oculis, & pellucidus evanescit.

### §. CXXVI.

*Defaecatio*] In itinere adeo longo, id omne, quod debitam soliditatem non habet, neque similem, fluidamque naturam, id deponitur per innumeros anfractus, atque secedit. Via enim per alvum per experimenta videtur 24. aut 30. horarum, per vasa lactea vero 10. & 12., cum animalia aperta octava a pastu hora, chylum adhuc in lacteis vasis habeant, altero vero die excrementa. Quo diuturnior vero mora, eo plus recipitur alimenti. Sanissimus homo Delphis vixit, cui vix 16. die alvus respondebat.

*Calorem*] Natura blanda efficacia perficit, quod nulla posset violentia. Calore 94. graduum omnia animalia perficiuntur; neque enim credibile est, alia dari animalia, quae admodum calidiora sint homine, cum cor humanum ad pondus corporis totius majorem habeat rationem, quam cor bubulum. Plantae infra eum calorem fere vivunt. O-

mnis,

ubi calorem

cum inania essent, facta ligatura, post viginti quatuor horas Lympha plena fuisse STENONIS apud BARTHOLIN. III. *Epist.* XXIV. p. 92. & albo chylo pellucens Lympha succedit etiam a morte ELSNER. *Eph. nat. cur.* II. *Obs.* LXI.

mnis vero liquor, animalis sit aut vegetabilis, solo calore, qualis est corporis humani sani, resolvitur (1), adtenuatur in minimas particulas, ut quam fluidissimus fiat, & ea omnia patitur tanto majora, quo magis clausus est locus in quo ea patitur. Solo calore 94. graduum intra 22. dies albumen adtenuatur in liquida tenerrima pulli.

*Lymphae*] Omnis abdominalis Lympha deferitur in cisternam chyli cxxiv. not. 4. Thoracica omnis in ductum Thoracicum cxxiv. not. 6. & quae ex capite defluit, vel in Thoracicum ductum, vel in proximas venas Jugulares venit. Ea Lympha a chylo, externo habitu, & rubello colore facile distinguitur, cumque sit tenuior (2), diluit chylum, atque eundem magis quali humanum reddit, indigena ipsa. Ea vero Lympha, quae Chylo miscetur, fit l. ex Lympha, quae per vasa arteriosa Lymphatica secreta est (3) & elaborata. Quas arterias negabit perperam, qui argumento oculorum utetur. Solo nempe microscopio conspici potest arteria rubra minima (4), quae & major est, & liquorem adeo tinctum vehit; non ergo peti potest, ut oculis demonstraretur arteria Lymphatica, quae & exilior est, & pellucidum liquorem vehit, cujus particulae globulis

[1] Exemplo incubati ovi, radicum verno tempore pulluantium &c.

[2] Diluere, durum videtur, cum Lympha gelatinosa sit CXXIII, not. 1. Chylus aqueus.

[3] CCXLVI.

[4] CCXIV.

lis sanguinis sexies minores sunt. II. ex omnibus humoribus corporis humani, qui Lympha subtiliores sunt. Nihil enim de liquoribus ex sanguine secretis perit (5) irrevocabile sanguini, praeter perspirabile illud SANCTORIANUM. Reliqui liquores subtiliores omnes redeunt in suas scaturigines; nempe per venas redeunt; & si quidem venarum praeter sanguineas proxima est vena Lymphatica (6) valvulosa, redeunt ergo per Lymphatica vasa, atque chylo adfunduntur CXXI. CXXIV.

[Vaporis] HIPPOCRATES corpus humanum, quod scilicet firmis partibus fit, in cavitates & vasa divisit, & cavitates dixit in sano corpore spiritu, in aegro ichore plena esse (6\*). Omne intervallum membranarum in corpore humano, omnis intercapedo vasorum cylindricorum, omnis in corpore humano cavitas, humida (7) est tepido, & transsudante

[5] CCXLVI. CCXLIX.

[6] CCXLIX. CCL.

[6\*] Conf. commentarios industrii viri KAAUWII.

[7] Vapor ille in abdomine alcalescens, in quocunque animale proprio odore nares feriens, hinc maxime exprimens indolem peculiarem humorum animalis cujusvis, notissimus est. In Ventriculis Cerebri similis vapor, & mador, idem in pectore &c. Semper, in sano homine, parcus, & merus vapor, sed in morbo diuturno, fit in veram lympham, subrubram, gelatinosam, quae ad ignem concrefcit vid. RUSCH.

YSCH.



arterioso vapore, qui motum expedit, & intercedit, ne vicinae membranae aut musculosae fibrae concrecant. Verum iste vapor non manet effusus, cum certa ejus sit & definita ubertas, ultra quam non augetur; atque in vivo animale aperto Pericardio aut abdomine fumus exhalet nulla aqua superstita. Resorbetur ergo, & redit in sanguinem, ad quem non alia via est nisi per venas Lymphaticas, si quidem alia vasa hucusque non innotuerunt. In cane ex cavitate abdominis continua via est in testes, quod in homine aliter est. In cane ergo NUCKIUS scrotum vulneravit, & per scrotum in cavitatem abdominis unam aquae libram injecit, & vulnus confuit: is certe canis intra triduum aquam emixit omnem, neque quidquam in abdomine habere visus est. Adeoque ex cavea abdominis patula & continua via est ad cisternam chyli. Quare additur

YSCH. *Observ. rarior.* post de valv. lymphat. XIX. p. 19. BRUNNER. *Ephem. nat. curios.* Dec. II. Ann. VIII Obs. C. STENONIS de musc. & gland. p. 45. 46. & alios. Quare, si fecernitur perpetuo, si lymphae habet indolem, si in statu secundum naturam nonnisi mador reperitur, utique erit via, qua is mador in sano corporis statu resorbeatur, ea copia, qua fuit excretus, & ea via ducet per vasa Lymphatica (praeter rationes CXXIX. not. 1.) cum dotes utriusque liquidi similes sint. Conf. GLISSON. de hepat. c. XLV. p. 302. SCHREIBER. *Elem. Medic.* L. II. 156. 157. seqq.

tur chylo. Verum calidus est, subtilis, tenuissimus, admodum indigena. Et quantitas ejus non modica est, quod arguit amplitas cavitatum, quas irrorat, pelvis, scroti, abdominis, pectoris, pericardii, cranii, ventriculorum cerebri, viae aëreae & intestinalis &c. arguit etiam citum incrementum Hydropis (8), qui absque vicio vasorum saepe oritur ex sola impedita reabsorptione vaporis effusi. Is ergo vapor, talis cum sit, & adeo copiosus, promovebit utique adsumptorum *assimilationem* sive mutationem in eam ipsam indolem, quae humano sanguini propria est.

*Spiritibus*] Nervorum succus per succedentes vasorum plurimas series, debuit perpetuo adtenuatus fuisse (9), prius quam subire queat omnium minima vasa corporis humani, quae nervi sunt. Neque tamen pro certo (10) experimento hujus admistionem proponimus, cum ea, quae ex analogia potius & ratiocinio quam ex sensibus deducimus, nunquam plenam lucem evidentiae prae se ferant.

*Assimilationem*] Corpus humanum non ex alia ratione persistat inmutatum, nisi, quia regeneratur perpetuo: sed regeneratur, quia id, quod crudeum, alienum, & non nostrum fuit, in nostrum corpus mutatur. Ut vero mutari possit, cavit providens Natura, ne unquam crudeum alimentum, servata sua aliena

[8] APHOR. PRACT. MCCXXVIII. 3.

[9] INST. MED. CCLXXXVII. &c.

[10] CCXLVIII.

liena indole ad venas veniat, verum in ipso itinere ei adfundantur omnes humores nostri, excepto sanguine. Unde fit, ut in chyllo jam adsit bilis, ex qua bilis nova secerni possit, Cl. not. *redire*; saliva, quae in salivam regeneretur LXVIII. tot; Lympha, quae in Lympham denuo abeat, CXXI. CXXIV. Et pars chyli, quae cruda est, manet minima, suffocata exuberante copia cocti liquoris, uti aceti pauxillum in magna copia mellis vires suas amittit.

*Humani*] Non mirum esse debet, duodecim uncias humoris vegetabilis posse obtundi & naturam suam amittere, si quidem in eo itinere, quod ab ore est ad sanguinem, huic uni plus quam quadraginta librae (11) humorum humanorum lente, magna cum cura, miscentur, & interteruntur. Si in corpus nostrum siccum & vacuum ingereretur alimentum, nunquam id ferremus. Testantur morbi adeo frequentes, qui ab annonae caritate oriri, & epidemice grassari solent (12\*). Sed horum liquorum humanorum princeps est Bilis (12), sapor certe adeo acris, ut eum intra vasa *Natura* talem non potuerit parare, sed extra vasa, mora & calore in Vesicula fellea elaboret. Neque enim credo, in

[11] Conf. XCV. not. 16. CV. CVI. not. 10.

[12\*] Vulgares sunt observationes, homines post famem diuturnam abunde ciborum nactos, plus ab alimentis, quam a penuria mali passos esse. Vide LERYUM *sub fin. Itineris Brasil. &c.*

[12] Cystica IC.

in vasis corporis humani, unquam veram bilem contineri.

### §. CXXVII.

*Aquam*] Haec enim omnia adfunt in iis, quae adsumuntur. Huc maxime faciunt observationes LEUWENHOECKIANAE (1). Omnis succus alibilis, quo vivimus, ex meris globulis componitur: li varii sunt, fere majores plerumque, quam in humano sanguine, sed rariores, & facile diffiliunt. Quando in chylum abierunt cibi, pauciores jam adfunt globuli majores, minores multi, in quos videntur resoluti esse, qui prius ampliores adfuerant. Quare cum tenuiores sint, possunt resorberi vasis exilibus, & iter absque mora perficere. Superest, ut in viis secundis conpingantur, majores fiant, atque solidi, quales in massa sanguinis reperiuntur. Similarem vero chyli (2) naturam esse, vel ipsae externae ejus qualitates demonstrant, fluiditas aequabilis, sapor idem, inodora, & blanda indoles, natura sphaerica &c.

Mor-

- [1] Minores quam sanguinis globuli, in farinosis feminibus sunt, & in cerevisiae fermento, & ipso chylo, cui tamen non desunt particulae globulo sanguinis aequales, passim, conf. *Experim. et contemplat. Epist. I. & II.* In fecali WOLF. *Versuch.* III. c. V. 92. in amylo ib. 48. De chylo conf. BOHN. *Progymn.* 142, 143. BERGER. *de Natur. hum.* 247.

- [2] Chylus lactis simillimus est, colore, sapore, exa-



## §. CXXVIII.

*Morbi*] In ipsis senibus, etiam xc. annorum, Mesenterium plerumque illibatum  
 in stoma. repe-

examine & secessu particularum: conf. praeter LOWERVM, MICHELOTTVM, *de separat. fluid.* c. II. & HOFMANNVM *Medicina system.* I. p. 192. Album colorem a pingui habet in aqua soluto, quod evidens est, cum adipis globulos viderit in eo LEEUWENHOECK., deinde ex similitudine, quam summam habet cum Emulsione. Inde dulcedo, & levitas, ut sanguini & sero supernatet LISTER *de humorib.* XXIII. LOWER. p. 238. Sed fluidior est, & aquosus magis, & adsumptorum naturam saepe retinet. Ita acidus visus est BOHNIO l. c. p. 133. BARTHOLINO *Cent.* III. *Epist.* XCVII. & iis, quibus Lympha acida visa, BARTHOLINO *Anat.* p. 632. BILSIO, KOHLANSIO *in diff. propr.* cum tamen non BOHNIUS solum, sed VIRIDETUS, non minimus acidi patronus, testetur, quod succum Heliotropii non tingat. Sed & coeruleus ab Indigo dissoluto LISTER. & MUSGRAVE l. c. flavus ex vitellis ovorum comestis VIRIDET., quo & eae observationes, quae de lacte ipso, alimentorum vires retinente, exstant DCLXXXIX. Ab admista Lympha videtur salsedo accedere, observata PECQUETO contra RIOLAN. p. 127. LOWERO p. 237. MARCHETTO apud BARTHOL. *Cent.* II. *Epist.* XXXIX.

reperitur, sola glandularum diminutione excepta (1) (CXVII.) Nempe liquor defaecatissimus, per tot adhibitae machinas depuratus, resorbtus in vasa tenuissima, nulla mora diuturniori lentescens, motu perpetuo, protrusus vi urgente septi transverli, & arteriae Aortae, promovetur per vias lacteas. Adjuvant valvulae, quae faciunt, ne particula inmeabilis sequentibus sit obstaculo, sed post exiguam moram ictu arteriae aliquo dissipetur. Tum balneum vaporis in quo suspenditur Mesenterium: novimus enim, quanta sit vaporis vivorum animalium ad dissipandas obstructions efficacia. Neque tamen impedire potest provida natura, quin aliquando obstructions in mesenterio oriantur, sive quod chylus coaguletur, sive quod particulae, dissolutae viribus intestinorum, denuo cohaereant in vasculis minimis, sive quod debilitas corporis, vitaeque immobilis torpor non sufficiat chylo promovendo, atque chylus, in glandulis restagnans, resorbto eo,

- [1] Tum eo vicio quod niger color, & ficcus habitus indicant. In receptaculo grumos lacteos coagulatos PECQVET. *contra RIOL.* p. 105. lac coagulatum BARTHOLINUS *de Lact. Thorac.* c. V. & facile coagulari chylum LEEVWENHOEK. *Exper. & contempl.* p. 11. 12. 13.

- [2] Frequentes omnino sunt scirrhi glandularum Mesenterii, aut ulcera, horumque multa exempla collegit WHARTON. *adenograph.* C. XI. alia BONNET. *sepulchret.*

eo, quod habuit fluidius, obstructions producat, quae in calculos (3) abiisse visae sunt. Inde strumae glandularum Mesenterii, quales raro defunt in iis, quibus Thyroidea glandula, & Pancreas strumis intumescunt; Eae vero strumae causae fiunt eorum morborum, qui comitantur strumas colli, non a colli vicio oriundi, verum a latente focia struma Mesenterii (4).

§. CXXIX.

*Lymphae*] Chylus non magna copia, neque ultra unam, alteramve libram digestionis tempore per vasa lactea fertur, extra id stadium, omnino nullus (1); toto eo

*anat. III. f. XXI. Observ. XXXVI. seqq.* Ea in pueris adeo frequentia sunt, ut popularis jam facta sint Pathologia atrophiae, & marcoris puerilis. Licet existimem, aliquando magnas quidem, sed ex recepta in junioribus lege glandularum conglobatarum, pro morbofis habitas esse, cum essent sanissimae [CXVII. not. 2.].

[3] WHARTON. l. c.

[4] Nuper vidi maximas in scrofuloso puero, & cum iis inguinales atque Iliacas glandulas adeo tumidas, ut herniam mentirentur, Iliacas venas conprimerent, cum ulcere maligno pedis, atque peritonaeum ad ortum Hypogastricorum furtim ex sede repellerent.

[1] Vasa Lactea & ductum Thoracicum, non pecu-

eo tempore vasa lactea pellucunt, & nihil  
a Lymphaticis differunt, vehuntque sali-  
vam

peculiare vasorum genus esse, sed vera  
Lymphatica, quae chylo quidem infer-  
viant per intervalla, aquoso latici perpe-  
tuo, id quidem plerique anatomici  
senserunt, experimenta sola, recensere  
malim, non opiniones, consentientis  
BIANCHI, STAHLII, BOHNII, LEPROTTI,  
CASP. BARTHOLINI [*spec. hist. anat.*] SYL-  
VII, BIDLOI apud EVERTSE, LOWERI,  
DIEMERBROECKII. Atque alii quidem  
in vasis lacteis Lympham viderunt,  
BARTHOLIN. *de Lact. Thoracic.* c. VI. fin.  
NEEDHAM. *de form. foet.* c. I. BARTHO-  
LIN. *de Diaphr.* S. II. p. 93. & in *praef.*  
VERHEYEN. L. I. p. 75. MUSGRAVE  
*Phil. Trans.* no. 166. p. 103. apud LOW-  
THORP. Vol. III. WINSL. IV. 212.  
NUCK. *de nov. invent.* p. 146. ZEL-  
LER. l. c. ELSNER. *Eph. Nat. Cur.*  
*Dec. I. Ann. I. Obs.* LXI. DUVERNOY l.  
c. p. 269. (licet aliam rubri chyli causam  
adleget) Alii in Thoracico ductu, ut MOI-  
NICHEN apud BARTHOLIN. *Cent. II. Epist.*  
LX. BARTHOLIN, *lact. Thoracic.* c. XV.  
*Vas. Lymph. nov.* c. II. VI. NEEDHAM. l.  
c. p. 6. BILSIVS apud BARTHOL.  
*Epist.* LXXXIII. *centur.* III. RUDBECK.  
*Observ.* X. p. 328. apud HEMSTERHVSIVM,  
KERKING *Obs.* LX. L. I. & omnes ana-  
tomici in corpore humano, ubi perpetuo  
aquosus latex, rarissime si unquam, chylus  
in ductu Thoracico visus est. Alii etiam  
successionem observaverunt, ut in supe-  
riori



vam ex intestinis resorbtam, & ventriculi humorem, & intestinorum, & Pancreatis succum, & bilem tenuem hepaticam. In diuturna inedia (1\*) non perit meabilitas vasorum

riori sede intestinorum chylus in vasis lacteis esset; in inferiori Lympha, MORG. *Adv. Anat.* III; *An.* XVII. Alii vasa lactea & ductum Thoracicum, quae chylum viderant vexisse, repleti pellucido liquore viderunt. MUSGRAVE l. c. STENONIS apud BARTHOLINUM *Centur.* III. *Epist.* XXIV. p. 92. RVDBECK. *de vas. aquos.* c. V. aut chylum succedentem, fugasse Lympham, ut apud DRELINCOURT. *Canicid.* XV. Vnde factum est, ut alii existimarent soli Lymphae inservire vasa lactea, ut HARVEIUS vid. BOGDAN. *Cent. Epist.* BARTHOL. II. LXII. LXIII. & SWAMMERDAM. *prodrom.* HORNIAN. aut ductum Thoracicum, ut MARCHETT. apud MOINICHEN. *Epist.* BARTHOL. *Cent.* II. ep. LII. p. 584. BILS. *Epist. dissert.* p. 22. seqq. BACK. *de Corde* c. V. p. 118. CL. DUVERNOY vero ductum duplicem esse, & alium chylo, alium lymphae patere, l. c. p. 286. 287. Peculiares vero lymphae ductus intestinorum nullam fidem invenerunt, quos ex conjectura habet VERHEYEN. l. c. & NUCKIUS *de nov. invent.* p. 146.

[1\*] Inediam 20 dierum feles, 36 dierum terunt canes, octo mensium viperae, octodecim mensium testudines, REDI *de anim. intra anim.* p. 139. 140. 8 dierum aborigines Acadiensis DIEREVILLE p. 120.

vasorum lacteorum, conservata a transfluente lymphâ varia, Pancreatis, intestinorum, saliva. Sed Lymphâ & uberior perfluit, & perpetua. Quod equidem necessarium est, cum vacui canales brevissimo tempore coalescant in corpore humano.

*Cava*] Communis nempe alveus (2) omnium liquorum, qui sanguine rubro tenuiores per corpus humanum moventur. Minor est Vena Cava rubra, quia per eam longe velocius chylus movetur, quam sanguis.

#### §. cxxx.

- [2] Magnae sunt rationes, quare existimemus, non aliam viam esse humoribus tenuioribus in sanguinem, praeter eam, quae per vasa Lymphatica & ductum Thoracicum dicta est. Majora certe vasa non adsunt, vix potuerunt tot anatomicorum aetates latuisse. Minora magnis venis inmitti, vix probabile, aut tutum videtur, neque analogum, conf. SCHREIBER. l. c. l. ll. c. ll. An huc faciunt experimenta, quibus constat periisse, quibus ductus Thoracicus, aut fato ut apud LANGELOTTVM, in BARTHOL. *Epist.* XXXVII. *Centur.* III. SCHENK. apud BARTHOLIN. *de hep. desper. caus.* HOFMANNVM in morbo LICHTSCHEIDII, conf. CVI. *fin.* aut anatomici manu LOWER. c. V. p. 228. 235. disruptus fuit? An perierunt potius aegri chyloso hydrope? Cita mors Canum LOWERIANORVM priori opinioni favet; altera observatio posteriori.

## §. CXXX.

Nunc inmergitur Chylus in sanguinis oceanum, neque ab eo tempore solus conspicitur, nisi lactis nomine, tum in venis vivi animalis, ubi tribus a pastu horis, non mutatus, suo albo colore distinctus, sanguini innatat observante LOWERO (1).

- [1] Quatuor aut quinque horis a pastu p. 238.  
 Confer lactis ex secta vena fluentis exempla apud BARTHOLIN. *Thorac. c. XIII.*  
 & *hist. Anat. XVII. Cent. I. TULP. Obs.*  
*58. L. I. PECHLIN. Obs. XIII. L. II. Cl.*  
**TEICHMEYER** *Anthropolog. p. 62.*

F I N I S.



## Errata difficiliora

in Tom. II.

- P. 66. not. f. l. 13. *viris* l. *vir* *idem*.  
71. not. n. l. 5. post *tulerat*, adde *is enim*.  
126. not. b. l. 1. dele *minuunt*.  
176. not. l. 8. *aerem* lege *sanguinem*.  
248. not. c\* l. 5. *violentia* lege *resistentia*.  
288. not. l. 8. & 9. & 10.  $\overset{3}{V}\overset{2}{663}$  lege  
 $\overset{3}{V}\overset{2}{6b3}$ .  
314. not. a. l. 7. *una* l. *totis*.  
334. not. b. l. 4. dele *jus*.  
377. not. b. l. 1. *spinam dorsi* l. *medullam spi-*  
*nalem*.  
545. not. l. 7. ante *Lentius* lege *k*.

















Boerhaave  
Physiol Gen  
Anat Gen  
Haller  
Med Lect



